

专业实践能力

题型：A1 型选择题

题目：

人类口腔正常菌群中的主要致龋菌不包括

选项：

- A. 变形链球菌
- B. 黏性放线菌
- C. 内氏放线菌
- D. 乳杆菌
- E. 梭形菌

答案：E

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

学龄前儿童用含氟牙膏刷牙，含氟牙膏用量是

选项：

- A. 豌豆粒大小
- B. 牙刷长度的 1/5
- C. 牙刷长度的 1/4
- D. 牙刷长度的 1/3
- E. 牙刷长度的 1/2

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

区别左右上颌乳尖牙与恒尖牙最主要的标志是

选项：

- A. 乳牙体积小，颜色白
- B. 乳牙冠宽根窄
- C. 乳尖牙近中斜缘于远中斜缘，牙尖偏远中
- D. 乳牙颈嵴最突
- E. 乳牙根尖偏远中并弯向唇侧

答案：E

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

影响龋病流行的最主要因素之一是

选项：

- A. 钙磷摄入的比例与摄入量
- B. 刷牙的时间与频率

- C.钙的摄入量与摄入频率
- D.糖的摄入量与摄入频率
- E.就诊的医疗级别与次数

答案：D

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

下列口腔健康教育策略的叙述中，错误的是

选项：

- A.国家或地方的健康目标中，应包括口腔保健项目
- B.口腔健康教育应是临床医疗服务的组成部分
- C.应发挥领导部门的主导作用
- D.每项口腔卫生保健服务应包括口腔健康教育
- E.口腔健康教育信息应强调准确和严谨

答案：C

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

口腔医务人员可使用的主要个人防护用品中不包括

选项：

- A.乳胶手套
- B.除菌洗手液
- C.保护性眼镜
- D.保护性工作服
- E.口罩

答案：B

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

婴幼儿口腔健康的目标是

选项：

- A.乳牙按时萌出
- B.乳牙整齐美观
- C.颌骨发育正常
- D.无龋及牙龈健康
- E.促进牙齿钙化

答案：D

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

为取得固定义齿良好的稳固性应选择

选项:

- A.冠内固位体
- B.冠外固位体
- C.固定连接体
- D.活动连接体
- E.坚实的桥体

答案: C

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

固定义齿的设计主要根据

选项:

- A.患者对咀嚼功能的要求
- B.患者对美观性的要求
- C.患者对舒适度的要求
- D.基牙的牙周膜面积
- E.基牙的单根牙数目

答案: D

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

最可能采用单端固定桥设计的是

选项:

- A.侧切牙缺失
- B.中切牙缺失
- C.第二恒磨牙缺失
- D.第一前磨牙和后磨牙缺失
- E.全部后磨牙游离缺失

答案: A

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

固定义齿基牙为以下情况时, 应当考虑增加基牙数目的是

选项:

- A.单根牙
- B.轻度倾斜
- C.临床牙冠较短
- D.牙根较短
- E.无对颌牙

答案: D

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

影响固定义齿桥体所受力大小的是桥体的

选项：

- A.颊舌向径
- B.轴面形态
- C.龈面形态
- D.自洁形态
- E.结构强度

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

对于松软牙槽嵴的认识，下列正确的是

选项：

- A.由于长期缺牙，骨质大量吸收引起
- B.该组织对义齿有很好的支持作用
- C.该组织在修复前不必切除
- D.该组织受压后不会产生疼痛和炎症
- E.该组织由于牙槽嵴压迫性吸收形成

答案：E

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

与固定义齿桥体龈面自洁性有关的最重要因素是

选项：

- A.牙槽嵴吸收程度
- B.牙槽嵴宽窄度
- C.桥体龈面横截面积
- D.桥体龈面接触形态
- E.龈面采用的材料

答案：D

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

为后牙铸造金属全冠做牙体预备时，错误的做法是

选项：

- A.邻面聚合角以 $2^{\circ} \sim 5^{\circ}$ 为宜
- B.各轴面角的线角磨圆钝

- C.面磨除一般为 0.5~1.0mm
- D.上颌牙舌尖斜面不必多磨
- E.颈部预备凹形肩台

答案：D

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

金属烤瓷冠的适应证是

选项：

- A.青少年恒牙
- B.冠部短小的磨牙
- C.轻度腭向错位的上前牙
- D.重度深覆
- E.乳牙

答案：C

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

抗力和固位力最佳的修复体类型为

选项：

- A.复面嵌体
- B.3/4 冠
- C.烤瓷冠
- D.铸造全冠
- E.桩核冠

答案：D

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

关于观测线，不正确的是

选项：

- A.是指按共同就位道描画的，用以区分软、硬组织的倒凹和非倒凹的分界线
- B.观测线以下，龈向部分为基牙的倒凹区，观测线以上，向部分为基牙的非倒凹区
- C.在基牙观测线亦可称为基牙的导线
- D.观测线为基牙的解剖外形高点线
- E.观测线是随观测方向改变而改变的外形高点连线

答案：D

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：D

关于铸造 3/4 冠牙体预备的说法中，不正确的是
选项：

- A.消除邻面倒凹
- B.切缘预备使修复体在前伸时无干扰
- C.邻沟的主要作用是防止修复体向脱位
- D.切沟预备是为了防止修复体向脱位
- E.切沟预备可增强固位作用

答案： D

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

上前牙 3/4 冠邻沟的方向为

选项：

- A.与唇面切 1/3 平行
- B.与唇面切 2/3 平行
- C.与唇面龈 2/3 平行
- D.与舌隆突平行
- E.与牙长轴平行

答案： B

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

无牙颌取印模的步骤不包括

选项：

- A.牙槽骨修整
- B.选择托盘
- C.取初印模
- D.制作个别托盘
- E.取终印模

答案： A

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

牙槽嵴过度吸收，导致义齿固位较差，可以采用的方法不包括

选项：

- A.前庭沟加深术
- B.生物材料增高重建牙槽嵴
- C.骨隆突修整术
- D.自体骨移植重建牙槽嵴
- E.改变黏膜和肌肉的附着位置

答案： C

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

牙体缺损修复中增强修复体抗力型的措施不包括

选项：

- A.避免应力集中
- B.增大牙尖斜度
- C.选用强度高的材料
- D.金瓷衔接区远离咬合接触点
- E.充足的修复空间

答案：B

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

在牙体缺损的修复治疗中，关于对牙龈组织的保健，错误的说法是

选项：

- A.修复体要高度磨光
- B.人造冠龈边缘与患牙十分密合
- C.正确恢复牙冠外形高点
- D.修复体龈边缘必须位于龈下
- E.修复体轴面形态有助于对龈组织给予功能性刺激

答案：D

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

上颌 Kennedy 第一类牙列缺损者可以采取单侧分别设计的病例是

选项：

- A.8778 缺失
- B.87645678 缺失
- C.876423678 缺失
- D.873678 缺失
- E.876578 缺失

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

属于特殊结构的固定桥是

选项：

- A.半固定桥
- B.双端固定桥

- C.种植固定桥
- D.单端固定桥
- E.复合固定桥

答案： C

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

口腔健康教育的任务之一是

选项：

- A.探索自来水含氟浓度
- B.推广使用窝沟封闭
- C.专业人员协助领导合理分配有限资源
- D.控制含糖食品的食用次数
- E.引起全社会对口腔健康问题的关注

答案： E

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

口腔流行病学主要研究

选项：

- A.牙病在人群中的分布规律
- B.口腔疾病在人群中的分布规律
- C.口腔疾病和健康规律
- D.口腔疾病的预防规律
- E.口腔保健计划

答案： B

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

口腔医疗保健中由接触传染的主要疾病是

选项：

- A.水痘
- B.麻疹
- C.流行性腮腺炎
- D.念珠菌病
- E.病毒性肝炎

答案： E

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

在X线片上，髓室及根管影像完全消失，不能分辨出髓腔界线表示有选项：

- A.牙髓充血
- B.牙髓炎
- C.弥散性牙髓钙化
- D.牙髓坏死
- E.牙内吸收

答案：C

解析：无

题型：A1型选择题

题目：

急性根尖周炎脓肿切开的主要临床依据是

选项：

- A.扪诊有波动感
- B.剧烈疼痛
- C.根尖区牙龈肿大压痛
- D.体温 38℃ 以上
- E.患牙叩痛明显

答案：A

解析：无

题型：A1型选择题

题目：

慢性根尖周炎的最重要的临床表现是

选项：

- A.深龋洞已穿髓
- B.X线片根尖周透射区
- C.叩痛 (+)、I度松动
- D.热测出现迟缓反应
- E.患牙咬物不适

答案：B

解析：无

题型：A1型选择题

题目：

根尖周炎的主要病因是

选项：

- A.免疫因素
- B.物理因素
- C.化学因素
- D.感染因素
- E.特发因素

答案：D

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

根尖周囊肿的临床表现之一是

选项：

- A.牙髓活力正常
- B.叩诊无异样反应
- C.根尖周叩诊疼痛
- D.根管内溢出黄色清亮液体
- E.X 线片见牙根吸收

答案：D

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

临床上急性化脓性根尖周炎的诊断可分为

选项：

- A.根尖周脓肿、骨髓炎、骨膜下脓肿
- B.根尖周肉芽肿、根尖周脓肿、根尖周囊肿
- C.急性根尖炎、牙槽脓肿、骨膜下脓肿
- D.根尖周脓肿、骨膜下脓肿、黏膜下脓肿
- E.急性根尖炎、慢性根尖炎、慢性牙槽脓肿

答案：D

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

急性根尖周炎应急处理正确除外

选项：

- A.在局麻下进行
- B.开通髓腔，引流根管
- C.穿通根尖孔
- D.有脓肿时切开排脓
- E.输液治疗，消除炎症

答案：E

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

根尖脓肿与骨膜下脓肿鉴别点是

选项：

- A.疼痛程度不同
- B.脓肿部位不同

- C.牙髓有无活力
- D.松动度的有无
- E.扪诊有无波动感

答案： E

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

牙髓塑化治疗不能用于

选项：

- A.成人后牙牙髓炎
- B.成人后牙根尖炎
- C.年轻恒牙根尖炎
- D.成人后牙弯曲根管
- E.年轻人后牙细窄根管

答案： C

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

开口末的弹响是

选项：

- A.翼内肌减弱
- B.翼外肌痉挛
- C.下颌关节亢进
- D.翼外肌亢进
- E.翼内肌亢进

答案： D

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

属于癌前病变的是

选项：

- A.苔藓
- B.糜烂
- C.出血
- D.溃疡
- E.白斑

答案： E

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

双侧唇裂修复的时间为

选项:

- A.1~3月
- B.3~6月
- C.6~12月
- D.1~2岁
- E.2~3岁

答案: C

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

颞下颌关节结构紊乱的常见 X 线表现是

选项:

- A.关节上间隙增宽
- B.关节后间隙变窄
- C.髁突有磨损破坏
- D.关节窝形态异常
- E.关节上腔造影可见造影剂进入关节下腔

答案: B

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

口腔颌面部创伤引起的阻塞性窒息原因中不包括

选项:

- A.咽喉部血凝块
- B.吸入血液或呕吐物
- C.颈部粉碎性骨折致舌后坠
- D.组织水肿压迫呼吸道
- E.上颌骨横断骨折致组织移位

答案: B

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

最易发生牙槽突骨折的部位是

选项:

- A.上颌前牙区
- B.下颌前牙区
- C.上颌后牙区
- D.下颌后牙区
- E.上颌结节区

答案: A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

单侧唇裂整复手术最合适的年龄为

选项：

A. 出生后即可

B. 1~2 个月

C. 3~6 个月

D. 7~10 个月

E. 11~12 个月

答案：C

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

不符合面部疔特点的是

选项：

A. 相邻多个毛囊的急性化脓性炎症

B. 好发于上唇

C. 常伴有剧烈疼痛

D. 一旦出现头痛、恶心、呕吐等症状，或病情危重

E. 女性多于男性

答案：E

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

下列关于普鲁卡因局麻药物的描述哪个是错误的

选项：

A. 偶能产生过敏反应

B. 应用时常加入少量肾上腺素

C. 可做皮内试验检查其过敏反应

D. 穿透性和弥散性较强，可用作表面麻醉和浸润麻醉

E. 麻醉效果确切，毒性和副作用小

答案：D

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

能用一针法麻醉的三条神经是

选项：

A. 下牙槽神经、舌神经、颊长神经

B. 下牙槽神经、咬肌神经、颊长神经

- C.上牙槽后神经、上牙槽中神经、上牙槽前神经
- D.上牙槽后神经、腭前神经、鼻腭神经
- E.下牙槽神经、咬肌神经、舌神经

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

舌神经阻滞麻醉可麻醉

选项：

- A.同侧下颌舌侧牙龈、黏骨膜、口底黏膜及舌前 2 / 3 部分
- B.同侧下颌磨牙舌侧牙龈、黏骨膜、口底黏膜及舌后 2 / 3 部分
- C.同侧下颌前牙舌侧牙龈、黏骨膜、口底黏膜及舌前 2 / 3 部分
- D.同侧下颌前牙及双尖牙舌侧牙龈、黏骨膜、口底黏膜及舌前 2 / 3 部分
- E.同侧下颌舌侧牙龈、黏骨膜、口底黏膜及舌后 2 / 3 部分

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

下唇、口角、舌尖出现麻木表示何种阻滞麻醉显效

选项：

- A.下牙槽神经阻滞麻醉
- B.舌神经阻滞麻醉
- C.颊长神经阻滞麻醉
- D.下颌神经阻滞麻醉
- E.颞神经、切牙神经阻滞麻醉

答案：D

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

麻药中毒治疗原则中不包括

选项：

- A.停止注射
- B.保持呼吸道通畅
- C.针刺入中穴
- D.升压药物
- E.抗惊厥

答案：C

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

下牙槽神经阻滞麻醉时出现面瘫，一般的处理方法为

选项：

- A.注射维生素 B1、B12
- B.局部热敷
- C.局部理疗
- D.口服镇静剂
- E.不作特殊处理

答案： E

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

暂时性牙关紧闭是由于麻药注入

选项：

- A.翼内肌或翼外肌
- B.翼内肌或咬肌
- C.翼外肌或咬肌
- D.翼内肌或颞肌
- E.翼外肌或颊肌

答案： B

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

患者注射局麻药后出现头晕、胸闷，面色苍白，全身冷汗，四肢厥冷无力，脉快而弱，恶心、呼吸困难，甚至意识丧失，多为

选项：

- A.过敏反应
- B.晕厥
- C.中毒
- D.休克
- E.全脊髓麻醉

答案： B

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

患者，男性，27岁。1周前因外伤前牙折断，已经做过根管治疗。检查：左上1冠折，断面在龈上，无叩痛，无松动。牙片显示根充完善，无根折。一般情况下该牙应在根管治疗后至少多长时间进行桩冠修复

选项：

- A.1天
- B.3天
- C.1周

D.2周

E.1个月

答案：B

解析：无

题型：A1型选择题

题目：

患者，25岁。211缺失，间隙正常，要求固定修复，则最佳设计为

选项：

A.12做基牙的双端固定桥

B.323做基牙的双端固定桥

C.3做基牙单端修复 21，2做基牙单端修复 1

D.3做基牙单端修复 21，23做基牙单端修复 1

E.54323做基牙的双端固定桥

答案：B

解析：无

题型：A1型选择题

题目：

口腔医师嘱某患者下颌自然闭合到与上颌牙齿接触，并紧咬，口内检查见所有牙都保持接触。

试问此时该患者下颌所处的位置是

选项：

A.牙尖交错位

B.正中关系位

C.后退接触位

D.最小电位颌位

E.下颌姿势位

答案：A

解析：无

题型：A1型选择题

题目：

女性，56岁。876678缺失，余留牙无松动和疼痛。下列叙述不正确的是

选项：

A.一般选择3~4个基牙，双侧相连

B.可少排一个人工牙，适当减少人工牙的颊舌径

C.尽量减少游离端基托范围

D.在前牙区设置间接固位体

E.邻间隙基牙上可设计RPA、RPI卡环

答案：C

解析：无

题型：A1型选择题

题目：

一患者 32135678 和 65678 缺失，戴用义齿后出现咬舌现象。原因是人工后牙

选项：

- A.覆盖过大
- B.平面偏高
- C.舌侧覆盖过小
- D.舌尖过锐
- E.牙尖斜度过大

答案：C

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

患者，男，65 岁。左下 5678 缺失。为减小义齿游离端水平向移动，以下不正确的是选项：

- A.采用双侧联合设计
- B.缺牙区对侧设计间接固位体
- C.适当减少人工牙的颊舌径
- D.末端基牙设计 RPI 卡环组，减少基牙扭力
- E.选用牙尖斜度大的人工牙

答案：E

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

患者，男性，72 岁。87655678 缺失，余留牙 III 度松动，有广泛的龋齿，牙槽骨吸收至根中 3/5。

下列说法正确的是

选项：

- A.上颌为 Kennedy 第三类第一亚类牙列缺失
- B.活动设计应采用牙支持式
- C.应采用天然牙固定桥修复
- D.可直接采用套筒冠修复
- E.拔除剩余牙，采用全口义齿修复

答案：E

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

患者，男性，78 岁。87655678 缺失，余留牙无明显松动。口底深度大于 8mm，无较大的骨突，缺牙区牙槽嵴吸收，牙槽嵴呈垂直型。不正确的说法是

选项：

- A.下颌为 Kennedy 第一类牙列缺损
- B.可设计舌杆
- C.可设计连续舌杆
- D.舌杆与黏膜应平行接触

E.应设计舌板

答案： E

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

患者，男性，65岁。右上2已行完善根管治疗，选择烤瓷全冠修复。唇侧边缘位置的最佳选择是

选项：

A.龈上

B.平齐龈缘

C.龈沟底

D.龈下2mm

E.龈下0.5mm

答案： E

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

患者，女性，23岁。因全口牙自幼呈黄色，并随年龄加重为深灰色，要求治疗。查：全口牙呈黄至深灰色，由后至前逐渐加重，表面无实质缺损。问诊应重点采集的信息是

选项：

A.幼时居住地

B.母亲妊娠期间用药史

C.是否为早产儿

D.幼时患病用药史

E.幼时患病史

答案： D

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

患者男，56岁。牙槽嵴丰满，初戴全口义齿时，发现正中咬合接触点较少。调磨时应磨的部位是

选项：

A.有早接触的下舌尖

B.有早接触的上颊尖

C.有早接触的支持尖

D.与有早接触的支持尖相对应的中央凹

E.与有早接触的支持尖相对应的牙尖

答案： D

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

患者戴用全口义齿后，说话及张口时义齿不脱落而咀嚼时脱落，分析原因如下，哪项除外选项：

- A. 上后牙排列过于颊侧
- B. 上下第二磨牙有早接触点
- C. 侧方不平衡
- D. 基托边缘过长
- E. 下颌平面过高

答案：D

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

一患者全口义齿初戴时，发现下颌义齿翘动，说明有支点存在，支点位置通常在选项：

- A. 下颌隆突
- B. 磨牙后垫
- C. 唇系带
- D. 牙槽嵴顶
- E. 舌系带

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

男，20 岁。昨夜右侧后牙痛未眠。痛为阵发性，服止痛片无效。查右下 5 牙冠未见龋，叩痛 (-)，不松动，冷刺激引起剧痛。引起该患牙牙髓疾病的最可能原因是

- 选项：
- A. 隐匿龋
 - B. 牙隐裂
 - C. 发育异常
 - D. 楔状缺损
 - E. 咬合创伤

答案：B

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

患者，男，65 岁。全口义齿戴牙后感到下颌牙槽嵴普遍疼痛，较长时间戴用后感颊部肌肉酸痛，上腭部有烧灼感。检查发现口腔黏膜广泛发红，无明显溃疡。正确的处理方法是选项：

- A. 不做处理，嘱坚持戴用
- B. 基托组织面重衬
- C. 重新制作义齿

D.调以去除正中早接触

E.面加高以升高咬合垂直距离

答案： C

解析： 无

题型： A3/A4 型选择题

题目：

患者，男。3 年前行全口修复，使用 1 年后，一颗人工牙完整脱落，同时发现吃食物费力，咬合恶心，出现疼痛，要求诊治。

子题：

选项：

人工牙完整脱落的原因不包括

A.人工牙盖嵴部粘蜡未去净

B.人工牙盖嵴部未磨粗糙

C.人工牙盖嵴部未用单体膨胀

D.人工牙盖嵴部有分离剂

E.人工牙大小不合适

答案： E

解析： 无

子题：

出现疼痛的原因是

选项：

A.牙槽嵴骨尖

B.咬合力过大

C.黏膜有炎症

D.咬合不平衡

E.牙槽嵴吸收致基托边缘过长

答案： E

解析： 无

子题：

咀嚼费力的原因是

选项：

A.患者年龄增加

B.咬合面磨损

C.咬合不平衡

D.咬合疼痛

E.选用的为塑料牙

答案： B

解析： 无

子题：

出现恶心感的原因是

选项:

- A.基托边缘过长
- B.患者年龄过大
- C.基托过厚
- D.垂直距离降低
- E.后牙磨损, 前牙早接触致基托后缘与黏膜间出现间隙

答案: E

解析: 无

子题:

应如何处理

选项:

- A.修复脱落的人工牙
- B.调
- C.修整基托边缘
- D.重衬
- E.返工重做

答案: E

解析: 无

题型: A3/A4 型选择题

题目:

一无牙颌患者, 戴全口义齿一个月后, 自述咀嚼时用力较大, 咀嚼无力。检查可见息止间隙 5 mm, 口角下垂, 鼻唇沟变浅, 颏部前突。

子题:

该义齿存在的问题

选项:

- A.咬合不平衡
- B.正中关系错误
- C.基托与黏膜组织不密合
- D.垂直距离过高
- E.垂直距离过低

答案: E

解析: 无

子题:

患者戴用该义齿后还可能出现的的问题是

选项:

- A.面下 1/3 的距离变短
- B.说话时可出现后牙相撞声
- C.肌肉疲劳
- D.义齿容易脱位

E.以上均不是

答案： A

解析： 无

子题：

针对该患者的最佳处理方法是

选项：

A.基托组织面重衬

B.加高下颌后牙面

C.加高上颌后牙面

D.重新制作义齿

E.以上均不正确

答案： D

解析： 无

题型： A3/A4 型选择题

题目：

某患者，女性，63岁。全口牙列缺失，要求修复。

子题：

若患者对基托材料过敏，应首先推荐哪种修复方法

选项：

A.种植全口义齿

B.活动全口义齿

C.种植体支持的覆盖义齿

D.种植体支持下的固定义齿

E.金属基托的活动义齿

答案： A

解析： 无

子题：

若患者上颌牙槽嵴低平，多次修复义齿固位差，但患者身体状况良好，应选用哪种修复方法

选项：

A.采用全口义齿修复，通过形成良好的磨光面外形增加固位

B.采用种植体固位的覆盖义齿

C.采用种植体固位的套筒冠义齿修复

D.行唇颊沟加深术和牙槽嵴重建术后进行全口义齿修复

E.调整义齿边缘

答案： D

解析： 无

子题：

若发现患者牙槽嵴上有明显的骨尖，应如何处理

选项：

- A.不处理，待其自然吸收
- B.在义齿基托组织面进行缓冲
- C.手术去除
- D.增大基托面积，分散力
- E.减少义齿与对颌牙接触面积

答案：C

解析：无

子题：

若患者上颌前部牙槽嵴被一种松软可移动的软组织所覆盖，应如何处理

选项：

- A.对义齿固位没有影响，不处理
- B.在义齿基托组织面进行缓冲
- C.增大基托面积，提高固位力
- D.减少义齿与对颌牙接触面积，以缓解不适
- E.手术切除

答案：E

解析：无

子题：

患者身体和经济状况良好，但上颌牙槽嵴低平，且腭侧见 2 cm×2 cm 白色损害，此时应如何处理

选项：

- A.直接全口义齿修复
- B.行唇颊沟加深术和牙槽嵴重建术后进行全口义齿修复
- C.采用种植体固位的覆盖义齿
- D.用种植体固位的套筒冠义齿修复
- E.先治疗白色损害，暂不修复

答案：E

解析：无

题型：A3/A4 型选择题

题目：

男，45岁。右下后牙痛就诊。检查发现右下第一磨牙冷诊阳性叩诊阳性，舌尖高陡。X线片见近中根纵折，根周阴影，远中根周未见明显阴影。

子题：

可能的原因是

选项：

- A.外伤
- B.创伤
- C.咬硬物
- D.不良剔牙习惯
- E.牙本质过敏

答案： B

解析： 无

子题：

最佳治疗方法是

选项：

A.牙半切除术

B.分根术

C.断根术

D.拔除换牙

E.根尖切除术

答案： A

解析： 无

题型： A3/A4 型选择题

题目：

患者，男性，69岁。左下后牙自发痛，夜间痛，喝冷水可缓解2天，来诊。检查：左下第一磨牙Ⅱ度松动，远中牙周袋5mm，叩痛(+)。

子题：

为了进一步确诊，还需进行哪项检查

选项：

A.拍X线片

B.CT

C.热测验

D.咬诊

E.叩诊

答案： C

解析： 无

子题：

左下第一磨牙应该诊断为

选项：

A.慢性根尖周炎

B.急性牙周脓肿

C.逆行性牙髓炎

D.急性浆液性牙髓炎

E.急性根尖周炎

答案： C

解析： 无

子题：

该患牙宜采取的治疗方案为

选项：

- A.牙髓治疗
- B.牙周治疗
- C.牙髓治疗+牙周治疗
- D.根尖外科手术
- E.消炎后拔除

答案： C

解析： 无

题型： A3/A4 型选择题

题目：

患者，女，63岁，双侧下颌中切牙松动；左上尖牙残根，左上第一磨牙残冠，拟分次拔除患牙，患者无全身性重大疾病，血压160/90mmHg，心电图正常。

子题：

拔除双侧下颌中切牙时，最适合选用的麻醉为

选项：

- A.2%丁卡因表面麻醉
- B.1%含肾上腺素普鲁卡因局部浸润麻醉
- C.2%含肾上腺素普鲁卡因阻滞麻醉
- D.0.5%利多卡因局部浸润麻醉
- E.0.5%丁卡因表面麻醉

答案： D

解析： 无

子题：

拔除左上尖牙时最适采用的麻醉方法是

选项：

- A.左侧眶下孔和切牙孔阻滞麻醉
- B.唇侧局部浸润麻醉和切牙孔阻滞麻醉
- C.唇、腭侧局部浸润麻醉
- D.左侧上颌结节和腭大孔阻滞麻醉
- E.左侧眶下孔和腭大孔阻滞麻醉

答案： C

解析： 无

子题：

拔除左上第一磨牙残冠时应麻醉的神经是

选项：

- A.眶下神经+腭前神经
- B.上牙槽后神经+鼻腭神经
- C.上牙槽后神经+腭前神经
- D.上牙槽中神经+上牙槽后神经+腭前神经
- E.上牙槽后神经+上牙槽中神经+鼻腭神经

答案： D

解析：无

子题：

不考虑其他因素，如果同时拔除上述牙齿，则设计的最佳顺序为

选项：

- A.左上尖牙，左上第一磨牙，下颌切牙
- B.左上第一磨牙，左上尖牙，下颌切牙
- C.下颌切牙，左上尖牙，左上第一磨牙
- D.下颌切牙，左上第一磨牙，左上尖牙
- E.任意顺序

答案：B

解析：无

题型：A3/A4 型选择题

题目：

【案例一】患者女,22岁,左面部外伤3天。3天前被较大钝器击伤左面部,无昏迷史。检查:生命体征平稳,左面部肿胀明显,眶周明显淤血,鼻梁塌陷,左眼球较对侧内陷,动度差,有复视,左眶下缘可触及明显台阶。

子题：

可能的诊断为

选项：

- A.左颧骨骨折
- B.左上颌骨骨折
- C.鼻骨骨折
- D.左眶底骨折
- E.额骨骨折

答案：C、D

解析：无

子题：

应采用的影像检查方法为

选项：

- A.三维CT
- B.薛氏位片
- C.眶周断层X线片
- D.华氏位片
- E.颌骨曲面断层片

答案：A、C、D

解析：无

子题：

治疗原则及方法

选项：

- A.立刻切开复位固定，复位眼球
- B.伤后 1 周左右切开复位固定，复位眼球
- C.观察,以后二期修复
- D.复位眼球
- E.恢复眶下壁骨质连续性

答案： B、 E

解析： 无

子题：

检查眼球嵌顿的方法为

选项：

- A.患者转动眼球
- B.眼压测量
- C.摄 X 线片
- D.下斜肌牵拉试验
- E.下直肌牵拉试验

答案： E

解析： 无

题型： A3/A4 型选择题

题目：

【案例二】 患者男， 24 岁。因头面部外伤而就诊。

子题：

接诊时应询问患者和（或）家属的问题是

选项：

- A.受伤时间
- B.致伤原因
- C.受伤部位
- D.致伤力大小，作用部位
- E.有无昏迷史

答案： A、 B、 C、 D、 E

解析： 无

子题：

对患者应进行的体检及辅助检查是

选项：

- A.生命体征
- B.眶缘、上颌骨、下颌骨触诊
- C.张口度
- D.咬合关系
- E.头面部 MRI

答案： A、 B、 C、 D

解析： 无

子题:

患者外伤后颌骨骨折伴有脑挫裂伤,应采取的处理方法是

选项:

- A.保持呼吸道通畅,防止脑缺氧
- B.密切观察生命体征
- C.立即清创缝合,颌骨骨折复位内固定
- D.防脑水肿,降低颅压
- E.预防感染

答案: A、B、D、E

解析: 无

子题:

检查发现:患者神志清,自动体位,面中部及左颧部凹陷,复视,左眶下缘可触及台阶感,双耳前区无压痛,张口轻度受限,双侧后牙早接触,前牙开,上牙弓形态正常,上颌骨可活动,下颌无异常动度。可能的诊断为

选项:

- A.颅底骨折
- B.左颧骨骨折
- C.右上颌骨骨折
- D.双侧上颌骨骨折
- E.双侧髁突骨折

答案: B、D

解析: 无

子题:

根据以上诊断可以采用的治疗方法为

选项:

- A.观察,二期行骨折复位固定
- B.颅颌固定
- C.左颧骨骨折切开复位固定
- D.颌间结扎、牵引、固定
- E.双侧上颌骨骨折切开复位固定

答案: B、C、D、E

解析: 无