

- A. 切取活检  
B. 冷冻活检  
C. CT 检查  
D. MRI 检查  
E. PET 检查

34. 常用的局麻药物，属于酯类的是  
A. 利多卡因

- B. 普鲁卡因  
C. 布比卡因  
D. 阿替卡因  
E. 卡波卡因

35. 眼下神经阻滞麻醉时，进针方向是  
A. 垂直向后

- B. 向后外  
C. 向后内  
D. 向后上外  
E. 向后上内

36. 麻醉两侧舌神经后将出现

- A. 舌不能伸出  
B. 舌部诸肌松弛  
C. 舌后 1/3 味觉消失  
D. 舌后 1/3 感觉消失  
E. 舌前 2/3 感觉及味觉消失

37. 与普鲁卡因比较，以下哪项不是利多卡因的特点

- A. 麻醉作用强，用量应比普鲁卡因小  
B. 有较强组织穿透性和扩散性  
C. 维持时间较短  
D. 毒性较大，但可用作表面麻醉  
E. 有抗室性心律失常作用

38. 普鲁卡因过敏的延迟反应最常表现为

- A. 血管神经性水肿  
B. 莖麻疹  
C. 药疹  
D. 哮喘  
E. 过敏性紫癜

39. 下牙槽神经阻滞麻醉是将麻药注入

- A. 咬肌间隙  
B. 翼下颌间隙  
C. 颊间隙  
D. 翼腭间隙  
E. 咽旁间隙

40. 临幊上一般不用作浸润麻醉的药物是

- A. 普鲁卡因  
B. 利多卡因  
C. 布比卡因  
D. 丁卡因  
E. 阿替卡因

41. 临幊上对局麻药中毒的抢救措施不包括

- A. 给氧  
B. 补液  
C. 抗惊厥  
D. 应用激素  
E. 应用降压药

42. 加入局麻药物中的肾上腺素浓度一般

- A. 1 : 1 000  
B. 1 : (3 000~10 000)  
C. 1 : (10 000~30 000)  
D. 1 : (50 000~200 000)  
E. 1 : (500 000~2 000 000)

43. 局麻过程中，为了预防医源性感染，不包括下列哪项措施

- A. 注射点擦干后，用 2% 碘酊消毒  
B. 使用一次性注射器  
C. 避免注射针头被污染  
D. 使用无菌的局麻药液

E. 术前 3 天大剂量运用抗生素

44. 下列关于普鲁卡因局麻药物的描述哪个是错误的

- A. 偶能产生过敏反应  
B. 应用时常加入少量肾上腺素  
C. 可做皮内试验检查其过敏反应

- D. 穿透性和弥散性较强, 可用作表面麻醉和浸润麻醉  
 E. 麻醉效果确切, 毒性和副作用小
45. 下列描述临床常用局麻方法正确的是
- 表面麻醉
  - 表面麻醉、浸润麻醉
  - 表面麻醉、浸润麻醉、阻滞麻醉
  - 冷冻麻醉、表面麻醉、浸润麻醉、阻滞麻醉
  - 针刺麻醉、冷冻麻醉+表面麻醉、浸润麻醉、阻滞麻醉
46. 常用于表面麻醉的是
- 丁卡因
  - 布比卡因
  - 利多卡因
  - 普鲁卡因
  - 阿替卡因
47. 原发性三叉神经痛封闭治疗时选用的局部麻醉药是
- 普鲁卡因
  - 罗哌卡因
  - 丁卡因
  - 布比卡因
  - 卡波卡因
48. 下牙槽神经阻滞麻醉时, 针尖深入组织3.0 cm未触及骨面, 应
- 拔出注射针, 重新注射
  - 退出1.0 cm, 加大进针角度
  - 退出1.0 cm, 减小进针角度
  - 退至黏膜下, 加大进针角度
  - 退至黏膜下, 减小进针角度
49. 上牙槽后神经阻滞麻醉注射法, 注射针与上颌牙的长轴成40°, 向何方向刺入, 进针时针尖沿着上颌结节弧形表面滑动
- 上后外
  - 上前
  - 上后内
- D. 上前外  
 E. 平后内
50. 患者, 女, 70岁。患牙不适半年余要求拔除, 检查: 血压160/95 mmHg, 患牙松动, 叩诊(-), 牙龈无炎症。何时拔牙最妥
- 即刻拔牙
  - 服降压药后即刻拔牙
  - 服药1天后拔牙
  - 服药控制血压后拔牙
  - 服药控制血压后也不能拔牙
51. 患者, 男, 35岁。拔除下颌第一磨牙时, 于牙颈部折断, 断面平齐牙槽嵴。此时, 应采取的取根方法为
- 翻瓣凿骨取根
  - 用丁字挺取根
  - 分根后取根
  - 用根钳取根
  - 用牙挺取根
52. 患者, 25岁。初孕, 妊娠第8周出现牙痛。检查: 右下6牙体破坏大, 需拔除, 消炎后拔除的时间应为
- 1周内
  - 1周后
  - 2周后
  - 3周后
  - 4周后
53. 下列描述不属于种植术并发症的是
- 上颌窦或鼻腔损伤
  - 种植体植入位置不佳
  - 牙龈坏死
  - 创口裂开
  - 神经损伤
54. 正确的牙种植术概念是
- 将未发育完成的牙胚植入牙槽骨内的手术
  - 将人工牙植入牙槽骨内的手术
  - 将异体牙植入牙槽骨内的手术
  - 将自体牙植入牙槽骨内的手术

E. 将脱位牙植入牙槽骨内的手术

55. 在下列间隙感染中, 哪一个最常引起

### 颌骨边缘性骨髓炎

- A. 颞间隙
- B. 咬肌间隙
- C. 下颌下间隙
- D. 颌下间隙
- E. 眶下间隙

56. 急性第三磨牙冠周炎的治疗方法, 中应除外

- A. 局部冲洗上药
- B. 切开引流
- C. 配合口服抗生素
- D. 拔除患牙
- E. 使用漱口液

57. 婴幼儿化脓性颌骨骨髓炎多发生于

- A. 上颌骨
- B. 下颌骨
- C. 颞骨
- D. 颧骨
- E. 鼻骨

58. 咬肌间隙感染最常见的病灶牙是

- A. 下领尖牙
- B. 下领前磨牙
- C. 下领中切牙
- D. 下领侧切牙
- E. 下领磨牙

59. 面部感染逆行常引起颅内哪种严重的并发症

- A. 细菌性脑栓塞
- B. 脑膜炎
- C. 海绵窦血栓性静脉炎
- D. 脑脓肿
- E. 脑炎

60. 哪个间隙感染容易引起严重的张口受限

- A. 舌下间隙
- B. 咬肌间隙

C. 下颌下间隙

D. 眶下间隙

E. 颊下间隙

61. 颜面部疖痈最常见的致病菌为

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 白色葡萄球菌
- C. 溶血性链球菌
- D. 厌氧性链球菌
- E. 铜绿假单胞菌

62. 颜面外伤清创时下述哪项是错误的

- A. 尽量保留软组织
- B. 除去已坏死的组织外, 一般仅将创缘略加修整即可
- C. 唇、鼻、眼睑等重要部位的撕裂伤, 组织大部分游离, 即使没有感染也应去除
- D. 应注意探查有无面神经损伤
- E. 应注意探查有无骨折发生

63. 舌下间隙脓肿口内切开引流时应在

- A. 口底肿胀最明显或波动区处
- B. 舌下皱襞外侧作切口
- C. 舌下皱襞上作切口
- D. 舌下皱襞内侧作切口
- E. 与下颌骨体垂面的方向作切口

64. 化脓性颌骨骨髓炎急性期的X线片表现是

- A. 骨小梁有斑点状吸收
- B. 有骨膜反应
- C. 有死骨形成
- D. 破坏区周围有骨质增生
- E. 颌骨未见明显改变

65. 以下关于口腔颌面部间隙感染的叙述中, 哪项是错误的

- A. 主要为化脓性感染, 也可为腐败坏死性感染
- B. 可沿神经、血管扩散
- C. 常见为牙源性或腺源性感染扩散所致
- D. 初期表现为蜂窝组织炎, 以后可形成脓肿

E.化脓性炎症一般只局限于一个间隙内,不会波及相邻间隙

66. **颊间隙脓肿口内切开**引流时切口设计为

- A.在颊部下颌前庭沟之上作牙槽骨平行切口
- B.腮腺导管口之下作垂直切口
- C.在额部上颌前庭沟之下作水平切口
- D.在下颌前庭沟之上作垂直切口
- E.在上颌前庭沟之下作垂直切口

67.下列哪项不是**中央性颌骨骨髓炎病灶清除术**的指征

- A.经药物治疗、拔牙或切开引流后仍遗留经久不愈的瘘管
- B.X线片可见有死骨形成
- C.可从瘘管探得骨面粗糙
- D.感染发生后1~2周
- E.患者全身情况可耐受手术

68.颌面部创口**初期缝合**最宽时间为

- A.6 h
- B.12 h
- C.24 h
- D.48 h

E.大于48 h的创口,只要没有明显的化脓,清创后仍可作初期缝合

69. **口底多间隙感染**是指

- A.双侧下颌下、舌下间隙感染
- B.双侧下颌下、舌下和頸下间隙感染
- C.双侧下颌下、舌下和頸间隙感染
- D.双侧下颌下、舌下和咽旁间隙感染
- E.双侧下颌下、舌下和翼下颌间隙感染

70. **脓肿切开引流**操作哪项是正确的

- A.最好选择在口外切开,有助于引流
- B.切口应注意勿损伤下颌缘支及领外动脉、面前静脉等
- C.切口的位置选择在脓肿的高位,愈合后瘢痕隐蔽的位置
- D.切开至黏膜下或皮下,可锐性分离扩

大创口

E.颜面部危险三角区的脓肿切开后只能轻度挤压,以保证引流通畅

71.不宜在智齿冠周炎急性期进行的治疗是

- A.镇痛
- B.消炎
- C.建立引流
- D.拔除患牙
- E.对症治疗



配套名师精讲课程

72. **瘘孔中长期排脓,有时可排出死骨片**的领骨骨髓炎的是

- A.新生儿领骨骨髓炎
- B.中央性领骨骨髓炎急性期
- C.中央性领骨骨髓炎慢性期
- D.边缘性领骨骨髓炎增生型
- E.边缘性领骨骨髓炎溶解破坏型

73. **化脓性中央性领骨骨髓炎**绝大多数发生于下颌骨的原因不包括

- A.下颌骨与上颌骨比较,无腔窦,骨外板厚、致密
- B.炎症发生时不易穿破引流
- C.单一血管供应,侧支循环少
- D.血管栓塞后可造成大块骨组织营养障碍及死骨形成
- E.死骨形成的区域小

74. **口腔颌面部脓肿形成后**,主要的治疗措施是

- A.大剂量抗生素
- B.对症治疗
- C.大剂量激素
- D.脓肿切开引流和应用抗生素
- E.局部外敷中药

75. **急性化脓性腮腺炎**的主要致病菌是

- A.链球菌
- B.大肠杆菌
- C.肺炎双球菌
- D.金黄色葡萄球菌

E.白色念珠菌

76.关于结核性淋巴结炎的描述,错误的是

- A.常见于年老、体弱者
- B.淋巴结中央可有干酪样坏死
- C.所形成的脓肿称为冷脓肿
- D.轻者仅有淋巴结肿大而无全身症状
- E.可双侧发生

77.拔牙术引发细菌性心内膜炎的致病菌是

- A.金黄色葡萄球菌
- B.大肠杆菌
- C.甲型溶血性链球菌
- D.乙型溶血性链球菌
- E.肺炎球菌

78.患者,男,29岁。3天前因“右上唇痛”入院治疗,今晨起体温急剧上升达39.5℃,相继出现头痛伴恶心,右球结膜淤血,右眼球前突及眼球运动受限。应考虑并发了

- A.脑膜炎
- B.脑脓肿
- C.败血症
- D.脓毒血症
- E.海绵窦血栓性静脉炎

79.患者,40岁。右下颌剧烈牙痛并放射至耳颞部,同侧面颊部明显红肿、疼痛、下唇麻木、张口受限5日。体温39.6℃,右下颌体、颊部弥漫性肿胀,触痛明显,张口度2cm,右下6残根,叩痛明显,松动I度,龈袋溢脓,白细胞总数 $18\times10^9/L$ ,中性粒细胞90%。最可能的诊断是

- A.急性化脓性根尖周炎
- B.颊间隙感染
- C.咬肌间隙感染
- D.边缘性骨髓炎
- E.中央性骨髓炎

80.患者,男,65岁。因扁桃体癌行放疗

**70 Gy。**放疗后2年出现下颌磨牙区黏膜破溃,牙槽突骨面外露并长期溢脓,牙松动。最可能的诊断是

- A.牙周炎
- B.多间隙感染
- C.放射性颌骨骨髓炎
- D.扁桃体癌复发侵犯颌骨
- E.中央性颌骨骨髓炎

81.患者,女,18岁。5天前出现右下颌智齿冠周炎,已行抗感染治疗3天。检查见开口度正常,智牙正位,远中龈瓣覆盖部分牙面,上领智牙正位萌出。该患者的最佳处理方法是

- A.远中龈瓣切除
- B.拔除下领智牙
- C.同时拔除上、下领智牙
- D.理疗
- E.不处理

82.下列哪个部位的骨折最易引起呼吸道阻塞

- A.颈部正中线状骨折
- B.一侧颏孔区骨折
- C.双侧颏孔区骨折
- D.下颌角部骨折
- E.髁状突骨折

83.颈部软组织损伤时最容易引起什么部位间接性骨折

- A.下领骨髁突
- B.下领骨体部
- C.下领骨升支部
- D.下领骨髁状突
- E.上领骨牙槽突

84.颈部正中粉碎性骨折造成窒息,首选的急救方法为

- A.环甲膜切开
- B.气管切开
- C.牵引舌体至口外
- D.吸氧

E. 骨折复位

85. **舌损伤缝合时**下列哪项不符合要求

- A. 尽量保持舌的长度
- B. 采用小针细线缝合
- C. 距创缘稍远进针
- D. 最好加用褥式缝合
- E. 进针要深些

86. **上颌骨横断骨折时**出现呼吸困难, 应当立即采用筷子、压舌板等横放于下列哪一部位, 将上颌骨向上提吊

- A. 切牙
- B. 尖牙
- C. 前磨牙
- D. 第一磨牙
- E. 第二磨牙

87. **气管切开术**应切开以下哪些气管环

- A. 第 1~2 气管环
- B. 第 2~3 气管环
- C. 第 3~5 气管环
- D. 第 1~5 气管环
- E. 第 5~6 气管环

88. 口腔颌面部挫伤形成较大血肿时, 应进行以下哪一项处理

- A. 尽早进行热敷, 促进血肿吸收或消散
- B. 尽早进行理疗, 促进血肿吸收或消散
- C. 早期切开, 建立引流, 应用抗菌药物控制感染
- D. 无菌条件下, 用粗针头将血液抽出, 然后加压包扎, 应用抗菌药物
- E. 直接加压包扎, 然后应用抗菌药物控制感染

89. 颌骨骨折的**治愈标准**是

- A. 骨性愈合
- B. 纤维性愈合
- C. 骨折线上的牙齿不松动
- D. 恢复原有咬合关系
- E. 无感染发生

90. **颌骨骨折最常见的重要临床体征**是

A. 咬合错乱

- B. 张口受限
- C. 常伴有软组织损伤
- D. 局部肿痛
- E. 流涎

91. **细菌进入创口几小时内**尚未大量繁殖而易于清除

- A. 6~12 小时内
- B. 14 小时内
- C. 20 小时内
- D. 24 小时内
- E. 32 小时内

92. **上颌骨骨折诊断中最有决定意义的症状**是

- A. 鼻腔出血
- B. 数个牙齿折断或错位
- C. 面部肿胀
- D. 上颌骨出现动度和错位
- E. 脑震荡

93. **下颌骨骨折, 骨折段移位**的最主要影响因素是

- A. 咀嚼肌的牵拉作用
- B. 骨折部位
- C. 骨折线走行方向
- D. 骨折段是否有牙
- E. 外力大小与方向

94. **上前牙槽突骨折**, 应用

- A. 单颌牙弓夹板结扎复位固定
- B. 颌间结扎牵引复位固定
- C. 颌间结扎固定
- D. 颌间结扎加颅颌绷带复位固定
- E. 骨间固定加牙弓夹板固定

95. 根据**面神经下颌缘支的行径**, 颌下区的手术切口应

- A. 低于下颌骨下缘 0.5~1 cm
- B. 高于下颌骨下缘 0.5 cm 左右
- C. 低于下颌骨下缘 1.5~2 cm
- D. 平齐下颌骨下缘

E. 低于下颌骨下缘 2 cm 以下

96. 影响 下颌骨骨折段移位的因素 不包括

- A. 骨折部位
- B. 外力大小和方向
- C. 骨折线方向和倾斜度
- D. 出血、软组织肿胀及颌骨本身的重量
- E. 咀嚼肌牵引的力量

97. 关节盘穿孔破裂时弹响杂音 的特点是

- A. 开口初闭口末清脆单声响声
- B. 多声破碎杂音
- C. 一般无弹响杂音
- D. 开口末闭口初清脆单声弹响
- E. 多声清脆弹响

98. 上颌骨骨折出现脑脊液鼻漏或耳漏时,下列哪种做法是错误的

- A. 用消毒棉球填塞鼻腔和外耳道
- B. 姿势引流
- C. 用磺胺嘧啶或氯霉素预防感染
- D. 耳鼻应该消毒并保持干净
- E. 防止咳嗽和打喷嚏

99. 发生颧骨、颧弓骨折必须进行手术复位的指征是

- A. 颌面肿胀
- B. 开口受限
- C. 轻度复视
- D. 眶下区麻木
- E. 轻度面部畸形

100. 面部损伤后,组织水肿迅速发生,易影响呼吸道通畅,甚至引起窒息的部位中不包括

- A. 口底
- B. 舌根
- C. 下颌下区
- D. 颈部
- E. 颧上颌部

101. 患者,女,35岁。领面外伤伴昏迷,

经现场紧急处理后,准备转送医院进一步治疗。运送时患者正确的体位是

- A. 俯卧位
- B. 侧卧位
- C. 仰卧位
- D. 半卧位
- E. 随意体位

102. 患者因外伤所致上颌骨骨折,骨折块向下移位,现场预防窒息的急救处理应是

- A. 紧急从鼻腔气管插管,保持呼吸道通畅
- B. 紧急气管切开
- C. 复位上颌骨骨折块,利用压舌板等物做颅上颌固定
- D. 使用呼吸兴奋剂
- E. 维持患者于头低脚高位

103. 患者,女,45岁。骑车下坡时因制动失灵致面部创伤,伤后昏迷 20 分钟清醒,呕吐 1 次,伴头痛、烦躁等,伤后 60 分钟再度昏迷。查:脉搏、呼吸缓慢,左侧瞳孔散大,左侧肌腱反应亢进。发生颅脑损伤的类型是

- A. 脑震荡
- B. 颅内血肿
- C. 脑脊液漏
- D. 颅底骨折
- E. 脑挫裂伤

104. 患者,男,40岁。24小时前颊部外伤,全层组织缺损约  $3.5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$ 。清创后适合的缝合方式是

- A. 严密缝合口腔黏膜
- B. 严密缝合颊部皮肤
- C. 黏膜、肌、皮肤逐层缝合
- D. 定向拉拢缝合
- E. 将皮肤与黏膜缝合

105. 患者,男。因口腔颌面部创伤致舌体裂伤,出血明显,口底肿胀,来院急诊。最有效合理的止血方法是

- A. 注射止血针

- B. 指压患侧的颈总动脉
- C. 用纱布块填塞止血
- D. 创口缝合止血
- E. 做颈外动脉结扎术

106.患者,男,30岁。因工伤致上颌前部创伤。**现唇部肿胀,上、下前牙无法咬合,上前牙多个牙松动、冠折。**临床考虑上颌前部牙槽突骨折的特征性表现是

- A. 上唇肿
- B. 牙龈撕裂
- C. 创伤区咬合错乱
- D. 相邻牙严重损伤
- E. 邻牙与松动牙一并移动

107.患者,男,45岁。交通事故致头面部创伤。因伴发颅脑损伤而发生了吸入性窒息,当即进行环甲膜切开及插管术,现窒息已基本缓解。**行气管切开术,缝合环甲膜处创口的时间不应超过环甲膜切开术后**

- A. 12小时
- B. 24小时
- C. 36小时
- D. 48小时
- E. 72小时

108.患者,女,29岁。交通事故致颌面部闭合性损伤合并颅脑损伤,**已发生吸入性窒息**,应采取的抢救措施是

- A. 消除口鼻腔分泌物
- B. 牵扯舌体向前
- C. 悬吊上颌骨折块
- D. 气管插管
- E. 气管切开

109.患者,男,18岁。被他人拳击伤及左颧部,**肿胀及疼痛明显,面部皮肤呈青紫色。无张口受限,X线片未见骨折征象。**此种损伤属于

- A. 复合性损伤
- B. 擦伤
- C. 挫伤

- D. 撕裂伤
- E. 撕脱伤

110.患者,女,33岁。上颌前部被硬物撞击,**经X线片检查证实为上颌前部的牙槽突骨折伴牙龈撕裂伤。**该患者不必进行的处理是

- A. 缝合牙龈创口
- B. 局麻下将牙槽突及牙复位
- C. 单颌结扎固定
- D. 有早接触时调磨对颌牙
- E. 颌间结扎

111.患者,男,24岁。**被钝器击打颈部,伤处有明显的皮下淤血和血肿,但未见开放创口。**其确切的诊断是

- A. 钝器伤
- B. 挫伤
- C. 挫裂伤
- D. 擦伤
- E. 撕脱伤

112.可用于**血管瘤硬化治疗**的是

- A. 环磷酰胺
- B. 甲氨蝶呤
- C. 平阳霉素
- D. 长春新碱
- E. 紫杉醇

113.属**发育性囊肿**的是

- A. 甲状腺囊肿
- B. 舌下腺囊肿
- C. 唾液腺囊肿
- D. 皮脂腺囊肿
- E. 根端囊肿

114.由**成釉器星网状层变性发展**而来的颌骨囊肿是

- A. 始基囊肿
- B. 含牙囊肿
- C. 根尖周囊肿
- D. 球上颌囊肿
- E. 牙源性角化囊肿

115.腮腺咬肌区手术后,应使用的绷带类型是

- A.四头带
- B.交叉十字绷带
- C.头部绷带
- D.颌领弹性绷带
- E.石膏绷带

116.最常引起牙根吸收的领骨病变是

- A.角化囊肿
- B.板端囊肿
- C.残余囊肿
- D.成釉细胞瘤
- E.牙源性黏液瘤

117.口底囊肿,囊腔内充满白色豆腐渣样物质,镜下见角化覆层鳞状上皮衬里,囊壁内含有皮肤附属器。最可能的病理诊断是

- A.表皮样囊肿
- B.皮样囊肿
- C.畸胎样囊肿
- D.口底囊肿
- E.蛤蟆肿

118.对放射线不敏感的肿瘤是

- A.未分化癌
- B.恶性淋巴瘤
- C.鳞状细胞癌
- D.恶性淋巴上皮癌
- E.骨肉瘤

119.不属于口腔癌"无瘤"手术要求的是

- A.保证手术在正常组织内进行
- B.避免切破肿瘤,勿挤压瘤体
- C.不宜整块挖出,暴露的肿瘤面覆以纱布、缝包
- D.创口缝合前大量盐水冲洗,化疗药物湿敷

E.创口缝合时更换手套及器械

120.口腔颌面部癌与肉瘤的根本区别是

- A.组织学来源
- B.发病年龄

C.生长方式

D.临床症状

E.对全身的影响

121.成釉细胞瘤的穿刺液常为

- A.淡黄色
- B.不凝的血性液体
- C.清亮的黏液
- D.棕褐色液体
- E.草黄色液体

122.不属于蔓状血管瘤临床表现的是

- A.体位移动试验阳性
- B.表面皮温高
- C.扪诊有震颤感
- D.听诊有吹风样杂音
- E.肿瘤高起呈念珠状

123.关于唇癌的描述错误的是

- A.唇癌主要是鳞癌
- B.唇癌多发于下唇
- C.唇癌一般以手术治疗为主
- D.下唇癌常向颊下及下颌下淋巴结转移
- E.唇癌较其他口腔癌易发生颈淋巴结转移

124.属于临界瘤的是

- A.牙龈瘤
- B.血管瘤
- C.脂肪瘤
- D.淋巴管瘤
- E.成釉细胞瘤

125.癌样基底细胞癌综合征的表现中,不包括

- A.多发性角化囊肿
- B.皮肤基底细胞癌
- C.伴发成釉细胞瘤
- D.小脑镰钙化
- E.分叉肋

126.骨纤维异常增殖症常见的典型X线表现是

- A.呈日光放射状排列的骨刺

- B.大小不等的圆形齿状阴影
- C.不规则骨质破坏
- D.单囊状阴影
- E.毛玻璃样阴影

127. **舌癌**的最好发部位是

- A.舌尖
- B.舌背
- C.舌根
- D.舌腹
- E.舌侧缘

128. **葡萄酒斑状血管瘤**属于

- A.微静脉畸形
- B.海绵状血管瘤
- C.混合型血管瘤
- D.蔓状血管瘤
- E.杨梅状血管瘤

129. 属于**潴留性囊肿**的是

- A.皮脂腺囊肿
- B.皮样囊肿
- C.鳃裂囊肿
- D.表皮样囊肿
- E.甲状腺囊肿

130. 最常见的**领骨上皮性牙源性肿瘤**为

- A.成釉细胞瘤
- B.多形性腺瘤
- C.血管瘤
- D.角化囊肿
- E.淋巴管瘤

131. 以下**不宜行组织活检术的恶性肿瘤**为

- A.舌癌
- B.唇癌
- C.恶性淋巴瘤
- D.恶性黑色素瘤
- E.肉瘤

132. 患者,49岁。因左下牙疼痛2个月,下唇麻木3周就诊。**曲面断层片示左下颌骨体区2cm×3cm的低密度溶骨破坏区,边界**

**不清呈虫蚀状,无死骨形成及新骨增生,最可能的诊断是**

- A.下颌骨骨髓炎
- B.成釉细胞瘤
- C.角化囊肿
- D.含牙囊肿
- E.中央性颌骨癌

133. 某患者X线片显示**右下6残根根尖下方有1.5cm×1.0cm圆形低密度影像,周围包绕致密骨白线**。该病最可能的诊断是

- A.牙源性角化囊肿
- B.根尖周囊肿
- C.成釉细胞瘤
- D.颌骨血管瘤
- E.含牙囊肿

134. **涎腺造影的禁忌证**是

- A.涎腺急性炎症期间
- B.患有出血性疾病
- C.使用抗凝血药物
- D.开口受限
- E.腺体外肿物

135. 关于**黏液腺囊肿治疗**的叙述错误的是

- A.一般采用手术治疗
- B.也可采用非手术治疗
- C.暴露在创口内的黏液腺应予保留
- D.彻底分离,完整摘除囊肿
- E.如与周围粘连,需将粘连组织一并切除

136. **儿童复发性腮腺炎**最常见的发病年龄是

- A.7岁左右
- B.5岁左右
- C.3岁左右
- D.2岁左右
- E.1岁左右

137. 青春期后有**自愈趋势的腮腺疾病**是

- A.急性化脓性腮腺炎