

模拟试卷(一)

规定时间:120分钟

自测时间_____

试题预计完成时间_____

一、最佳选择题

1.在不同单位与部门执业的药师都应该树立的服务理念是  

- A.以患者为中心
- B.提供优质的服务
- C.以消费者为中心
- D.保障公众安全、有效用药
- E.以消费者为中心,主动参与药学服务

2.药师审核处方过程中,发现存在**用药不适宜处方**的处理方法是

- A.拒绝接收处方
- B.调配处方并核发药品
- C.告知处方医师,请其确认或重新开具处方
- D.依照处方调剂并核发药品
- E.拒绝调剂,及时告知处方医师,并应当记录,按照有关规定报告

3.活性成分易被PVC材料吸附而降低药效甚至失效的是  

- A.肾上腺素注射液
- B.阿昔洛韦注射液
- C.紫杉醇注射液
- D.氨茶碱注射液
- E.依托泊苷注射液

4.药师在**审核处方**时,无需要求确认或重新开处方的情形是  

- A.诊断为麻疹,使用阿莫西林抗感染治疗
- B.将酚麻美敏胶囊和板蓝根颗粒开在同一张处方上
- C.给糖尿病患者同时开具消渴丸和格列本脲
- D.头孢曲松钠选用复方氯化钠注射液作溶媒
- E.低分子肝素的给药方法为静脉滴注

5.可用于**倒时差**治疗失眠症的药物是

- A.唑吡坦
- B.佐匹克隆
- C.雷美尔通
- D.低剂量多塞平
- E.米氮平

6.已知1%(g/mL)葡萄糖溶液的冰点降低值为0.091℃。依据冰点降低数据法,计算其**等渗溶液的百分浓度**是

- A.5.1%
- B.5.3%

C.5.5%

D.5.7%

E.5.9%

7.药师应告知医师“**血药浓度监测**是提高治疗效果的重要措施”的实例是

- A.替加色罗存在心绞痛风险
- B.利巴韦林可导致畸胎与肿瘤
- C.阿昔洛韦可致急性肾衰竭
- D.地高辛用于肾功能不全者须依据个体情况调整剂量
- E.含钆造影剂用于肾功能不全者可导致肾源性纤维化和皮肤纤维化

8.患者在药房购买**鱼肝油**,药师应给予

- A.鱼油
- B.维生素A
- C.维生素D
- D.维生素AD
- E.维生素E

9.下列“**给药时间**是依据生物钟规律而设定”的实例中,最正确的是

- A.清晨服用硫酸镁
- B.清晨服用帕罗西汀
- C.餐前服用阿莫西林
- D.餐前服用格列本脲
- E.餐后服用双氯芬酸

10.人体健康参数:体重指数(BMI)正常区间是

- A.18.0~22.0
- B.18.0~23.0
- C.18.5~23.0
- D.18.5~23.9
- E.23.9~27.9

11.为解救**苯巴比妥中毒**的患者,应该加入的药物是

- A.氯化氨注射液
- B.氯化钙注射液
- C.抗坏血酸注射液
- D.碳酸氢钠注射液
- E.维生素B₆注射液

12.双歧三联活菌制剂说明书标明“**冷处**”贮存,其贮存条件是指

- A.温度超过20℃
- B.温度10~30℃
- C.温度不超过20℃且避光
- D.温度不超过-5℃且避光
- E.温度在2~10℃之间

13.ADR因果关系评价结果为“**很可能**”的依据中,与“**肯定**”的依据不同的是  

- A.有文献资料佐证
- B.用药及反应时间顺序合理
- C.排除原患疾病等其他混杂因素影响

- D.停药后反应停止,或迅速减轻,或好转
E.无重复用药史,基本可排除再次用药导致反应发生的可能性

14.妊娠用药后,不会出现畸形胎儿的给药时间是在受精后   

- A.10 天之后
B.18 天之内
C.18 天之后
D.20 天之内
E.28 天之内

15.儿科用药中,对**新生儿或婴儿**最常用的给药途径是

- A.口服给药
B.静脉注射
C.静脉滴注
D.肌肉注射
E.直肠给药

16.因可提高血液携氧量,被长跑运动员用于提高成绩而被列为**兴奋剂管理**的药物是

- A.甲睾酮
B.可卡因
C.哌替啶
D.人促红细胞生成素(EPO)
E.麻黄碱

17.治疗**带状疱疹**宜选用的药物是

- A.拉米夫定
B.金刚乙胺
C.齐多夫定
D.扎那米韦
E.阿昔洛韦

18.**洋地黄毒苷**的半衰期为7天,通常选择   

- A.每日给药1次
B.每日给药3次
C.每周给药1次
D.静脉滴注给药
E.每周给药3次

19.以下药物中,最可能导致**嗜酸性粒细胞增多**的是

- A.泼尼松
B.地塞米松
C.甲基多巴
D.坎地沙坦
E.头孢拉定

20.万古霉素0.5g加入5%葡萄糖注射液100mL中静脉滴注,要求滴注时间不得少于1h。已知每毫升15滴,每分钟最多可滴注的滴数约是   

- A.7 滴
B.15 滴
C.25 滴
D.50 滴
E.60 滴

21.患者,女,33岁。实验室检查:血红蛋白95g/L,临床诊断为**缺铁性贫血**,处方为口服硫酸亚铁片,下列向患者交代的用药注意事项,错误的是

- A.不宜与钙剂同时服用
B.宜空腹服用
C.宜同时补充维生素C
D.不宜同时进食牛奶和蛋类
E.避免应用抑酸药

22.采用**催吐**的方法清除胃内毒物适用于

- A.孕妇
B.食道静脉曲张、胃溃疡出血的病人
C.昏迷状态的病人
D.神志清醒的病人
E.冠心病的病人

23.连续应用**抗菌药物-糖皮质激素眼用制剂**的时间不宜超过   

- A.3 天
B.5 天
C.7 天
D.10 天
E.30 天

24.**急性胰腺炎伴脂质代谢紊乱**的患者不宜静脉滴注的药物是   

- A.胰岛素注射液
B.生长抑素注射液
C.葡萄糖注射液
D.乌司他汀注射液
E.脂肪乳注射液

25.**病毒神经氨酸酶抑制剂**使用的最佳时间是

- A.在流感症状初始时
B.在流感症状严重时
C.在流感症状初始24h内
D.在流感症状初始48h内
E.在流感症状初始72h内

26.用于**紧急避孕**的药物是

- A.左炔诺孕酮
B.黄体酮
C.甲睾酮
D.罗格列酮
E.丁螺环酮

27.治疗**抗肿瘤药**引起的恶心、呕吐等不良反应,可选用的**止吐药**是

- A.奥美拉唑
B.雷尼替丁
C.昂丹司琼
D.维生素B₆
E.茶苯海明

28.下列药物中,适宜在**睡前**服用的是

- A.泼尼松
B.美洛昔康
C.多潘立酮
D.辛伐他汀
E.奥利司他

29.癌症疼痛的治疗,应按照疼痛的程度选用不同阶段的镇痛药物,下列属于**第三阶梯**的镇痛药物是



配套名师课程

- A. 双氯芬酸
B. 塞来昔布
C. 可待因
D. 布桂嗪
E. 吗啡

30. 患者,女,55岁。关节痛半年,临床诊断为**类风湿关节炎**,既往有**十二指肠溃疡病史**,应首选的NSAIDs类药物是

- A. 塞来昔布
B. 吲哚美辛
C. 布洛芬
D. 双氯芬酸
E. 萘普生

31. 治疗**类风湿关节炎**时,必须提醒患者每周用药一次,避免用药过量造成再生障碍性贫血等**药源性疾病**的药物是

- A. 来氟米特
B. 泼尼松
C. 雷公藤
D. 白芍总苷
E. 甲氨蝶呤

32. **癫痫持续状态**首选的治疗方案是

- A. 口服丙戊酸钠 200 mg
B. 静脉注射地西洋 10 mg
C. 静脉注射丙戊酸钠 200 mg
D. 口服地西洋 10 mg
E. 肌内注射地西洋 10 mg

33. 关于**非甾体类抗炎药**选药原则的说法,正确的是  举一 反三

- A. 解除平滑肌痉挛性疼痛可首选非甾体类抗炎药
B. 非甾体类抗炎药可替代抗感染治疗
C. 治疗未明原因的发热可立即应用非甾体类抗炎药
D. 非甾体类抗炎药可用于治疗骨关节炎
E. 非甾体类抗炎药常用于创伤剧痛

34. 伴有神经症状的**巨幼细胞性贫血**患者,在补充**叶酸**的基础上,还应补充

- A. 维生素 B₁
B. 维生素 B₂
C. 维生素 C
D. 维生素 B₆
E. 维生素 B₁₂

35. **妊娠期**妇女服用抗癫痫药**卡马西平**可导致缺乏的维生素是

- A. 维生素 E
B. 维生素 K
C. 维生素 D
D. 维生素 C
E. 维生素 A

36. 下列关于**巨幼细胞性贫血**的说法,错误的是

- A. 老年人和酗酒者为高危人群

- B. 恶性贫血者需要终生维持治疗
C. 可静脉滴注维生素 B₁₂ 100~500 μg, qd.
D. 全胃切除的巨幼细胞性贫血患者需要终生维持治疗
E. 在不确定只是单纯叶酸缺乏引起的贫血时叶酸应联合维生素 B₁₂ 治疗

37. **过量**服用**维生素 D**所发生中毒的典型临床表现是

- A. 骨骼发育不良或骨软化
B. 间质性肾炎或肾结石
C. 骨质疏松症或骨折
D. 横纹肌溶解或肌痛
E. 高尿酸血症或疼痛

38. **痛风**时**尿酸盐结晶**为

- A. 草酸盐结晶
B. 尿酸盐结晶
C. 磷酸盐结晶
D. 酪氨酸
E. 胆红素结晶

39. **秋水仙碱**治疗痛风急性发作期为首选,推荐的首剂量是

- A. 0.5~1 mg
B. 1~2 mg
C. 2~5 mg
D. 5~10 mg
E. 10~20 mg

40. 会干扰乙醇代谢过程导致“**双硫仑样**”反应,用药期间不宜饮酒的药物是

- A. 对乙酰氨基酚
B. 阿奇霉素
C. 阿司匹林
D. 甲硝唑
E. 伊曲康唑

二、配伍选择题

【41~42】

- A. 阿昔洛韦软膏
B. 维 A 酸乳膏
C. 氢化可的松软膏
D. 复方苯甲酸酊
E. 炉甘石洗剂

41. 治疗**水泡型脚癣**宜选用

42. 治疗**中度痤疮**宜选用

【43~45】

- A. 协同作用
B. 拮抗作用
C. 敏感化作用
D. 减少药物不良反应
E. 增加毒性或 ADR

43. **普萘洛尔**联用**硝苯地平**抗高血压的机制是  举一 反三

44. **氢氯噻嗪**减弱**甲苯磺丁脲**降糖作用的机制是  举一 反三

45.排钾利尿药使心脏对强心苷类药物敏感性增强的机制是  

【46~47】

- | | |
|----------------|---------------|
| A.透皮贴剂 | B.中药注射剂 |
| C.肠内营养制剂 | D.茶碱类药物(静脉途径) |
| E.胰岛素(皮下或静脉注射) | |

46.我国高警示药品推荐目录(2015版)中,新遴选加入的药品种类是

47.我国高警示药品推荐目录(2015版)中,源于美国用药安全研究所高警示药品目录的药品种类是

【48~49】

- | | |
|---------|-------|
| A.氯霉素 | B.链霉素 |
| C.洋地黄毒苷 | D.地高辛 |
| E.青霉素 | |

48.肝病合并心功能不全使用强心药时应选用

49.肝病合并痢疾、伤寒时使用何种药物需密切观察血象变化

【50~52】

- | | |
|------|------|
| A.双眼 | B.左耳 |
| C.左眼 | D.右耳 |
| E.右眼 | |

50.处方中外文缩写OD.代表

51.处方中外文缩写OU.代表

52.处方中外文缩写OS.代表

【53~55】

- | | |
|-----------------|-------------|
| A.可出现面部潮红、心慌、头痛 | B.可出现室性心动过速 |
| C.可诱发哮喘 | D.可致耳聋 |
| E.可致头晕、口干、嗜睡 | |

53.应用普萘洛尔

54.同时应用庆大霉素与利尿剂呋塞米

55.应用胺碘酮呋塞米

【56~58】

- | | |
|---------|--------|
| A.米索前列醇 | B.哌仑西平 |
| C.法莫替丁 | D.兰索拉唑 |
| E.多潘立酮 | |

56.属于胃黏膜保护剂的是

57.属于组胺 H₂ 受体拮抗剂的是

58.属于多巴胺 D₂受体拮抗剂的是

【59~61】

- | | |
|------------|-----------|
| A.诊断痛风 | B.诊断心肌梗塞 |
| C.诊断消化性溃疡 | D.诊断急性胰腺炎 |
| E.诊断红细胞增多症 | |

血液生化检查结果的临床意义

59.淀粉酶检查超过正常值

60.血尿酸检查超过正常值

61.肌酸激酶检查超过正常值

【62~64】

- | | |
|------------|----------|
| A.阿托品+碘解磷定 | B.氟马西尼 |
| C.硫代硫酸钠 | D.乙酰半胱氨酸 |
| E.纳洛酮 | |

62.有机磷中毒的解救药物是

63.地西洋中毒的解救药物是

64.阿片类药物中毒的解救药物是

【65~66】

- | | |
|----------------|----------------|
| A.经肝肠循环消除的药物 | B.肾毒性小且经肝排泄的药物 |
| C.肝毒性小且经肾排泄的药物 | D.经肝、肾双途径消除的药物 |
| E.经首过作用消除的药物 | |

65.肝功能不全而肾功能正常患者宜选用的药物是  

66.肾功能不全而肝功能正常患者宜选用的药物是  

【67~68】

- | | |
|-------|-------|
| A.淡橙色 | B.淡绿色 |
| C.淡红色 | D.淡黄色 |
| E.白色 | |

67.儿科处方印刷用纸的颜色是

68.麻醉处方印刷用纸的颜色是

【69~71】

- | | |
|--------|--------|
| A.缬沙坦 | B.美托洛尔 |
| C.利血平 | D.氢氯噻嗪 |
| E.赖诺普利 | |

- 69.适用于高血压合并**糖尿病、肾损害**患者的药物是
70.适用于高血压合并**心绞痛**患者的首选药物是
71.适用于**老年高血压**并发**心力衰竭**患者的利尿剂是

【72~73】

- A.1日
B.3日
C.5日
D.7日
E.10日

- 72.使用**抗感冒药治疗感冒**,连续服用时间不得超过
73.使用**解热镇痛药退热**,连续服用时间不得超过

【74~75】

- A.胰酶
B.莫沙必利
C.胃蛋白酶
D.二甲硅油
E.碳酸氢钠

- 74.**胰腺分泌功能不足**所致消化不良者,可服用的药物是
75.**因蛋白质过多**所致消化不良者,应服用的药物是

【76~78】

- A.维A酸片
B.左旋多巴片
C.地衣芽孢杆菌活菌胶囊
D.非洛地平片
E.去氨加压素片

76.**高蛋白饮食**在肠内产生氨基酸,会影响其吸收、降低疗效的药物是   

77.同服葡萄柚汁可能**升高血药浓度**的药物是   

78.**高脂饮食**可促进其吸收的药物是   

【79~80】

- A.长效 β_2 受体激动剂+吸入型糖皮质激素
B.吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂
C.抗菌药物+短效支气管扩张剂+糖皮质激素
D.吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药
E.吸入型糖皮质激素+祛痰药+镇咳药

79.慢性阻塞性肺病**急性加重期**伴浓痰者宜选用的治疗方案是   

80.慢性阻塞性肺疾病**稳定期**患者宜选用的治疗方案是   

【81~82】

- A.氢氯噻嗪
B.美托洛尔

- C.依那普利
D.维拉帕米

E.哌唑嗪

81.上述抗高血压药的禁忌证为**双侧肾动脉狭窄**的是

82.上述抗高血压药的禁忌证为**心力衰竭**的是

【83~85】

- A.甲硝唑
B.咪康唑
C.头孢曲松钠
D.青霉素钠
E.克拉霉素

83.痒痛明显,阴道检查时发现粘稠的**奶酪样分泌物**,经验治疗首选的药物是

84.阴道检查时发现大量**泡沫样分泌物**,经验治疗首选的药物是

85.阴道分泌物培养为**衣原体**,经验治疗首选的药物是

【86~87】

- A.四环素
B.红霉素
C.青霉素
D.氯霉素
E.头孢唑林

86.易于在乳汁中排出的**弱碱性**抗生素是

87.不易于在乳汁中排出的**弱酸性**抗生素是

【88~90】

- A.复方磺胺甲噁唑
B.头孢克洛
C.诺氟沙星
D.阿莫西林
E.华法林

88.老年人因**血浆蛋白含量低**,用药后游离药物浓度可能明显增加的药物是   

89.可分泌到乳汁中,引起**新生儿黄疸**的药物是   

90.可能影响**儿童骨骼发育**的药物是   

三、综合分析选择题

【91~93】

患者,男,33岁,因胃痛前来就诊。患者自述每次餐后1h左右会有胃痛感,之后会逐渐缓解,近期排便发现大便呈黑色。经医生问诊得知,患者平时工作应酬繁忙,进餐时间不规律。经临床检查,**幽门螺杆菌阴性**,又经胃镜检查后确诊为**胃溃疡**。

91.对于Hp阴性的胃溃疡,治疗方案是   

- A.根除Hp 2周,抑酸2周
B.抑酸4周,维持12周



配套名师课程

- C.根除 Hp 2周,抑酸4~6周
D.抑酸6~8周,维持12周
E.抑酸3周,维持10周

92.为减轻病人胃黏膜损害症状的进一步加重,可给予患者餐前服用  

- A.枸橼酸铋钾
B.地塞米松
C.多潘立酮
D.硫酸钡
E.阿仑膦酸钠

93.对于该患者,医生叮嘱错误的是  

- A.规律进餐
B.戒烟戒酒
C.限制食用酸性食物
D.不能随意停药
E.奥美拉唑应选择餐后服用



配套名师课程

【94~95】

患者,女,45岁。身高160cm,体重75kg,临床诊断为2型糖尿病,实验室检查:空腹血糖8.7mmol(正常值:3.9~6.1mmol/L),餐后2h血糖15.1mmol/L(正常值<7.6mmol/L),糖化血红蛋白7.1%(正常值4.8%~6.0%)。经饮食控制、规律锻炼,血糖控制仍未达到理想水平。

94.该患者糖尿病治疗,应首选的药物是

- A.胰岛素
B.格列齐特
C.二甲双胍
D.胰岛素+二甲双胍
E.罗格列酮+二甲双胍

95.该患者经治疗2周后,空腹血糖恢复正常,餐后血糖仍未达标,最适宜加用的降糖药物是

- A.磺酰脲类
B.噻唑烷二酮类
C.双胍类
D.胰岛素
E.α-葡萄糖苷酶抑制剂

【96~97】

患者,男,54岁。肝硬化病史5年,1年前腹部疼痛加重,1周前发现血性腹水,诊断为肝癌晚期,入院治疗。

96.患者疼痛难以耐受,严重影响日常生活,以下首选的镇痛药物是

- A.吗啡
B.哌替啶
C.曲马多
D.可待因
E.美沙酮

97.应用镇痛药物的原则不包括

- A.应根据患者的年龄、性别、身高、体重等严格控制用药剂量,防止不良反应的发生

- B.口服给药,尽可能避免创伤性给药
C.按阶梯给药,针对不同的疼痛程度选择药物
D.对于轻度疼痛者首选非甾体抗炎药,对于中度疼痛者应选用弱阿片类药物
E.用药应个体化,剂量应根据患者需要由小到大

【98~99】

患者,女,68岁,体重54kg。因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院,入院后生化检查ALT 20IU/L,血肌酐(Sc_r)1.8mg/dl,痰培养为铜绿假单胞菌,临床选用头孢他啶。查询头孢他啶药品说明书,成人常用剂量为1日1.5~6g,分2~3次给药;肌酐清除率为31~50mL/min时,剂量为每12h1g;肌酐清除率16~30mL/min时,剂量为每24h1g;肌酐清除率6~15mL/min时,剂量为每24h0.5g;肌酐清除率≤5mL/min时,剂量为每48h0.5g。

98.成年男性的肌酐清除率计算公式为 $Cc_r = \frac{(140 - \text{年龄}) \times \text{体重}}{72 \times Sc_r}$,成年女性的肌酐清除率为男性的0.85。该患者的肌酐清除率约是  

- A.25.5 mL/min
B.30 mL/min
C.34 mL/min
D.40 mL/min
E.47.2 mL/min

99.该患者头孢他啶的剂量应为  

- A.每8h2g
B.每12h1g
C.每24h0.5g
D.每24h1g
E.每48h0.5g

【100~102】

患者,男,38岁。因“发作性喘息”3个月入院,发作时憋喘、全身大汗、全身发绀、端坐不能平卧,肺部可闻及哮鸣音。诊断为支气管哮喘,静脉滴注地塞米松。

100.患者支气管哮喘急性发作,此时应给予的治疗是  

- A.吸入沙美特罗
B.口服孟鲁司特
C.吸入噻托溴铵
D.吸入沙丁胺醇
E.吸入布地奈德

101.药师应教育患者不得擅自增加用药剂量,否则可引起下列哪个症状,从而导致心

律不齐  

- A.低镁血症
B.低钙血症
C.高钠血症
D.高钾血症

E.低钾血症

102.现用“沙美特罗/氟替卡松 50/250”每次1吸,每日2次,已4个月,症状缓解。近

2周来,每周均有1次发作。此时应采取的**最佳措施**是 **举一反三**

- A.改用地塞米松静注
- B.改用泼尼松口服
- C.加用抗 IgE 治疗
- D.加用白三烯受体阻断剂
- E.碳酸氢钠口服

【103~105】

患者,女,62岁。医师处方如下:

姓名	xxx	性别	女	年龄	62岁
临床诊断	—				
2型糖尿病	二甲双胍片 0.25 g×48×3 盒/0.5 g tid. po 餐中				
高血压2期	阿卡波糖片 50 mg×30×3 盒/50 mg tid. po 与第一口饭同服				
高血脂	氯吡格雷片 750 mg×7×4 盒/750 mg qd. po 清晨				
PCI术后	氨氯地平片 5 mg×7×4 盒/5 mg tid. po 餐后				
	辛伐他汀片 20 mg×7×4 盒/20 mg qd. po 清晨				

103.本处方中,**给药次数**错误的是

- A.二甲双胍
- B.阿卡波糖
- C.氯吡格雷
- D.氨氯地平
- E.辛伐他汀

104.本处方中,**单次给药剂量**错误的是

- A.二甲双胍
- B.阿卡波糖
- C.氯吡格雷
- D.氨氯地平
- E.辛伐他汀

105.本处方中,**给药时间**错误的是

- A.二甲双胍
- B.阿卡波糖
- C.氯吡格雷
- D.氨氯地平
- E.辛伐他汀

【106~108】

患者,男,56岁。有高血压病史4年。体检:血压 156/96 mmHg,无主动脉狭窄。医师处方**依那普利**控制血压。

106.该患者若长期服用**依那普利**片,除应监测血压、心、肾功能外,还应监测的指标是

- A.血钾
- B.血钠
- C.血钙
- D.血氯

E.血镁

107.该患者用药过程中可能发生的典型**不良反应**是

- A.低血糖
- B.光过敏
- C.干咳
- D.水肿
- E.口干

108.根据患者病情,合并使用能够减少上述不良反应发生的是

- A.美托洛尔
- B.阿司匹林
- C.氧氟沙星
- D.甲氧氯普胺
- E.肝素

【109~110】

患者,女,45岁。一年前临床诊断为**室上性心动过速**,服用美托洛尔片 25 mg bid.,近日因反复胃痛就诊。胃镜检查诊断为**胃溃疡**,**幽门螺杆菌阳性**,医师处方:埃索美拉唑镁肠溶片 20 mg bid.,甲硝唑片 0.4 g bid.,克拉霉素片 50 mg bid.,枸橼酸铋钾胶囊 0.6 g bid.。

109.该处方中,**给药剂量**错误的药物是 **举一反三**

- A.埃索美拉唑镁肠溶片
- B.克拉霉素片
- C.甲硝唑片
- D.枸橼酸铋钾胶囊
- E.美托洛尔片

110.该患者如长期服用**埃索美拉唑镁肠溶片**,可能会导致 **举一反三**

- A.维生素 A 缺乏
- B.维生素 B₂ 缺乏
- C.维生素 B₁₂ 缺乏
- D.维生素 B₆ 缺乏
- E.维生素 D 缺乏

四、多项选择题

111.药学服务的对象中**重要人群**包括

- A.用药周期长的慢性病患者,或需长期甚至终身用药者
- B.患有多种疾病,病情和用药复杂,需同时合并应用多种药物者
- C.过敏体质者
- D.应用普通给药途径、普通剂型的患者
- E.老年人、小儿、妊娠及哺乳期妇女

112.药师进行药学服务应具备的**专业技能**包括

- A.患者教育技能
- B.沟通技能
- C.疾病诊断技能
- D.药历书写技能
- E.药物警戒技能

113.完整处方的组成包括

- A.处方标题
- B.处方前记
- C.处方正文
- D.处方后记
- E.处方附记

114.可用于提高老年人用药依从性的措施有

- A.选择简化的用药方案
- B.使用分时药盒
- C.优先选用注射剂
- D.进行用药指导
- E.告知家长帮助督导

115.可以合并用药的情况包括

- A.提高药物的治疗效果
- B.减少药物的不良反应
- C.延缓病原菌耐药性的产生
- D.为医院获取经济效益
- E.一个病人患有多种疾病

116.给药方案制定和调整的基本步骤和方法包括

- A.首先获取患者的基本信息
- B.按群体参数设计初始给药方案,并用此方案进行治疗
- C.评估患者用药期间的药效学和药动学
- D.必要时,按所测个体数据重新设计或调整给药方案
- E.实施调整后的给药方案和新的给药方案,并再次评估



配套名师课程

117.口腔溃疡治疗的用药注意事项与患者教育包括

- A.溃疡数目多、面积大且频繁发作者适宜应用灼烧法
- B.使用甲硝唑口腔粘贴片治疗期间,不得饮酒或含酒精的饮料
- C.口腔内真菌感染者禁用地塞米松粘贴片
- D.使用氯己定含漱液后至少间隔 30 min 才可刷牙
- E.保持口腔清洁卫生

118.药源性疾病的治疗原则包括

- A.停用致病药物
- B.加快致病药物排出
- C.使用拮抗剂
- D.调整治疗方案
- E.对症治疗

119.下列情形应判定为超常处方的有

- A.无适应证用药
- B.无正当理由开具高价药
- C.无正当理由超说明书用药
- D.使用药品通用名开具处方药
- E.无正当理由为同一患者同时开具 2 种以上药理作用机制相同的药物

120.儿童用药剂量的根据有

- A.儿童的年龄
- B.儿童的体重
- C.儿童的身高
- D.儿童的体表面积
- E.按成人剂量折算

模拟试卷(二)

规定时间:120 分钟

自测时间 _____

试题预计完成时间 _____

一、最佳选择题

1. 痛风急性发作期应禁用的药物是

- A. 碳酸氢钠
B. 别嘌醇
C. 秋水仙碱
D. 布洛芬
E. 吲哚美辛

2. 治疗骨质疏松症,应用钙剂注意事项不正确的是

- A. 补钙的同时宜补充维生素 D, 维生素 D 是有效吸收钙所必需的
B. 补充钙应选用含量高、生物利用度好、制剂浓度高的药物
C. 钙制剂与肾上腺皮质激素、异烟肼、四环素或含铝抗酸药合用, 会减少钙的吸收, 同时也影响异烟肼、四环素的吸收, 不宜同服, 与铁剂合用时, 可使铁剂的吸收减少
D. 食物尤其是蔬菜和水果含有较多的草酸和磷酸盐, 与钙制剂同时服用, 可增加钙的吸收
E. 阳光可参与制造维生素 D, 运动有助于保持骨骼强壮, 也利于钙和维生素 D 的吸收, 因此, 每日应进行有规律的和适宜的运动

3. 患者, 男, 70 岁。近期发生骨痛、疲乏、驼背, 临床诊断为老年性骨质疏松症, 该患者不宜选用的药物是

- A. 降钙素
B. 维生素 D
C. 阿仑膦酸钠
D. 碳酸钙
E. 雷洛昔芬

4. 患者, 女, 27 岁。妊娠 20 周, 出现发热, 体温最高达 38.5 °C。体格检查: 肾区叩痛, 经相关实验室检查, 诊断为急性肾盂肾炎, 宜选用的药物是

- A. 甲硝唑
B. 头孢噻肟钠
C. 阿米卡星
D. 阿奇霉素
E. 诺氟沙星

5. 下列关于甲状腺功能减退患者激素替代治疗的说法, 错误的是

- A. 需要终身服药
B. 服用过量可能出现甲状腺激素功能亢进症状
C. 左甲状腺素应于早餐前半小时空腹服用
D. 妊娠期妇女必须联合使用丙硫氧嘧啶

E. 治疗目标是将 TSH 和甲状腺激素水平恢复到正常范围内

6. 下列哪个不是糖尿病患者的典型症状

- A. 多尿
B. 体重减轻
C. 多饮
D. 多食
E. 视力下降

7. 温度在 2 °C 以上时, 温度越低, 对多数药品保管越有利。以下药品宜冷处贮存但不应冷冻的是

- A. 双歧三联活菌制剂
B. 降钙素鼻喷雾剂
C. 破伤风抗毒素
D. 降纤酶注射剂
E. 链激酶

8. 容易通过被动扩散透过胎盘屏障的药物特点是

- A. 分子量大、弱碱性
B. 弱酸性、蛋白结合率低、半衰期长
C. 脂溶性高、分子量小
D. 蛋白结合率高, 具有手性、分布容积大
E. 蛋白结合率高, 分子量大

9. 可消除参赛人员的紧张情绪, 提高射击等项目运动员成绩的兴奋剂是

- A. 麻黄碱
B. 促红细胞生成素
C. 苯丙酸诺龙
D. 普萘洛尔
E. 可卡因

10. 对 2 型糖尿病表现为单纯餐后血糖高, 空腹和餐前血糖水平不高者可首选的药物是

- A. 二甲双胍
B. 阿卡波糖
C. 罗格列酮
D. 尼莫地平
E. 碘塞罗宁

11. 易进入乳汁, 并可抑制哺乳婴儿甲状腺功能的药物是

- A. 甲睾酮
B. 甲巯咪唑
C. 甲苯磺丁脲
D. 甲硝唑
E. 甲基多巴

12. 下列关于癌痛患者的镇痛药物使用原则, 错误的是

- A. 按患者疼痛程度分阶段给药
B. 按时给药, 而不是按需给药
C. 提倡无创的给药方式
D. 用药须个体化
E. 疼痛时用药, 不疼痛时不给药

13. 可作为根除幽门螺杆菌感染的一线治疗方案是

- A. 埃索美拉唑 20 mg bid. + 克拉霉素 500 mg qd. + 阿莫西林 0.5 g tid.

- B.埃索美拉唑 20 mg bid.+克拉霉素 500 mg tid.+枸橼酸铋钾 0.6 g bid.
 C.埃索美拉唑 20 mg qd.+阿莫西林 1.0 g qd.+枸橼酸铋钾 0.6 g qd.
 D.埃索美拉唑 20 mg bid.+克拉霉素 500 mg bid.+阿莫西林 1.0 g bid.+枸橼酸铋钾 0.6 g bid.
 E.埃索美拉唑 20 mg tid.+克拉霉素 500 mg tid.+阿莫西林 1.0 g tid.+枸橼酸铋钾 0.6 g tid.

14.在使用左旋多巴时,饮食方面应注意

- A.避免同时进食蛋白质类食物
 B.同时补充蛋白质类食物
 C.避免同时进食淀粉类食物
 D.避免同时进食脂肪类食物
 E.同时补充脂肪类食物

15.患者,男,70岁。右手抖动和行走缓慢3个月,经过神经科检查后诊断为帕金森病,既往前列腺肥大史3年,临床上对该患者不宜选用

- A.苯海索
 B.左旋多巴
 C.多巴丝肼
 D.司来吉兰
 E.金刚烷胺

16.下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法,错误的是

- A.抗抑郁药起效较快,使用1周后可判定疗效
 B.应尽可能单一用药,足量、足疗程治疗
 C.剂量递增,应可能采用最小有效剂量,使不良反应减至最小
 D.当单药治疗无效时,可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药
 E.SSRIs类抗抑郁药不宜与单胺氧化酶抑制剂联合使用

17.5-羟色胺再摄取抑制剂若与单胺氧化酶抑制剂同服时可能出现5-羟色胺综合征,严重者可致死亡。二者交替使用的时间间隔应不少于

- A.2日
 B.4日
 C.7日
 D.10日
 E.14日

18.胃食管反流症的患者应避免使用的药物是

- A.阿司匹林
 B.阿仑膦酸钠
 C.特拉唑嗪
 D.美托洛尔
 E.多潘立酮

19.为减少共济失调、幻觉及“宿醉现象”,老年失眠患者宜选用

- A.苯巴比妥
 B.劳拉西泮

C.佐匹克隆
 D.水合氯醛

E.地西洋

20.根据《中国成人超重和肥胖症预防控制指南》,体重指数(BMI)判断为肥胖的标准是

- A.BMI≤18.5
 B.BMI≥28.0
 C.BMI≤21.5
 D.BMI≥24.0
 E.BMI≥25.0

21.下列关于脑梗死急性期药物治疗的说法,正确的是

- A.急性脑梗死的溶栓治疗时间窗是48h
 B.血小板计数 $<100 \times 10^9/L$ 时应禁用溶栓药
 C.甘油果糖脱水作用较甘露醇强且快
 D.应在使用溶栓药的同时联合使用阿司匹林
 E.应在使用溶栓药的同时联合使用抗凝药

22.老年人使用可导致甲状腺功能异常、肺毒性或Q-T间期延长,不宜作为心房颤动一线用药的是

- A.福辛普利
 B.地高辛
 C.美托洛尔
 D.胺碘酮
 E.华法林

23.结核病的主要感染途径是

- A.经消化道进入体内
 B.经皮肤感染
 C.泌尿生殖系统感染
 D.呼吸道感染
 E.通过性行为感染

24.患者,男,57岁。因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊。经流行病学调查及相关实验室检查,诊断为H1N1甲型流感。该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是

- A.金刚烷胺
 B.金刚乙胺
 C.奥司他韦
 D.利巴韦林
 E.阿昔洛韦

25.房颤患者若需控制心室率,可使用的药物是

- A.胺碘酮
 B.地高辛
 C.达比加群酯
 D.阿司匹林
 E.奎尼丁



配套名师课程

26. 冠状动脉粥样硬化心脏病患者,如没有用药禁忌证,欲服用阿司匹林作为一级预防,最佳剂量范围是

- A. 25~50 mg/d
B. 25~75 mg/d
C. 75~150 mg/d
D. 150~300 mg/d
E. 300~500 mg/d

27. 对反复发作的短暂性脑缺血发作患者首选

- A. 阿司匹林
B. 华法林
C. 巴曲酶
D. 辛伐他汀
E. 氟桂利嗪

28. 下列关于烫伤救治措施的说法,正确的是

- A. 创面及时外涂甲紫溶液预防感染
B. I 度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏
C. 可用清洁塑料薄膜覆盖创面,以防创面感染
D. 烫伤患者的镇痛、镇静药物首选氯丙嗪
E. 失水较多的患者应多饮白开水或无盐饮料

29. 为了防止药源性疾病发生,开具处方他汀类调节血脂药时,应该询问病人

- A. 是否有肺功能不全
B. 是否有兴奋和耳鸣现象
C. 是否有肌无力和肌肉触痛
D. 是否有荨麻疹和其他过敏反应
E. 是否有视物不清

30. 他汀类调节血脂药物的主要作用机制是

- A. 阻止胆固醇从肠道吸收
B. 降低甘油三酯酶活性
C. 抑制 HMG-CoA 还原酶
D. 抑制游离脂肪酸释放
E. 激活脂蛋白酯酶活性

31. 患者,男,28 岁。2 天前因淋雨后出现发热,体温最高达 39℃,经实验室和胸片检查,临床诊断为社区获得性肺炎,无其他基础疾病,可首选的抗菌药物是

- A. 头孢拉定
B. 阿米卡星
C. 亚胺培南-西司他丁
D. 头孢哌酮-舒巴坦
E. 甲硝唑

32. 患者,男,80 岁。因发热、咳嗽、咳痰 2 天就诊。诊断为社区获得性肺炎,给予左氧氟沙星、甘草合剂、氨溴索、对乙酰氨基酚、维生素 C 等治疗。患者用药 3 天后出现失眠、烦躁不安等症状,最可能引起该症状的药物是

- A. 甘草合剂
B. 氨溴索

C. 对乙酰氨基酚

D. 左氧氟沙星

E. 维生素 C

33. 以下“规范应用白三烯受体阻断剂治疗慢阻肺疾病”的叙述中,不正确的是

- A. 不宜用于急性发作
B. 不宜首选治疗急性哮喘
C. 不宜突然代替糖皮质激素
D. 不适用于轻、中度哮喘和稳定期的控制
E. 不适用于解除哮喘急性发作时的支气管痉挛

34. 轻度冻疮患者可以选用的非处方药是

- A. 维 A 酸软膏
B. 樟脑软膏
C. 红霉素软膏
D. 杆菌肽软膏
E. 洗必泰软膏

35. 阿尔茨海默病患者应该避免使用的药物是

- A. 美金刚
B. 卡巴拉汀
C. 颠茄
D. 多奈哌齐
E. 加兰他敏

36. 药师在指导患者合理用药时,应同时关注药物、食物和膳食补充剂的相互影响。下列合用方式合理的是

- A. 左甲状腺素与钙剂同服
B. 硫酸亚铁与维生素 C 同服
C. 华法林与人参同服
D. 异烟肼与牛奶同服
E. 利福平与脂肪餐同服

37. Q-T 间期延长的荨麻疹患者不宜选用的抗过敏药是

- A. 氯苯那敏
B. 色甘酸钠
C. 苯海拉明
D. 异丙嗪
E. 依巴斯汀

38. 良性前列腺增生症的老年患者服用抗过敏药后可致的严重不良反应是

- A. 急性尿潴留
B. 严重高血压
C. 慢性荨麻疹
D. 急性胰腺炎
E. 血管性水肿

39. 患者,女,53 岁,上腹痛、腹泻、消瘦 1 年。大便常规有大量脂肪球,X 线腹平片显示上腹中部多发钙化点。对其宜选用的药品是

- A. 酵母
B. 胰酶
C. 乳酶生
D. 硫糖铝
E. 布洛芬



40. 下列关于**甲状腺功能亢进症**患者教育的说法, 错误的是

- A. 禁食富含碘的食物
- B. 避免使用含碘药物
- C. 妊娠伴甲状腺功能亢进症患者首选甲硫咪唑
- D. 避免饮用咖啡等兴奋性饮料
- E. 给予充足的热量、蛋白质和维生素

二、配伍选择题

【41~42】

- A. 红细胞/血红蛋白减少
- B. 中性粒细胞增多
- C. 嗜酸性粒细胞增多
- D. 血小板增多
- E. 嗜碱性粒细胞减少

41. **细菌**感染患者可出现   

42. **过敏性**疾病患者可出现   

【43~45】

- A. $(4.0 \sim 5.5) \times 10^{12}/L$
- B. $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9/L$
- C. $0.50 \sim 0.70 (50\% \sim 70\%)$
- D. $120 \sim 160 g/L$
- E. $(100 \sim 300) \times 10^9/L$

43. **成人末梢血白细胞计数**参考范围是

44. **男性红细胞计数**参考范围是

45. **血小板计数**参考范围是

【46~48】

- A. 维生素 AD
- B. 复合维生素 B
- C. 维生素 C
- D. 维生素 E
- E. 维生素 K

46. 可用于**紫癜**辅助治疗的药物是

47. 可用于治疗**夜盲症**的药物是

48. 可用于治疗**口腔溃疡**, 大剂量服用后, **尿液可能呈黄色**的药物是

【49~51】

- A. 2~3 个半衰期给药 1 次
- B. 每日给药 1 次
- C. 每个半衰期给药 1 次
- D. 静脉滴注给药
- E. 每日给药 3 次

临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径

49. 半衰期**大于 24 h** 的药物, 通常选择

50. 半衰期**小于 30 min** 且**治疗指数低**的药物, 通常选择

51. 半衰期**12 h** 的药物, 通常选择

【52~53】

- A. 维生素 AD
- B. 维生素 C
- C. 复合维生素 B
- D. 葡萄糖酸钙
- E. 硫酸亚铁

52. 孕妇过量服用可**诱发新生儿坏血病**的药物是

53. 可**减慢肠蠕动**, 引起**便秘并非黑便**的药物是

【54~55】

- A. 清晨
- B. 餐前
- C. 餐中
- D. 餐后
- E. 睡前

54. **阿莫西林胶囊**的适宜服药时间是

55. **阿卡波糖片**的适宜服药时间是

【56~57】

- A. 咀嚼片
- B. 舌下片
- C. 含漱剂
- D. 阴道栓剂
- E. 鼻用喷雾剂

56. 用药后**30 min 内不宜吃东西或饮水**的剂型是

57. 用药后**不宜马上吃东西或饮水**的剂型是

【58~60】

- A. 胰岛素
- B. 二甲双胍
- C. 格列喹酮
- D. 瑞格列奈
- E. 阿卡波糖

58. **餐时血糖显著升高**患者宜选用

59. **围手术期糖尿病**患者宜选用

60. **糖尿病肾病**患者宜选用

【61~62】

- A. 伏立康唑片
- B. 甲硝唑栓
- C. 莫匹罗星软膏
- D. 吡喹酮
- E. 硝酸咪康唑栓

61. 治疗**滴虫性**阴道炎首选的药物是

62. 治疗**真菌性**阴道炎首选的药物是

【63~64】

- A. 解离度大
- B. 呈弱碱性
- C. 呈弱酸性
- D. 在母体血浆中处于结合状态
- E. 在脂肪与水中都有一定的解离度

63. **红霉素**易在乳汁中分布的机制是

64. **华法林**不会在乳汁中分布的机制是

【65~66】

- A. 酞丁安滴眼液
- B. 色甘酸钠滴眼液
- C. 氧氟沙星滴眼液
- D. 羟甲基纤维素钠滴眼液
- E. 毛果芸香碱滴眼液

65. 治疗**过敏性结膜炎**可选用的药物是   

66. 缓解**视疲劳**可选用的药物是   

【67~69】

- A. 青霉素
- B. 乙酰胺
- C. 纳洛酮
- D. 维生素 K₁
- E. 解磷定

67. **有机磷**中毒的特效解毒剂是

68. **氟乙酰胺**中毒的特效解毒剂是

69. **香豆素类杀鼠药**中毒的特效解毒剂是

【70~71】

- A. 西地碘含片
- B. 替硝唑含漱液
- C. 地塞米松粘贴片
- D. 氯己定含漱液
- E. 左旋咪唑片

70. 频繁应用可引起**局部组织萎缩**的药物是

71. 伴有**甲状腺功能亢进症**的**口腔溃疡**患者应避免使用的药物是

【72~74】

- A. 动脉注射
- B. 静脉注射
- C. 肌内注射
- D. 腔内注射
- E. 口服给药

72. 用于**晚期不宜手术或复发**的局限性肿瘤的适宜给药途径是   



配套名师课程

73. 抗肿瘤药最常用的给药途径是   

74. 用于**癌性胸水**的适宜给药途径是   

【75~76】

- A. 洛伐他汀
- B. 辛伐他汀
- C. 阿托伐他汀
- D. 依折麦布
- E. 非诺贝特

75. **高三酰甘油血症**患者应首选的药物是

76. **中成药血脂康**中含有的化学成分是

【77~78】

- A. 卡维地洛
- B. 氢氯噻嗪
- C. 呋塞米
- D. 比索洛尔
- E. 地高辛

77. 患者**心力衰竭**症状加重而发生**水钠潴留**时,应选用的利尿剂是

78. 患有**轻度体液潴留**,伴有**高血压**而**肾功能正常**的**心力衰竭**患者,应选用的利尿剂是

【79~80】

- A. 依那普利
- B. 氢氯噻嗪
- C. 美托洛尔
- D. 氨氯地平
- E. 哌唑嗪

79. 高血压伴**低钾**血症患者慎用的药物是

80. 高血压伴**高钾**血症患者慎用的药物是

【81~83】

- A. 蛋白酶抑制剂
- B. 单胺氧化酶抑制剂
- C. 止咳糖浆
- D. 氨基糖苷类
- E. 硫酸镁

81. 为避免结石的产生,服用时宜**多喝水**的药物是   

82. 与咖啡合用可造成**过度兴奋**,**血压升高**的药物是   

83. 用药后应**限制饮水**的药物是   

【84~85】

- A. 羟甲唑啉
- B. 苯丙哌林
- C. 克仑特罗
- D. 羧甲司坦
- E. 盐酸吗啡



配套名师课程

84.以刺激性干咳或阵咳症状为主的患者宜选用

85.对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的患者宜选用

【86~88】

A.数字评分法

B.CTP 评分标准

C.Cochrane 证据分级

D.APACHE-ii 评分系统

E.Beers 标准

86.用于判断老年患者潜在不适当用药物是

87.用于评价肝功能不全严重程度的是

88.用于评价癌痛患者疼痛程度的是

【89~90】

A.地塞米松

B.可的松

C.泼尼松

D.泼尼松龙

E.氢化可的松

89.因可抑制患儿的生长和发育,小儿应避免使用的长效糖皮质激素是

90.无需在肝脏代谢,严重肝功能不全者宜选用的中效糖皮质激素是

三、综合分析选择题

【91~93】

患者,女,48岁。5年前患右上肺结核,痰菌阳性,经异烟肼、链霉素和乙胺丁醇治疗6个月,痰菌转阴,病灶明显吸收,自行停药,未再随访。近1个月来感乏力,2天前起咳嗽、痰中带血就诊。X线胸片示右上肺大片致密影,边缘不清,密度不均,高密度病灶部分隐约见有钙化。侧位病变位于肺上叶尖后段,呈团块状,约4 cm×4.5 cm大小,边界毛糙。家庭中近期有人患肺结核,考虑为肺结核复发,给予抗结核药物治疗。

91.该患者系慢乙酰化者,需要减量的抗结核药是

A.异烟肼

B.利福平

C.吡嗪酰胺

D.乙胺丁醇

E.链霉素

92.患者服药后便尿、唾液、汗液、痰液、泪液等排泄物呈橘红色,这是因为服用哪种抗结核药导致的

A.异烟肼

B.利福平

C.吡嗪酰胺

D.乙胺丁醇

E.对氨基水杨酸钠

93.患者入院后诊断为结核性脑膜炎,治疗结核性脑膜炎不宜选用的抗结核药是

A.异烟肼

B.链霉素

C.吡嗪酰胺

D.丙硫异烟胺

E.环丝氨酸

【94~96】

患者,男,64岁。身高174 cm,体重92 kg,既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史,近日因反复胸闷就诊,临床处方:特拉唑嗪片,氨氯地平片,阿司匹林肠溶片,曲美他嗪片,单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

94.该患者使用的药物中,降压作用的药物是

A.特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片

B.特拉唑嗪片、氨氯地平片、单硝酸异山梨酯注射液

C.特拉唑嗪片、氨氯地平片、辛伐他汀片

D.特拉唑嗪片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片

E.氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液

95.该患者用药中,在首次用药、剂量增加或停药后重新用药时,应让患者平卧,以免发生眩晕而跌倒的药物是

A.氨氯地平片

B.曲美他嗪片

C.阿司匹林肠溶片

D.特拉唑嗪片

E.辛伐他汀片

96.关于本病例合理用药指导意见的说法,错误的是

A.应注意监护血压变化,防止血压过度降低

B.患者使用抗血小板聚集药物,应注意预防出血

C.单硝酸异山梨酯能扩张血管引起头痛,即便可以耐受也必须停药

D.出现弥漫性肌痛或乏力,同时伴全身不适时,应及时就医

E.口服阿司匹林肠溶片时不要嚼碎或掰开服用

【97~99】

患者,男,75岁,患有高血压、冠心病、糖尿病。常年服用珍菊降压片、单硝酸异山梨酯缓释片、二甲双胍肠溶片、阿司匹林肠溶片、曲美他嗪片。

97.该患者使用的药物中,不适宜的是  举一 反三

A.珍菊降压片

B.单硝酸异山梨酯缓释片

C.二甲双胍肠溶片

D.阿司匹林肠溶片

E.曲美他嗪片

98.可使用下列哪种药物替代  举一 反三

A.氯吡格雷

B.格列美脲

- C. 贝那普利
E. 吲达帕胺

99. 若患者突发**急性冠脉综合征**, 应立即使用的药物是  **举一反三**

- A. 珍菊降压片
C. 二甲双胍肠溶片
E. 曲美他嗪片
B. 单硝酸异山梨酯缓释片
D. 阿司匹林肠溶片

【100~103】

患者, 男, 52岁, 身高 168 cm, 体重 85 kg, 痛风病史 6年。近日因多饮、多尿就诊, 实验室检查: 空腹血糖 7.8 mmol/L (正常值: 3.9~6.1 mmol/L), 餐后血糖 14.8 mmol/L (正常值: <7.8 mmol/L), 尿酸 580 μmol/L (正常值: 男性 180~440 μmol/L), 血 LDL-C 3.7 mmol/L (正常值: 2.1~3.1 mmol/L), 肌酐清除率 100 mL/min。颈动脉彩超提示: 动脉粥样硬化, 有混合性脂质斑块。临床诊断**2型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症**。

100. 对该患者的治疗方案, 不推荐的是

- A. 低嘌呤饮食
C. 适量运动
E. 应用他汀类药物
B. 应用阿司匹林
D. 控制体重

101. 该患者首选的降糖药是

- A. 格列齐特
C. 甘精胰岛素
E. 二甲双胍
B. 阿卡波糖
D. 那格列奈

102. 该患者采用首选降糖药物后, 经检测**餐前血糖已达标, 餐后血糖仍控制不佳**, 应考虑联合用的降糖药是

- A. 二甲双胍
C. 阿卡波糖
E. 那格列奈
B. 格列齐特
D. 甘精胰岛素

103. 在 102 题基础上, 该患者联合用药后, 常见**不良反应**是

- A. 心律失常
C. ALT 升高
E. 水钠潴留
B. 低血压
D. 腹胀

【104~106】

患者, 女, 42岁。1年前临床诊断为室上性心动过速, 遵医嘱使用美托洛尔片 25 mg bid.。近日因反复胃痛就诊。胃镜检查诊断为胃溃疡, 幽门螺杆菌阳性。医师处方如下:

埃索美拉唑肠溶片 20 mg bid., 餐前 30 min 口服

甲硝唑片 40 mg bid., 餐后 30 min 口服

克拉霉素片 500 mg bid., 餐后 30 min 口服

枸橼酸铋钾胶囊 0.6 g bid., 餐后 30 min 口服

104. 该处方中, 用药剂量错误的是

- A. 美托洛尔片
C. 甲硝唑片
E. 枸橼酸铋钾胶囊
B. 埃索美拉唑肠溶片
D. 克拉霉素片

105. 该处方中, 给药时间错误的是

- A. 美托洛尔片
C. 甲硝唑片
E. 枸橼酸铋钾胶囊
B. 埃索美拉唑肠溶片
D. 克拉霉素片

106. 服用下列哪种药物会导致**维生素 B₁₂和维生素 C 缺乏**

- A. 美托洛尔片
C. 甲硝唑片
E. 枸橼酸铋钾胶囊
B. 埃索美拉唑肠溶片
D. 克拉霉素片

【107~110】

患者, 女, 51岁。体检时发现血压 160/105 mmHg, 糖耐量试验餐后 2 h 血糖为 9.56 mmol/L (参考范围 <7.8 mmol/L), 甘油三酯 1.52 mmol/L (参考范围 0.56~1.70 mmol/L), 总胆固醇 6.26 mmol/L (参考范围 <5.2 mmol/L), 低密度脂蛋白胆固醇 4.85 mmol/L (参考范围 2.1~3.1 mmol/L), 肌酐 60 μmol/L (参考范围 45~84 μmol/L), 蛋白尿: ++。临床诊断为**高血压、高脂血症、糖耐量异常**。

107. 该患者宜选择的抗高血压药是

- A. 氢氯噻嗪
C. 依那普利
E. 螺内酯
B. 复方利血平
D. 特拉唑嗪

108. 该患者首选的调节血脂药是

- A. 依折麦布
C. 非诺贝特
E. 多烯酸乙酯
B. 普罗布考
D. 阿托伐他汀

109. 应告知该患者用药过程中可能出现的**不良反应**是

- A. 踝关节水肿
C. 心悸
B. 牙龈出血
D. 便血

E.干咳

110.对该患者的健康教育说法,错误的是

- A.控制体重
- B.不必限盐
- C.适当运动
- D.减少脂肪摄入
- E.戒烟限酒

四、多项选择题

111.下列原料药中易风化的药品有

- A.硫酸阿托品
- B.胃蛋白酶
- C.硫酸镁
- D.硫酸钠
- E.氯化钠

112.下列药物中,易受光线影响而变质,需要遮光保存的药物有

- A.肾上腺素
- B.维生素 K₁
- C.碳酸钙
- D.维生素 B₁₂
- E.甲钴胺

113.以下有关调配门诊患者处方的注意事项中,说法正确的是  

- A.将调配药品置于单剂量药盒后核发
- B.对麻醉药品等特殊管理药品分别登记账卡
- C.逐一检查调配药品的批准文号、有效期等
- D.调配齐全一张处方的药品后,再调配下一张处方
- E.对需要特殊保存(如“置于2~10℃保存”)的药品加贴醒目标签

114.调配药品时,在药品包装袋上应特别注意标识的内容有

- A.用法用量
- B.调剂日期
- C.贮存方法和有效期
- D.药品价格
- E.服用注意事项

115.医疗机构调剂部门应实行专用处方,专用账册,专册登记,专柜加锁,专人负责管理的药品有

- A.麻醉药品
- B.第一类精神药品
- C.第二类精神药品
- D.贵重药品
- E.高危药品

116.用药后不能马上饮水的情形有

- A.高血压患者服用硝苯地平控释片
- B.心绞痛发作患者舌下含服硝酸甘油片
- C.口腔炎患者使用复方氯己定含漱液
- D.中暑患者服用藿香正气软胶囊
- E.发热患者使用阿司匹林泡腾片

117.帕金森的药物治疗原则有

- A.疾病早期适当暂缓用药
- B.当疾病影响患者的日常生活和工作能力时,则应开始症状性治疗
- C.药物治疗的目标是延缓病情进展,直至痊愈
- D.药物治疗坚持“low”和“slow”原则
- E.治疗要考虑结合共病因素,采取个体化的方案

118.SFDA警告不宜与头孢曲松混合的注射液有  

- A.葡萄糖酸钙
- B.乳酸钠林格
- C.复方氯化钠
- D.10%葡萄糖
- E.葡萄糖氯化钠

119.药师承接护士用药咨询的主要内容有

- A.药品的适宜溶剂
- B.药品的稀释容积
- C.药品的质量标准
- D.药品的上市时间
- E.药品的滴注速度

120.药师应提供的药学服务内容包括

- A.用药咨询
- B.药品保障供应
- C.药品干预
- D.药物重整
- E.药物治疗管理



配套名师课程

模拟试卷(三)

规定时间:120分钟

自测时间

试题预计完成时间

一、最佳选择题

1.治疗**真菌性阴道炎**的首选非处方药是

- A.甲硝唑栓
B.硝酸咪康唑栓
C.益康唑栓
D.克霉唑栓或片
E.制霉菌素栓

2.下列**治疗痤疮**的药物中,患者在治疗期间及治疗结束后**1个月内应避免献血**的是

- A.红霉素
B.异维A酸
C.克林霉素
D.过氧甲苯酰
E.米诺环素

3.以下人群中,药师实施药学服务的**特殊人群**是

- A.特殊体质患者
B.需终身用药的患者
C.应用特殊剂型的患者
D.需做血药浓度监测的患者
E.应用特殊给药途径的患者

4.患者,女,24岁。一周前曾有同事患有**沙眼**,系衣原体感染,后发现自己也出现**眼红、眼痒**等不适,来药店购药,药师可推荐的药物是

- A.色甘酸钠滴眼液
B.玻璃酸钠滴眼液
C.酞丁安滴眼液
D.毛果芸香碱滴眼液
E.吡诺克辛钠滴眼液

5.患者,女,58岁。有**2型糖尿病史**,因头痛、头晕就诊,体征和实验室检查:餐前血糖7.8 mmol/L,餐后血糖11.2 mmol/L,糖化血红蛋白8.8%,血压166/96 mmHg,蛋白尿>1 g/24 h,

推荐在降糖的基础上合并选用  

- A.美托洛尔
B.氢氯噻嗪
C.卡维地洛
D.赖诺普利
E.氯吡格雷

6.患者,男,50岁。血压170/95 mmHg,伴有**双侧肾动脉狭窄**,单药治疗控制血压效果不佳,宜选用的联合用药方案是  

- A.利尿剂+ARB
B.β受体阻滞剂+ARB
C.利尿剂+CCB
D.β受体阻滞剂+ACEI

E.ACEI+CCB

7.儿童高热首选的药物是

- A.美洛昔康
B.尼美舒利
C.对乙酰氨基酚
D.塞来昔布
E.依托考昔

8.**良性前列腺增生症**老年患者,应用**α₁肾上腺素能受体阻断剂**治疗时可能导致的不良反应是

- A.体位性低血压
B.尿潴留
C.干咳
D.乳腺增生
E.前列腺特异性抗原(PSA)水平升高

9.接种乙型肝炎疫苗后,血清免疫学检查可呈**阳性反应**的指标是  

- A.乙型肝炎病毒表面抗原
B.乙型肝炎病毒表面抗体
C.乙型肝炎病毒e抗原
D.乙型肝炎病毒e抗体
E.乙型肝炎病毒核心抗体

10.以下所列“**全球药师追求的目标**”中,最正确的是

- A.实施全程化药学服务
B.及时保障临床药品供给
C.提高药师在医疗体系中的地位
D.实施以患者为中心的药学服务
E.参与临床用药实践,促进合理用药

11.吸烟可降低一些药物的疗效,其机制主要是诱导肝药酶中的

- A.CYP2B6与CYP2C9
B.CYP1A2与CYP2C9
C.CYP1A2与CYP3A4
D.CYP1A1与CYP2D6
E.CYP1A1与CYP1A2

12.可使高血压患者**血压升高**的药物是

- A.速感宁胶囊
B.银翘解毒片
C.复方酚咖伪麻胶囊
D.抗感宁胶囊
E.复方田七胃痛胶囊

13.书写药历是药师进行规范化药学服务的一项工作,下列内容一般不作为**药历内容**的是

- A.患者基本信息
B.用药评价
C.临床诊断要点
D.用药记录
E.患者知情同意书

14.关于**处方**的说法,正确的是

- A.由医务人员开具,药师审核、调配、核对,作为患者用药凭证的医疗文书

- B.由执业药师开具,药师审核、调配、核对,作为患者用药凭证的医疗文书
 C.由注册医师开具,药师审核、调配、核对,作为患者用药凭证的医疗文书
 D.由实习医师开具,药师审核、调配、核对,作为患者用药凭证的医疗文书
 E.由注册医师开具,护士审核、调配、核对,作为患者用药凭证的医疗文书

15.对痢疾、大肠杆菌感染的轻度急性腹泻应首选的非处方药是

- A.胰酶
 B.碳酸氢钠
 C.双八面蒙脱石
 D.黄连素
 E.复方嗜酸乳杆菌片

16.治疗癌痛患者因服用阿片类镇痛剂导致的便秘,宜选择的药物是

- A.比沙可啶
 B.乳果糖
 C.硫酸镁
 D.东莨菪碱
 E.阿托品

17.下列不良事件中,属于假、劣药品事件的是

- A.“康泰克 PPA 事件”
 B.“万络(罗非昔布)事件”
 C.“亮菌甲素事件”
 D.“拜斯亭(西立伐他汀)事件”
 E.“阿糖胞苷儿科事件”

18.分析以下用药错误的实例,属于“认知缺失”的是

- A.调剂工作过于繁忙
 B.新手值班以及计算机医嘱系统缺陷
 C.患者自行选购药品以致误用假药、劣药
 D.医师非主观意愿的诊断错误,造成误诊
 E.医生或药师缺乏足够的时间和耐心教育患者如何用药

19.治疗蛔虫病的药物不包括

- A.盐酸异丙嗪
 B.阿苯达唑
 C.枸橼酸哌嗪
 D.噻嘧啶
 E.伊维菌素

20.下列药物使用方式,正确的是

- A.酵母片在餐后整片用水送服
 B.硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用水送服
 C.氧氟沙星滴眼液打开使用后,继续使用3个月
 D.乙酰半胱氨酸泡腾片用100 mL温水浸泡溶解后服用
 E.红霉素软膏涂敷于眼睑内,每晚睡前一次

21.下列处方中常见的外文缩写,其含义为“每晚用药”的是

- A.qd.
 B.qn.
 C.qh.
 D.qs.
 E.qod.

22.适用于缓解肌肉、软组织和关节轻至中度疼痛的非处方药是

- A.谷维素
 B.布洛芬
 C.对乙酰氨基酚
 D.氢溴酸山莨菪碱
 E.双氯芬酸钠二乙胺乳膏剂

23.下列中药、化学药联合应用,不存在重复用药现象的是

- A.新癬片+吡哌美辛胶囊
 B.曲克芦丁片+维生素C片
 C.脉君安片+氢氯噻嗪片
 D.消渴丸+格列本脲片
 E.珍菊降压片+氢氯噻嗪片

24.痛风缓解期,宜选用的治疗药物是

- A.苯溴马隆
 B.阿司匹林
 C.秋水仙碱
 D.泼尼松
 E.双氯芬酸钠

25.锌有助于减轻炎症和促进疮愈合,治疗寻常型痤疮应用锌的最佳剂量是

- A.每次3~4 mg
 B.每日3~4 mg
 C.每日30~40 mg
 D.每次30~40 mg
 E.每日300~400 mg

26.肝功能减退者仍可按原剂量给药的抗菌药物为

- A.琥乙红霉素
 B.两性霉素B
 C.利福平
 D.林可霉素
 E.青霉素

27.在处方适宜性审核时,应特别注意是否有潜在临床意义相互作用和配伍禁忌,下列药物合用会有不良相互作用的是

- A.阿莫西林和克拉维酸钾
 B.头孢哌酮和舒巴坦
 C.苯丝肼和左旋多巴
 D.甲氧氯普胺和氯丙嗪
 E.亚胺培南和西司他丁钠

28.短效口服避孕药的主要组成成分是

- A.孕激素+雄激素
 B.雌激素
 C.孕激素
 D.雌激素+雄激素

E. 雌激素+孕激素

29. 联合用药会使**异烟肼**失去抗菌作用的中成药是  

- A. 防风通圣丸(麻黄碱) B. 蛇胆川贝液(苦杏仁苷)
C. 丹参片(丹参酮) D. 昆布片(碘)
E. 六神丸(蟾酥)

30. **利尿药与氨基糖苷类**抗生素合用可造成损害的是

- A. 心功能 B. 肝功能
C. 脾功能 D. 肺功能
E. 肾功能

31. **高血压**合并**心衰患者**禁用的降压药是  

- A. 氢氯噻嗪 B. 卡托普利
C. 氯沙坦 D. 维拉帕米
E. 哌唑嗪



32. 患者,男,59岁。哮喘病史8年,近日因急性脑梗死就诊,住院治疗2周后出院。对

于该患者**脑血管病**的**二级预防**,宜选用的抗血小板药物是  

- A. 氯吡格雷 B. 阿司匹林
C. 对乙酰氨基酚 D. 华法林
E. 依诺肝素

33. 下列各类药物相互作用中,能够引起**增加毒性**或**药品不良反应**的是

- A. 硫酸阿托品与解磷定联用 B. 青蒿素与乙胺嘧啶、磺胺多辛联用
C. 肝素钙与阿司匹林联用 D. 磷霉素与氧氟沙星联用
E. 阿托品与吗啡合用

34. **青霉素钠**注射剂的皮肤敏感试验药物浓度应为

- A. 100 U/mL B. 250 U/mL
C. 500 U/mL D. 750 U/mL
E. 1 000 U/mL

35. 相互作用使**药物吸收增加**的联合用药是

- A. 阿托品联用吗啡 B. 铁剂联用维生素 C
C. 阿托品联用普萘洛尔 D. 硝苯地平联用普萘洛尔
E. 普萘洛尔联用硝酸酯类

36. 便秘患者长期使用可引起**结肠黑变**的药物是

- A. 硫酸镁 B. 聚乙二醇 4 000

C. 乳果糖 D. 番泻叶

E. 比沙可啶

37. WHO 推荐妊娠期及哺乳期妇女每日碘摄入量为  

- A. 50 μg B. 120 μg
C. 200 μg D. 150 μg
E. 300 μg

38. 准许 10 岁以上 2 型糖尿病儿童患者选用的口服降糖药是

- A. 罗格列酮 B. 格列喹酮
C. 格列苯脲 D. 二甲双胍
E. 瑞格列奈

39. 伴有神经症状的**巨幼细胞性贫血**,在补充叶酸的基础上,还应补充

- A. 维生素 C B. 维生素 D
C. 维生素 B₁ D. 维生素 B₆
E. 维生素 B₁₂

40. 患者,男,70岁。典型的“面具脸”“慌张步态”表现。临床诊断为**帕金森病**,患者同时患有**前列腺增生**,不宜选用的药物是

- A. 普拉克索 B. 苯海索
C. 卡比多巴 D. 甲基多巴
E. 金刚烷胺

二、配伍选择题

【41~42】

- A. Dil. B. Liq.
C. Mist. D. Dos.
E. ung.

41. 处方中“**溶液**”的规范书写是

42. 处方中“**合剂**”的规范书写是

【43~44】

- A. 维生素 E B. 维生素 D
C. 维生素 C D. 维生素 B
E. 维生素 A

43. 其计量用视黄醇当量(RE)表示的是

44. 其计量用生育酚当量(TE)表示的是

【45~47】

- A.阿莫西林
- B.维生素 C
- C.万古霉素
- D.沙利度胺
- E.卡马西平

根据药物对胎儿的危害,美国 FDA 将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别

45.属于**A级**的药物是  

46.属于**B级**的药物是  

47.属于**X级**的药物是  

【48~50】

- A.胃肠道疾病
- B.肌病
- C.神经系统疾病
- D.血液系统疾病
- E.心血管系统疾病

48.**他汀类药物**引起的典型药源性疾病是

49.**非甾体类抗炎药**引起的典型药源性疾病是

50.**氨基糖苷类药物**引起的典型药源性疾病是

【51~53】

- A.氯苯那敏
- B.吲达帕胺
- C.胰酶
- D.阿司匹林
- E.阿托品

51.服用后可致**嗜睡**,驾驶员应慎用的药物是  

52.服用后可引起**多尿**,驾驶员应慎用的药物是  

53.服用后可致**视物模糊**,驾驶员应慎用的药物是  

【54~55】

- A.自我保健
- B.新药信息
- C.静脉滴注两性霉素 B 的滴速
- D.首次剂量、维持剂量以及每日用药次数、给药间隔与疗程
- E.所用的药品近期发现严重或罕见不良反应或药品说明书有相关修改

54.**医师用药咨询**的内容主要是

55.**患者用药咨询**的内容主要是

【56~57】

- A.可待因
- B.地高辛
- C.异烟肼
- D.氢氧化铝
- E.复方利血平片

56.服用**蛇胆川贝液**不宜联用的化学药物是

57.服用**麻杏止咳片**不宜联用的化学药物是

【58~60】

- A.低精蛋白锌胰岛素
- B.普通胰岛素
- C.预混胰岛素
- D.地特胰岛素
- E.赖脯胰岛素

58.属于**速效胰岛素**的是  

59.属于**短效胰岛素**的是  

60.属于**长效胰岛素**,可睡前给药的是  

【61~62】

- A.50%葡萄糖注射液
- B.复方氯化钠注射液
- C.0.9%氯化钠注射液
- D.低分子右旋糖酐注射液
- E.5%葡萄糖注射液

61.配置**青霉素输液**的适宜溶媒是

62.配置**两性霉素 B 输液**的适宜溶媒是

【63~64】

- A.布洛芬
- B.谷维素
- C.地西洋
- D.卡马西平
- E.麦角胺咖啡因

63.**偏头痛**患者可推荐的处方药

64.推荐**长期精神紧张**导致的紧张性头痛者应用的处方药是

【65~66】

- A.左旋咪唑
- B.西地碘含片
- C.氯己定含漱液
- D.替硝唑含漱液
- E.地塞米松粘贴片



配套名师课程

65. 治疗口腔溃疡, 频繁应用可使**局部组织萎缩**的药物是

66. 伴**甲状腺功能亢进症**的口腔溃疡患者应避免使用的药物是

【67~69】

- | | |
|---------------|-----------|
| A. 布洛芬 | B. 贝诺酯 |
| C. 阿司匹林 | D. 对乙酰氨基酚 |
| E. 20%安乃近溶液滴鼻 | |

治疗发热的药物选择

67. **心功能不全**的患者应慎用的是

68. 尤其适用于**老年人和儿童退热**的是

69. 适用于5岁以下儿童**高热时紧急退热**的是

【70~71】

- | | |
|---------|---------|
| A. 乙胺丁醇 | B. 氨苄西林 |
| C. 莫西沙星 | D. 氧氟沙星 |
| E. 吡嗪酰胺 | |

70. 可以杀伤**结核杆菌**, 最大限度降低传染性的**早期杀菌活性药**是

71. 可以杀灭**组织细胞内停留的结核杆菌**, 最大限度减少结核病复发的灭菌活性药是

【72~73】

- | | |
|---------|---------|
| A. 硫酸镁 | B. 比沙可啶 |
| C. 双歧杆菌 | D. 干酵母 |
| E. 乳果糖 | |

72. 有较强刺激性, 服药时**不可嚼碎**的泻药是

73. **肝性脑病合并便秘**患者首选的泻药是

【74~75】

- | | |
|----------|---------|
| A. 吡嗪酰胺 | B. 利福平 |
| C. 链霉素 | D. 乙胺丁醇 |
| E. 左氧氟沙星 | |

74. 用药后有可能出现**球后视神经炎**的抗结核药是

75. 用药期间尿液可呈**橘红色**的抗结核药是

【76~78】

- | | |
|------------|-------------|
| A. 对乙酰氨基酚 | B. 地西洋(安定)片 |
| C. 麦角胺咖啡因片 | D. 卡马西平 |
| E. 辛伐他汀 | |

76. 关于头痛的药物治疗, 首选的非处方药是

77. **反复性偏头痛**, 推荐应用的处方药是

78. **三叉神经痛**可首选服用的处方药是

【79~80】

- | | |
|--------|---------|
| A. 小檗碱 | B. 阿苯达唑 |
| C. 乳果糖 | D. 干酵母 |
| E. 硫糖铝 | |

79. **消化不良**患者宜选用

80. **细菌感染性腹泻**患者宜选用

【81~82】

- | | |
|-----------|--------------|
| A. 心力衰竭患者 | B. 痛风患者 |
| C. 胃溃疡患者 | D. 双侧肾动脉狭窄患者 |
| E. 哮喘患者 | |

81. 高血压治疗药物选择时, **ACEI类**药物禁用于

82. 高血压治疗药物选择时, **噻嗪类**利尿剂禁用于

【83~84】

- | | |
|----------|---------------|
| A. 高钙血症 | B. 血尿 |
| C. 瑞夷综合征 | D. 再生障碍性贫血和紫癜 |
| E. 库欣综合征 | |

83. **儿童病毒性感冒**使用**阿司匹林**退热可引起

84. 治疗**儿童佝偻病**时长期大量使用**鱼肝油丸**可引起

【85~86】

- | | |
|---------|----------|
| A. 美托洛尔 | B. 多巴酚丁胺 |
| C. 氨力农 | D. 依普利酮 |
| E. 依那普利 | |

85. **抑制血管紧张素转化酶**, 可消除慢性心衰症状, 降低病死率的药物是

86. **能选择性拮抗醛固酮受体**, 显著降低轻度心衰患者心血管事件的发生危险, 降低死亡率的是

【87~88】

- | | |
|---------|----------|
| A. 布洛芬 | B. 塞来昔布 |
| C. 甲氨蝶呤 | D. 曲妥珠单抗 |
| E. 泼尼松 | |

87. 属于**COX-2抑制剂**的药物是

88. 具有**抗肿瘤作用**的抗风湿药是

【89~90】

- A.超适应证给药
- B.有禁忌证用药
- C.盲目联合用药
- D.撒网式给药
- E.过度治疗用药

89.脂肪乳用于脂质肾病患者,属于 举一反三

90.二甲双胍用于非2型糖尿病患者减肥,属于 举一反三

三、综合分析选择题

【91~93】

某药物研究所合成出一个新化合物,计划将此化合物开发为具有抗脑缺血作用的新药。

91.下列不属于新药临床前研究的是 举一反三

- A.主要药效学研究
- B.毒理学研究
- C.一般药理学研究
- D.药动学研究
- E.0期临床试验

92.当该药完成临床前研究,进入了I期临床研究,下列描述属于I期临床研究的为 举一反三

- A.使用微剂量(一般不大于100 μg),在少量受试者(6人左右)进行的药物试验
- B.20~30例健康成年志愿者,观察人体对于受试药的耐受程度和人体药动学特征
- C.采用随机、双盲、对照方法进行初步药效学评价试验,完成例数大于100例
- D.遵循随机、对照的原则进行扩大的多中心临床试验,进一步评价受试药的有效性、安全性、利益与风险,完成例数大于300例
- E.售后调研,即批准上市后的监测

93.该新药批准上市后进行的监测,即售后调研,属于 举一反三

- A.0期临床试验
- B.I期临床试验
- C.II期临床试验
- D.III期临床试验
- E.IV期临床试验

【94~97】

患者,男,62岁。既往有高血压病史和磺胺药过敏史。近1年内出现阵发性胸痛,多发生于劳累及情绪激动时,每次发作持续时间约为4~5 min,休息2~3 min后可自行缓解。体格检查:T 36.3℃,P 85次/min,R 16次/min,BP 150/80 mmHg。辅助检查提示:血常规、尿常规、心肌酶谱等均正常,总胆固醇6.8 mmol/L、LDL-C 4.0 mmol/L,心电图检查提示:窦性心律、胸导联ST段下移,T波倒置初步诊断为稳定性心绞痛、高血压、高脂血症。临床治

疗方案如下:

- 比索洛尔 2.5 mg 每天一次
- 单硝酸异山梨酯缓释片 30 mg 每天三次
- 瑞舒伐他汀 40 mg 每天一次
- 吲达帕胺 1.5 mg 每天一次
- 阿司匹林 100 mg 每天一次

94.本处方中,给药次数错误的药物是

- A.吲达帕胺缓释片
- B.富马酸比索洛尔片
- C.瑞舒伐他汀钙片
- D.阿司匹林肠溶片
- E.单硝酸异山梨酯缓释片

95.本处方中,给药剂量错误的药物是

- A.富马酸比索洛尔片
- B.单硝酸异山梨酯缓释片
- C.瑞舒伐他汀钙片
- D.阿司匹林肠溶片
- E.吲达帕胺缓释片

96.该患者应禁用的药物是

- A.富马酸比索洛尔片
- B.单硝酸异山梨酯缓释片
- C.吲达帕胺缓释片
- D.瑞舒伐他汀钙片
- E.阿司匹林肠溶片

97.该患者服药20天后自觉全身肌肉酸痛,化验结果显示肌酸激酶升高,引起此不良反应的药物是

- A.富马酸比索洛尔片
- B.瑞舒伐他汀钙片
- C.单硝酸异山梨酯缓释片
- D.阿司匹林肠溶片
- E.吲达帕胺缓释片

【98~100】

患者,女,28岁。妊娠27周,头晕3天。入院查体:血压160/100 mmHg。诊断为:妊娠期高血压。

98.该患者的降压目标为

- A.<140/90 mmHg
- B.<150/90 mmHg
- C.130~140/80~90 mmHg
- D.<130/80 mmHg
- E.<120/80 mmHg

99.该患者降压治疗应首选的药物是

- A.福辛普利
- B.卡托普利
- C.缬沙坦
- D.拉贝洛尔

E. 特拉唑嗪

100. 患者出现**先兆子痫**, 急救时应首选

- A. 硫酸镁
B. 甲氧氯普胺
C. 葡萄糖酸钙
D. 尼莫地平
E. 乌拉地尔

【101~102】

患者, 男, 50 岁。高血压病史 3 年, 期间先后用硝苯地平片和硝苯地平控释片控制血压, 近日出差曾饮酒和引用多种饮料, 出现**血压波动**情况。

101. 关于本例患者对**硝苯地平片**和**硝苯地平缓释片**的用法, 正确的是

- A. 控释片比普通片剂含量高, 不宜嚼碎服用, 不然会导致低血压
B. 控释片与普通片剂含量相同, 可以固定时间替换服用
C. 控释片一般一日三次给药, 与普通片给药次数相同
D. 控释片比普通片起效快, 作用持续时间长
E. 控释片比普通片起效慢, 血浆峰浓度高, 容易发生头晕、注意力不集中、记忆力减退、

肢体麻木、夜尿增多、心悸、胸闷、乏力等

102. 该患者下列生活行为中, 可能会导致**硝苯地平血浆浓度升高**的是

- A. 饮酒
B. 喝茶
C. 喝咖啡
D. 吸烟
E. 饮用葡萄柚汁

【103~105】

根据半衰期确定给药间隔, 是制定给药方案的基本方法。已知某药的半衰期为 12 h, 每次用药 20 mg。

103. 该药的给药次数应为   

- A. qd.
B. bid.
C. tid.
D. qid.
E. qod.

104. 按照上述给药方法, 血药浓度需多长时间达稳态血药浓度   

- A. 12 h
B. 24 h
C. 48 h
D. 60 h
E. 72 h

105. 若想使血药浓度迅速达到稳态, 应   

- A. 首次用药 20 mg, 以后每次用药 40 mg
B. 首次用药 40 mg, 以后每次用药 20 mg

C. 每次用药 20 mg

D. 每次用药 40 mg

E. 每次用药 80 mg

【106~108】

患者, 男, 72 岁。既往有**高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡**病史。一个月前, 因出现哮喘症状就诊, 医师处方布地奈德气雾剂 200 μg bid. 吸入, 沙丁胺醇气雾剂 100 pg pm 吸入, 氨氯地平片 5 mg qd. 口服及硝酸甘油片 0.5 mg pm 舌下含服治疗。

106. 药师在用药指导时, 应告知患者**布地奈德气雾剂**正确的使用步骤是

- A. 漱口→摇匀→呼气→掀压阀门并深吸气→屏气约 10 s
B. 呼气→摇匀→掀压阀门并深吸气→屏气约 10 s→漱口
C. 摇匀→呼气→深吸气同时掀压阀门→屏气约 10 s→漱口
D. 呼气→掀压阀门并深吸气→屏气约 10 s→漱口
E. 摇匀并掀压阀门→呼气→深吸气→屏气约 10 s→漱口

107. 该患者因近日在浇花时出现**心悸和手指轻微震颤**而就诊。体格检查: T 36.8 °C, P 120 次/min, R 28 次/min, BP 175/90 mmHg。出现上述症状的可能原因是

- A. 布地奈德剂量太大
B. 沙丁胺醇的不良反应
C. 氨氯地平的不良反应
D. 硝酸甘油剂量不足
E. 布地奈德的不良反应

108. 该患者**血压控制不佳**, 可考虑联合使用的抗高血压药是

- A. 缬沙坦
B. 非洛地平
C. 普萘洛尔
D. 维拉帕米
E. 复方利血平

【109~110】

患者, 女, 44 岁。半年前诊断为**支气管哮喘**, 间断口服沙丁胺醇 4 mg tid. 治疗, 没有规律用药治疗。近日, 因秋冬季节交替, 出现**明显喘憋、话不成句**, 被紧急送往医院。

109. 该患者出现支气管哮喘急性发作, 应首选的治疗药物是

- A. 沙丁胺醇片
B. 布地奈德气雾剂
C. 沙丁胺醇气雾剂
D. 沙美特罗-氟替卡松粉吸入剂
E. 异丙托溴铵雾化吸入剂

110. 该患者支气管哮喘的**长期维持**治疗宜选用

- A. 沙丁胺醇片
B. 福莫特罗吸入剂
C. 沙丁胺醇气雾剂
D. 沙美特罗-氟替卡松粉吸入剂
E. 茶碱片

四、多项选择题

111.适宜在睡前服用的药物有

- A.平喘药
- B.抗过敏药
- C.血脂调节药
- D.抗结核药
- E.降糖药

112.关于腹泻的非处方药物治疗,说法正确的有  

- A.感染性腹泻用鞣酸蛋白
- B.消化性腹泻,因胰腺功能不全引起的消化不良腹泻用胰酶
- C.激惹性腹泻,因化学刺激引起的腹泻,可供选用的有双八面蒙脱石
- D.肠道菌群失调性腹泻,可补充微生态制剂,例如双歧三联活菌胶囊
- E.病毒性腹泻,可选用抗病毒药,如阿昔洛韦、泛昔洛韦

113.开展药品不良反应报告与监测的目标和意义有

- A.减少 ADR 的危害
- B.促进新药的研制开发
- C.促进临床合理用药
- D.为医疗事故鉴定和诉讼提供证据
- E.弥补上市前研究的不足

114.甲状腺功能亢进症的临床表现包括

- A.声音嘶哑、毛发稀疏、眉毛外端 1/3 脱落
- B.多食、消瘦、多汗、激动等高代谢症候群
- C.神经和血管兴奋性增强,如心悸、手颤
- D.不同程度的突眼和甲状腺肿大等特征性体征
- E.少数老年患者可表现为乏力、体重明显减轻,称为“淡漠型甲亢”

115.下列化学药与中成药的联合应用中,降低药物不良反应的有

- A.甘草与氢化可的松联用抗炎、抗变态反应
- B.甘草酸联用链霉素抗感染
- C.氟尿嘧啶、环磷酰胺、白芨、海螵蛸粉制成片剂,用于治疗消化道肿瘤
- D.甘草与呋喃唑酮合用治疗肾盂肾炎
- E.石麦汤配伍氯氮平治疗精神病患者

116.患者,男,54岁。出租车司机,临床诊断为胃食管反流病。医师处方:奥美拉唑肠溶片 20 mg bid.强化抑酸治疗。药师应给予的用药指导包括

- A.餐前服用
- B.应整片吞服
- C.服药 6 h 后才开始工作
- D.可能出现口干、便秘等
- E.注意观察心血管危险征兆

117.属于药品质量缺陷的情况有  

- A.注射用水安瓿字迹不清
- B.腺苷钴胺糖衣片色泽不均
- C.精蛋白锌胰岛素注射液外观可见沉淀物
- D.对乙酰氨基酚片为白色
- E.维生素 C 注射液外观为澄明微黄色

118.氰化物中毒的解毒剂有

- A.亚硝酸钠
- B.亚甲蓝
- C.硫代硫酸钠
- D.纳洛酮
- E.二巯丙醇

119.保证老年人安全用药的做法有

- A.从小剂量开始,逐渐增加到最合适的剂量
- B.由于老年人的抵抗力弱,应大量应用滋补药
- C.一般合用药以 5~6 种为宜
- D.对于高血压患者一定要把血压降至 120/80 mmHg
- E.镇痛药、解热镇痛药、镇静催眠药、麻醉药尽可能用最小的有效剂量

120.因老年人代谢改变,导致某些药物敏感性增强的是

- A.镇静药
- B.β受体阻断药
- C.抗凝血药
- D.利尿药
- E.助消化药



配套名师课程

模拟试卷(四)

规定时间:120分钟

自测时间_____

试题预计完成时间_____

一、最佳选择题

1. 下述药物之间能产生有益相互作用的是

- A. 呋塞米+链霉素
B. 氢氯噻嗪+链霉素
C. 氢氯噻嗪+利血平
D. 呋塞米+庆大霉素
E. 氢氯噻嗪+庆大霉素

2. 下列药物属于肝药酶诱导剂的是

- A. 环丙沙星
B. 胺碘酮
C. 氟康唑
D. 卡马西平
E. 西咪替丁

3. 对胎儿及母体均无明显影响,也无致畸作用,妊娠期感染时可选用的药物

是  举一 反三

- A. 左氧氟沙星
B. 氯霉素
C. 磷霉素
D. 万古霉素
E. 甲硝唑

4. 药师在工作中防范用药错误可以采取的行为不包括

- A. 严格审核处方
B. 仔细核对药品
C. 进行用药指导
D. 自行修改错误处方
E. 规范操作流程

5. 根据规定,药库内的湿度范围是

- A. 35%~55%
B. 35%~60%
C. 35%~65%
D. 35%~70%
E. 35%~75%

6. 治疗药物评价的内容,一般不包括的项目是

- A. 有效性
B. 安全性
C. 经济性
D. 依从性
E. 药品质量

7. 根据《药物临床试验质量管理规范》,药品临床再评价阶段为

- A. I 期临床试验
B. II 期临床试验

C. III 期临床试验

D. IV 期临床试验

E. II 期至 III 期临床试验

8. 下列关于阿仑膦酸钠使用注意事项的说法,错误的是

- A. 口服后 30 min 内应保持立位或坐位
B. 应避免同时使用两种双磷酸盐
C. 随餐服用,并大量饮水,可增加吸收、减少胃肠道刺激
D. 食管炎为典型不良反应
E. 已批准用于提早绝经女性骨质疏松的防治

9. 可提高后者血药浓度,减少用量,降低不良反应的联合用药是  举一 反三

- A. 磺胺甲噁唑与甲氧苄啶
B. 氢溴酸山莨菪碱与哌替啶
C. 吗啡与纳洛酮
D. 铁剂与维生素 C
E. 卡比多巴与左旋多巴

10. 易吸潮变质的药物是

- A. 硫酸钠
B. 胃蛋白酶
C. 明矾
D. 硫酸镁
E. 苯酚

11. 属于超常处方的是

- A. 早产儿未标明体重或日、月龄
B. 中药饮片和西药开在同一张处方上
C. 用法、用量写“遵医嘱”“自用”字样
D. 无正当理由不首选国家基本药物
E. 无适应证用药

12. 患者,女,45岁。既往有心律失常(Q-T 间期延长)、低钾血症。近日因发热、咳嗽、咳痰就诊,诊断为社区获得性肺炎。该患者不宜选用的药物是

- A. 莫西沙星
B. 头孢呋辛酯
C. 氨溴索
D. 阿莫西林
E. 对乙酰氨基酚

13. 成年人空腹血糖正常值范围是

- A. 3.9~7.2 mmol/L (70~130 mg/dl)
B. 3.9~8.3 mmol/L (70~150 mg/dl)
C. 3.9~7.0 mmol/L (70~126 mg/dl)
D. 3.5~5.5 mmol/L (60~100 mg/dl)
E. 3.9~6.1 mmol/L (70~110 mg/dl)

14. 患儿,男,1岁1个月,诊断为巨幼细胞性贫血。医嘱:肌内注射维生素 B₁₂,一次40 μg。

已知维生素 B₁₂注射液的规格为 0.5 mg/mL,计算应该抽取的药液容积为  举一 反三

- A. 0.06 mL
B. 0.07 mL

- C.0.08 mL
D.0.09 mL
E.0.10 mL

15.某患者喜吃鱼类,近日出现头痛、头晕、呼吸急促、结膜充血、皮肤潮红、心悸、面目肿胀、麻木等中毒症状。下列药物中,怀疑该患者可能正在服用的是

- A.维生素 A
B.灰黄霉素
C.左旋多巴
D.异烟肼
E.肾上腺皮质激素

16.下列关于服用阿昔洛韦治疗带状疱疹的说法,错误的是

- A.应尽早使用阿昔洛韦
B.除口服外,可局部使用阿昔洛韦软膏
C.口服给药,每日给药5次
D.治疗疗程一般为7~10天
E.阿昔洛韦主要经肝脏代谢,肾功能不全者不需减量使用

17.应贮存于棕色容器的药物是

- A.硫酸铝片
B.硫酸镁
C.西咪替丁片
D.维生素 C
E.兰索拉唑胶囊

18.除妊娠及哺乳期妇女外,其他禁用伪麻黄碱的人群是

- A.甲状腺功能减退者
B.高尿酸血症者
C.支气管哮喘者
D.良性前列腺增生者
E.功能性便秘者

19.一级信息最突出的特点是

- A.提供的信息最新
B.内容广泛、使用方便
C.提供的信息丰富、详实
D.查阅时需要利用所提供的参考文献进行验证
E.有的还能提供疾病与药物治疗的基本知识

20.患者,男,77岁。因感冒、发热、咳嗽,自服酚麻美敏片、维C银翘片,三天后出现急性尿潴留。可引起该患者出现尿潴留的药物成分是

- A.对乙酰氨基酚
B.维生素 C
C.连翘
D.氯苯那敏
E.右美沙芬

21.下列药品宜冷处贮藏但不宜冷冻的是

- A.氯化钠注射液
B.双歧三联活菌制剂

- C.卡前列甲酯栓剂
D.甘露醇注射液

- E.葡萄糖注射液

22.欲用95%乙醇和蒸馏水配制70%乙醇1000 mL,所取95%乙醇体积约为

- A.500 mL
B.665 mL
C.700 mL
D.737 mL
E.889 mL

23.可引起驾驶员嗜睡的药物不包括

- A.抗感冒药
B.抗过敏药
C.镇静催眠药
D.抗菌药
E.偏头痛药

24.目前推荐的绝经期激素补充治疗的窗口期是

- A.绝经后10年之内或60岁以前
B.大于60岁
C.绝经后5年之内
D.绝经后15年之内或大于60岁
E.绝经后20年之内

25.在药物经济学研究方法中,可以为总体医疗费用的控制和医疗资源优化配置提供基本信息的是

- A.最大效果分析
B.最小成本分析
C.成本-效益分析
D.成本-效用分析
E.成本-效果分析

26.属于癌症疼痛治疗第二阶梯的止痛药物为

- A.对乙酰氨基酚
B.二氢可待因
C.羟考酮
D.哌替啶
E.美沙酮

27.治疗抗肿瘤引起的恶心、呕吐等不良反应,可选用的止吐药物是

- A.奥美拉唑
B.西咪替丁
C.昂丹司琼
D.维生素 B₆
E.苯海拉明

28.细菌性尿路感染,最常见的致病菌是

- A.肠球菌
B.铜绿假单胞菌
C.克雷伯杆菌
D.大肠埃希菌
E.葡萄球菌



配套名师课程

29. 药学原始文献主要登载于

- A.《医学索引》
B.《中国药学文摘》
C. 期刊、杂志
D.《医学文摘》
E. 万方数据资源系统

30. 房颤合并支气管哮喘患者,适用于控制心室率的药物为

- A. 利伐沙班
B. 胺碘酮
C. 硝苯地平
D. 地尔硫草
E. 去乙酰毛花苷

31. 部分头孢菌素结构中含有甲硫四氮唑侧链,可以竞争结合γ-谷氨酰化酶,抑制肠道正常菌群,由此导致的不良反应是

- A. 凝血功能障碍
B. 排异功能障碍
C. 造血功能障碍
D. 免疫功能障碍
E. 勃起功能障碍

32. 下列关于失眠药物治疗策略的说法,正确的是

- A. 原发性失眠在非药物治疗无效时首选苯二氮草类抗失眠药
B. 失眠继发于或伴发于其他疾病时,应同时治疗原发或伴发疾病
C. 药物治疗开始后应及时开展血药浓度监测
D. 焦虑症患者存在失眠时,以抗失眠药物为主
E. 对于长期应用镇静催眠药物的慢性失眠患者,提倡药物连续治疗

33. 羟甲戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂(他汀类)与贝丁酸类调节血脂药联用时可引起严重不良反应是

- A. 肾输尿管结石
B. 十二指肠溃疡
C. 急性心肌梗死
D. 横纹肌溶解症
E. 糖尿病坏疽

34. 下列属于脂溶性维生素的是

- A. 叶酸
B. 维生素 B₂
C. 维生素 B₆
D. 维生素 C
E. 维生素 D

35. 育龄期妇女癫痫可酌情选用

- A. 丙戊酸钠
B. 卡马西平
C. 乙琥胺
D. 托吡酯
E. 苯巴比妥

36. 说明书中没有儿童用药剂量时,可以根据儿科用药换算方法进行计算。下列计算方法,错误的是

- A. 小儿药物剂量=(年龄×成人剂量)/小儿体表面积(m²)
B. Fried 公式, 婴儿药物剂量=月龄×成人剂量/150
C. 儿童剂量=成人剂量×儿童体表面积(m²)/1.73(m²)
D. 儿童剂量=成人剂量×小儿体重(kg)/70
E. Young 公式, 小儿药物剂量=(年龄×成人剂量)/(年龄+12)

37. 不会引起嗜酸性粒细胞计数升高的疾病是

- A. 荨麻疹
B. 药物性皮炎
C. 支气管哮喘
D. 严重烧伤
E. 湿疹

38. 老年(≥65岁)患者,帕金森治疗首选药物为

- A. 司来吉兰
B. 左旋多巴/苄丝阱
C. 苯海索
D. 金刚烷胺
E. 恩托卡朋

39. 匹维溴铵的作用机制是

- A. M 受体阻断剂
B. β 受体阻断剂
C. 钙拮抗剂
D. M 受体激动剂
E. 钠拮抗剂

40. 患者,男,65岁。身高 170 cm,体重 60 kg。经血糖检测、糖耐量试验和肾功能检测(肌酐清除率 45 mL/min),诊断为 2 型糖尿病、肾功能不全,该患者应首选的药物是

- A. 格列本脲
B. 格列齐特
C. 格列喹酮
D. 格列吡嗪
E. 格列美脲

二、配伍选择题

【41~43】

- A. 左氧氟沙星
B. 乙胺丁醇
C. 利福平
D. 吡嗪酰胺
E. 链霉素

41. 抗结核联合治疗方案中,可引起球后视神经炎不良反应的药物是

42. 抗结核联合治疗方案中,可出现橘红色尿的药物是

43. 抗结核联合治疗方案中,可引起耳蜗神经损伤不良反应的药物是

【44~46】

- A.Ac B.pc.
C.po. D.qn.
E.prn

44.处方中“餐后给药”的外文缩写是

45.处方中“餐前给药”的外文缩写是

46.处方中“必要时”的外文缩写是

【47~48】

- A.青霉素+丙磺舒 B.西咪替丁+格列苯脲
C.多潘立酮+维生素 C D.四环素类+硫酸亚铁
E.阿司匹林+甲苯磺丁脲

47.由于置换与血浆蛋白结合作用而危及安全用药的联合用药是   举一 反三

48.由于影响肝药酶代谢而增强药物作用,危及用药安全的联合用药是   举一 反三

【49~50】

- A.饮茶 B.高盐饮食
C.咖啡 D.吸烟
E.葡萄柚汁

49.长期大量饮用导致缺钙,诱发骨质疏松症的是

50.有肾炎、风湿病伴有心脏损害、高血压患者不宜服用

【51~52】

- A.25.0 B.30.0
C.10.0 D.33.3
E.20.0

51.用10%氯化钠注射液和注射用水配置3%的氯化钠注射液100 mL,所需的10%氯化钠注射液的毫升数是

52.5%葡萄糖注射液500 mL含有葡萄糖的克数是

【53~54】

- A.头孢菌素 B.阿昔洛韦
C.特非那定 D.氯雷他定
E.复方伪麻黄碱制剂

53.内服给药治疗鼻塞的非处方药是

54.内服给药治疗过敏性鼻炎的非处方药是

【55~56】

- A.华法林 B.阿司匹林
C.阿替普酶 D.依诺肝素
E.利伐沙班

55.房颤患者为避免附壁血栓形成,首选   举一 反三

56.非髂骨深静脉血栓形成患者宜使用   举一 反三

【57~59】

- A.右美沙芬 B.哌替啶
C.阿托品 D.硝酸甘油
E.阿米洛利

57.可使驾驶员出现定向力障碍的药物是

58.可导致驾驶员多尿或多汗的药物是

59.可使驾驶员出现眩晕或幻觉的药物是

【60~61】

- A.左氧氟沙星片 B.阿奇霉素片
C.阿莫西林胶囊 D.注射用头孢曲松钠
E.阿米卡星注射液

60.使用前应用青霉素进行皮试的药物是

61.使用前应用原药进行皮试的药物是

【62~63】

- A.双八面体蒙脱石 B.聚乙二醇4 000
C.阿苯达唑 D.莫沙必利
E.多潘立酮

62.治疗肠道蛔虫病可选用

63.治疗急性腹泻可选用

【64~66】

- A.急性肾衰竭 B.膀胱颈梗阻
C.低血糖 D.低血钾、低血压
E.粒细胞减少

64.中成药中含氯苯那敏成分重复应用时,可致

65.中成药中含格列苯脲成分重复应用时,可致

66.中成药中含氢氯噻嗪成分重复应用时,可致

【67~68】

- A.对乙酰氨基酚
B.格列喹酮
C.多潘立酮
D.地西泮
E.普萘洛尔

67.用药期间饮酒,可导致**中枢抑制加重**的药物是

68.用药期间饮酒,可导致**肝毒性加大**的药物是

【69~70】

- A.药品说明书
B.《中华新药杂志》
C.《中华人民共和国药典》
D.《美国化学文摘》
E.《中国2型糖尿病防治指南》

69.属于**一级信息**的是

70.属于**二级信息**的是

【71~73】

- A.C级
B.D级
C.A级
D.X级
E.B级

根据药物对胎儿的危害,美国FDA将妊娠用药毒性分为A、B、C、D、X五个级别

71.**正常剂量维生素D**的妊娠毒性分级是

72.**头孢曲松**的妊娠毒性分级是

73.**依那普利**的妊娠毒性分级是

【74~76】

- A.异丙托溴铵气雾剂
B.孟鲁司特钠咀嚼片
C.茶碱片
D.沙丁胺醇气雾剂
E.布地奈德吸入剂

74.适用于**阿司匹林哮喘**的药物是   

75.用药后**需漱口**的是   

76.与环丙沙星合用,需监测血药浓度的是   

【77~79】

- A.甲氨蝶呤
B.环磷酰胺
C.柔红霉素
D.长春新碱
E.博来霉素

77.可用**右雷佐生**解救不良反应的药物是

78.可引起**肺毒性**的抗生素类药物是

79.属于抗代谢药的是

【80~82】

- A.血红蛋白减少
B.嗜酸性粒细胞增多
C.中性粒细胞增多
D.红细胞增多
E.血小板增多

80.**缺铁性贫血**患者常表现为

81.**过敏性皮炎**患者常表现为

82.**急性细胞性扁桃体炎**患者常表现为

【83~84】

- A.单纯孕激素补充治疗
B.单纯雌激素补充治疗
C.雌孕激素序贯用药
D.雌孕激素连续联合用药
E.雌激素对抗治疗

83.适用于**已切除子宫**妇女的MHT治疗方案   

84.适用于**有完整子宫**、绝经后期仍希望有月经样出血妇女的MHT治疗方案是   

【85~86】

- A.同质RCT
B.单个RCT
C.同质队列研究
D.单个队列研究
E.单个病例对照研究

循证医学中,关于证据级别的划分方法为

85.**1a**是   

86.**2b**是   

【87~88】

- A.双氯芬酸片
B.硝普钠片
C.降钙素鼻喷雾剂
D.阿司匹林
E.头孢呋辛酯片

87.需**密闭,2~10℃冷处**保存的药品是

88.**密闭、遮光,在阴凉干燥处**保存的药品是

【89~90】

- A.1 kcal
B.2 kcal



配套名师课程

C.3 kcal D.4 kcal

E.9 kcal

89.1 g 葡萄糖可提供的热量是

90.1 g 脂肪可提供的热量是

三、综合分析选择题

【91~93】

患者,男,72岁。经检查发现,血压170/90 mmHg,血脂偏高,并发胃溃疡,医生所开处方药物有氨氯地平、奥美拉唑、阿托伐他汀。

91.药师在用药指导时,应告知患者氨氯地平的适宜服药时间是

A.清晨 B.餐前

C.餐中 D.餐后

E.睡前

92.药师在用药指导时,应告知患者服用他汀类药物时,需要密切关注的毒性反应是

A.肾毒性 B.血液毒性

C.胃肠道刺激 D.肌痛、肌炎、平滑肌溶解

E.心脏毒性

93.如果患者饮用了葡萄柚汁,下列对药效影响叙述错误的是

A.增加了阿托伐他汀的药效

B.对氨氯地平药效无影响

C.增加奥美拉唑代谢物奥美拉唑酮的血药浓度

D.降低奥美拉唑代谢物奥美拉唑酮的血药浓度

E.增强了阿托伐他汀的毒性

【94~97】

患儿,女,4岁半。身高110 cm,体重15 kg。一天前发热(39℃),咽喉痛,无咳嗽,家长在家选用退烧药对症治疗,发病20 h左右出现腹泻,约2~5 h一次大便,量少,黄色黏液便,呕吐一次。体格检查:T 38.8℃,P 118次/分,R 28次/分。咽微充血,出现轻脱水症状。双肺呼吸音清,腹平软,肝脾未触及,肠鸣音活跃。血常规检查:WBC $18.5 \times 10^9/L$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9/L$),粪便镜检可见红、白细胞。

94.该患者的临床表现及实验室检查结果常见于

A.动力性腹泻 B.消化不良性腹泻

C.感染性腹泻 D.分泌性腹泻

E.出血坏死性腹泻

95.该患者腹泻治疗过程中不应选择的药物是

A.小檗碱 B.洛哌丁胺

C.药用炭 D.鞣酸蛋白

E.口服补液盐

96.关于该患儿腹泻用药注意事项的说法,错误的是

A.药用炭可以吸附细菌和毒素,可与抗生素同时服用

B.腹泻可致电解质丢失,故须特别注意补充

C.小檗碱和鞣酸蛋白不宜同时服用

D.首选口服补液,必要时静脉补液

E.适时使用微生态制剂

97.关于该患儿腹泻家庭用药教育的说法,错误的是

A.每次腹泻后均要少量多次喂水,直至腹泻停止

B.若患儿腹泻加重,可口服自制补液盐进行补液

C.若症状不能改善,可及时加用诺氟沙星

D.应给予少量、多次、清淡饮食

E.若患儿出现粪便带血等症状,必须及时就医

【98~101】

患者,女,65岁。因心绞痛就医,经检查后,医生为患者开具了如下处方:硝酸甘油舌下片、阿司匹林肠溶片、硝苯地平控释片。

98.药师应提醒患者,服用硝酸甘油舌下片时应该  

A.尽可能用舌头在口中移动以加速药物溶解

B.宜多饮水

C.咀嚼后用少量温水送服

D.用温水浸泡,待全部溶解后服用

E.服药后不要吸烟、进食

99.阿司匹林肠溶片应该  

A.整片吞服 B.掰碎吞服

C.用苏打水溶解后饮下 D.餐前服

E.睡前服

100.使用硝苯地平控释片时一定要  

A.服药时间固定 B.嚼碎服用

C.溶解后服用 D.睡前服用

E.舌下服用

101.药师对该病人作**用药指导**时,下列说法错误的是  举一 反三

- A.大便中含有药用骨架固体物质,属于正常现象
- B.可能有一定的胃肠道不适问题存在
- C.服用硝酸甘油后,头痛属于正常现象
- D.可以饮酒,对药效没有影响
- E.尽可能避免吸烟

【102~103】

患者,女,54岁,诊断为**类风湿关节炎**2年。目前服用甲氨蝶呤(15 mg qw)和塞来昔布(200 mg qd.)。患者因担心药品不良反应,用药不规律,时断时续,近日出现关节肿胀和疼痛加重,晨僵明显,加用泼尼松 10 mg qd.。

- 102.关于该患者**用药注意事项**的说法,错误的是
- A.应定期监测肝功能
 - B.泼尼松应于清晨服用
 - C.应定期监测血糖、血压
 - D.应定期监测骨密度
 - E.甲氨蝶呤应隔日一次用药

103.关于该患者**健康教育**的说法,错误的是

- A.早期治疗、遵医嘱规律用药
- B.多晒太阳,适量补充钙剂、维生素D,预防骨质疏松
- C.定期就诊,评估病情,调整治疗方案
- D.一旦症状改善,应即刻停药
- E.定期检测血常规、肝肾功能和粪隐血

【104~105】

患者,女,45岁,5个月前出现口吐白沫、意识丧失、二便失禁。在神经专科医生指导下,抗癫痫药物治疗监测效果较好。近3个月服用西咪替丁,患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱。该患者各地求医,服用各种药物,具体药物品种不详。围绕该病例,药师与医师对**抗癫痫药物的安全用药和用药注意事项**进行讨论。

- 104.与该患者出现**脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱**关联性较大的抗癫痫药物是
- A.地西泮
 - B.卡马西平
 - C.丙戊酸钠
 - D.苯巴比妥
 - E.苯妥英钠

105.关于癫痫患者的**抗癫痫药物合理应用与药学监护**,下列说法错误的是

- A.长期规律用药
- B.定期监测肝功能、血常规

C.有条件者应监测血药浓度

D.遵从联合用药治疗原则

E.因病情需要合并服用其他药物时,应实现咨询医师或药师,切忌自行用药

【106~108】

患者,女,6岁。因发热(体温 38.6 ℃)、头痛、鼻塞、流鼻涕、咳嗽、无痰就诊。实验室检查:白细胞、中性粒细胞计数正常。临床诊断为**普通感冒**。

106.治疗该患者**发热、头痛**,首选的药物是

- A.对乙酰氨基酚
- B.尼美舒利
- C.美洛昔康
- D.双氯芬酸钠
- E.氨基葡萄糖

107.治疗该患者**咳嗽**,首选的药物是

- A.可待因
- B.乙酰半胱氨酸
- C.溴己新
- D.右美沙芬
- E.氨溴索

108.根据该患者目前情况,**不宜**选用的药物是

- A.头孢克洛干混悬剂
- B.感冒清热冲剂
- C.葡萄糖酸锌口服液
- D.维生素C片
- E.复方小儿退热栓

【109~110】

患者,男,10岁。因肺炎、高热、浓痰就诊。医师处方:左氧氟沙星注射液 100 mL 静脉注射,连续3天;复方磷酸可待因溶液 100 mL,每次 10 mL,每天3次。

109.该处方审核结果为

- A.不规范处方
- B.超常处方
- C.不适宜处方
- D.合格处方
- E.医师处方

110.该处方审核结果的依据是

- A.用药一致
- B.出现用药禁忌
- C.过度治疗
- D.无适应证用药
- E.不适宜联合用药

四、多项选择题

111.关于**肝病**患者合并**结核**用抗结核药时,下列叙述正确的是

- A.一般发现过敏反应可不必停药
- B.除链霉素外,大部分抗结核药都容易引起肝损害
- C.必须应用抗肺结核药物的肝病者,可考虑使用异烟肼、利福平等肝脏损害较小的

药物

- D.接受异烟肼与利福平治疗者,应避免使用巴比妥类等肝药酶诱导剂
- E.发现肝损害应先停一种可疑药物,如不行再考虑停用另一种药物

112.《中华人民共和国药典临床用药须知》中规定必须做**皮肤敏感试验**的药物

有  举一 反三

- A.青霉素钠
- B.链霉素
- C.疫苗
- D.含碘对比剂
- E.甲钴胺

113.以下中成药中,含有麻黄碱成分的是

- A.防风通圣丸
- B.通宣理肺丸
- C.蛇胆川贝液
- D.消咳宁片
- E.麻杏石甘片

114.伴有**肾功能不全**的感染患者可以应用,但需要减少治疗剂量的抗菌药物是

- A.头孢他啶
- B.妥布霉素
- C.琥乙红霉素
- D.青霉素
- E.阿莫西林

115.关于**新药临床试验**,说法正确的有

- A.新药在上市前必须经过四期临床试验
- B.Ⅰ期临床试验属于初步的临床药理学及人体安全性评价试验阶段,试验对象主要为目标适应证患者
- C.Ⅱ期临床试验属于治疗作用的初步评价阶段,初步评价药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性
- D.Ⅲ期临床试验是新药得到批准生产后进行的扩大的临床试验阶段,进一步验证药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性
- E.上市后的临床试验称为药品临床再评价阶段

116.改善认知功能的**治疗阿尔茨海默病**的药物有

- A.文拉法辛
- B.阿米替林
- C.多奈哌齐
- D.丙米嗪
- E.卡巴拉汀

117.关于抗高血压药物的应用原则,叙述正确的是

- A.尽量采用最小有效剂量
- B.个体化治疗
- C.高剂量单一用药优于低剂量多药合用
- D.通常需要终身治疗
- E.最好选用可一天一次给药且能持续 24 h 降压作用的药物

118.下列药物中,属于**艾滋病治疗一线方案**的药物是

- A.拉米夫定
- B.扎那米韦
- C.司他夫定
- D.奈韦拉平
- E.恩夫韦替

119.关于类风湿关节炎的**糖皮质激素**治疗,下列说法正确的是  举一 反三

- A.小剂量使用
- B.短期使用
- C.密切监测血压及血糖变化
- D.用于关节腔注射,1年内不宜超过3次
- E.使用糖皮质激素时,需同时补充钙剂和维生素D

120.表现为**血肌酐**检测值增高的疾病有

- A.急性肾小球肾炎
- B.肾移植术后排异
- C.肾病综合征
- D.类风湿关节炎
- E.胃十二指肠溃疡



配套名师课程