

## 模拟试卷(一)

规定时间:120分钟

自测时间\_\_\_\_\_


试题预计完成时间\_\_\_\_\_

### 一、最佳选择题

1.中医理论认为“症”“证”“病”含义不同,下列表述中,属于“证”的是

- A.感冒  
B.咳嗽  
C.风寒犯肺  
D.鼻痒喷嚏  
E.恶寒发热

2.某女,64岁。近日由于肺气虚导致咳嗽痰多,后又引起食欲不振伴随便溏脾运化功

能减弱,该疾病的转变是  举一 反三

- A.相生  
B.子病及母  
C.相乘  
D.母病及子  
E.相侮

3.某男,62岁。患胸痹5年,胸痛胸闷,胸胁胀满,唇舌紫暗,脉涩。其证当属于

- A.寒凝心脉  
B.痰瘀痹阻  
C.气虚血瘀  
D.心肾阳虚  
E.气滞血瘀

4.“异病同治”的“异病”是指


- A.病因不同  
B.疾病不同  
C.证候不同  
D.病机不同  
E.症状不同

5.患儿,5岁。近日不思饮食,暖腐酸馊,脘腹胀满,疼痛拒按,大便酸臭,夜寐不安,手足心热。苔白厚腻,脉弦滑。治宜选用的方剂是

- A.消乳丸  
B.健脾丸  
C.枳术丸  
D.保和丸  
E.二陈汤

6.治疗阳虚证,使用补阳药时常佐用少量补阴药的治法,称为  举一 反三

- A.阴阳互制  
B.阳中求阴  
C.阴病治阳  
D.阳病治阴  
E.阴中求阳

7.脏腑生理功能减退,血液生成不及,运行迟缓水液在体内滞留等病变,与气机功能失常密切相关的是  举一 反三

- A.温煦作用  
B.推动作用  
C.防御作用  
D.固摄作用  
E.气化作用

8.可损害肝脏,肝功能不全者慎用,需炒黄去刺用的是

- A.半夏  
B.川乌  
C.皂角  
D.苍耳子  
E.刺蒺藜

9.人体生命活动的原动力是


- A.营气  
B.宗气  
C.卫气  
D.元气  
E.真气

10.有“气血生化之源”之称的脏腑是

- A.心  
B.肺  
C.脾  
D.肝  
E.肾

11.既为六腑,又为奇恒之腑的是

- A.胆  
B.筋  
C.肉  
D.脉  
E.髓

12.称为“阳脉之海”的经脉是  举一 反三


- A.带脉  
B.冲脉  
C.任脉  
D.督脉  
E.阴维脉

13.大活络丹可以和下列哪个药物合用

- A.天麻丸  
B.尪痹冲剂  
C.妙济丸  
D.川贝枇杷露  
E.蛇胆川贝液

14.处方书写白芥子,应付

- A.生白芥子  
B.炙白芥子  
C.麸炒白芥子  
D.清炒白芥子  
E.砂炒白芥子

15.医生在中药处方中应用不同的术语,对饮片炮制、产地、质地、采时、新陈、颜色、气味等有特殊要求加以注明。下列与药名有关的术语中,属于对质地有特殊要求的是  举一 反三



配套名师精讲课程

- A.田三七  
B.江枳壳  
C.陈香橼  
D.明天麻  
E.紫丹参

16.肾功能不全慎用的是

- A.三七  
B.草乌  
C.艾叶  
D.川楝子  
E.五倍子

17.梅核气为痰气凝结于

- A.经络  
B.咽喉  
C.筋骨  
D.胸肋  
E.胸膈

18.根据七情内伤致病理论,思虑太过可导致  举一 反三

- A.气上  
B.气结  
C.气消  
D.气下  
E.气乱

19.不能装在同一药斗中的

- A.羌活、独活  
B.升麻、葛根  
C.当归、川芎  
D.制草乌、制川乌  
E.当归、独活

20.诊断乙型肝炎的直接证据是

- A.HBsAg  
B.HBcAg  
C.HBV-DNA  
D.HBeAg  
E.抗-HBs

21.中医诊断用以分辨病位与病势深浅的纲领是

- A.表里  
B.寒热  
C.虚实  
D.气血  
E.阴阳

22.某女,35岁。出现表情淡漠,寡言少语,闷闷不乐,哭笑无常等症状,其临床意义是



- A.失神  
B.少神  
C.假神  
D.神乱  
E.无神

23.中成药合理利用正确的组合是

- A.天麻丸与川贝枇杷胶囊  
B.六味地黄丸与脑立清  
C.珍菊降压片与复方枇杷糖浆  
D.苏合香丸与胆宁片  
E.大活络丸与通宣理肺丸

24.某男,25岁。感受外邪后出现发热,微恶风,头胀痛,咳嗽少痰,咽痛口渴,舌尖红苔薄黄,脉浮数。应选用的中医治法是

- A.宣肺祛邪解表  
B.清热宣肺解表  
C.益气宣肺解表药  
D.清热解毒化痰  
E.养阴清肺解表

25.某男,28岁。患痤疮,症见面部粟疹累累,色红,疼痛,时有脓疱,口干渴,大便秘结,小便短赤,舌质红,苔薄黄,脉弦滑,治宜选用的方剂是

- A.二陈汤  
B.枇杷清肺饮  
C.茵陈蒿汤  
D.防风通圣散  
E.桃红四物汤

26.涩脉的主要病症

- A.血瘀  
B.食滞  
C.痰饮  
D.热证  
E.湿证

27.某男,65岁。因心悸自汗,神疲乏力,伴有胸痛就诊。医师检查见舌淡薄白,脉弱而涩,诊断为胸痹,辨证为气虚血瘀,其主要症状特点是

- A.胸痛胸闷,胸胁胀满  
B.胸闷如室,痛有定处  
C.胸痛隐隐,遇劳则发  
D.胸痛彻背,感寒痛甚  
E.胸痛彻背,腰酸肢肿

28.肾阳虚证的症状可见


- A.形体消瘦  
B.五心烦热  
C.口燥咽干  
D.形寒肢冷  
E.眩晕失眠

29.某女,42岁。今日失眠健忘,心悸怔忡,虚烦不安,盗汗,舌淡苔薄,脉细数,医师诊断为不寐,证属阴血亏虚,给了天王补心丹加减,方中酸枣仁调配应付的品种是

- A.生品  
B.麸炒品  
C.醋炒品  
D.清炒品  
E.盐炙品

30.某女,48岁。平素喜食辛辣,烦躁易怒,近来脘腹灼痛,泛酸嘈杂,口干口苦。舌红苔薄黄,脉弦数。治宜选用的中成药是

- A.加味左金丸  
B.沉香舒气丸



配套名师精讲课程

- C.附子理中丸  
E.香砂养胃丸
- 31.下列各组联用不合理的是
- A.金匱肾气丸与牛黄解毒片  
C.附子理中丸与健脾丸  
E.金锁固精丸与参苓白朮丸
- 32.某女,27岁。妊娠5个月,因上火导致咽喉肿病,口苦,小便黄赤,便秘,舌红,苔薄黄,脉弦数。该患者应慎用的中成药是
- A.咽喉消炎丸  
C.牛黄消炎片  
E.蒲地蓝消炎口服液
- 33.某男,53岁。患头痛多年,3天前因受情志刺激而加重。现头痛目眩,口干口苦,心烦易怒,夜寐不宁。舌红苔薄黄,脉弦有力。治宜选用的方剂是
- A.芎菊上清丸  
C.通窍活血汤  
E.杞菊地黄丸
- 34.中西药连用,能减少西药用药剂量的药组是 举一反三
- A.石麦汤与氯氮平  
C.地西洋与苓桂术甘汤  
E.女金丹与诺氟沙星
- 35.极易霉变的环境条件是
- A.温度 20~35℃,相对湿度 75%以上  
C.温度 10~20℃,相对湿度 75%以上  
E.温度 20~35℃,相对湿度 60%以下
- 36.某男,50岁。形体肥胖,经常眩晕,头重加裹,胸闷恶心,食少多寐。舌苔白腻,脉濡滑。治宜选用的中成药是
- A.当归龙荟丸  
C.济生肾气丸  
E.半夏天麻丸
- 37.含咖啡因的中成药有
- A.强力感冒片  
C.感冒灵胶囊  
E.玉屏风颗粒
- D.枳实导滞丸  
B.益母草颗粒与妇血康颗粒  
D.牛黄清心丸与柏子养心丸
- B.万氏牛黄清心丸  
D.芩翘口服液
- B.丹参注射液与多巴胺  
D.蛤蚧定喘丸与异烟肼
- B.温度 20~35℃,相对湿度 75%以下  
D.温度 10~20℃,相对湿度 75%以下
- B.正天丸  
D.归脾丸
- B.桑菊感冒片  
D.荆防颗粒

38.山药丸中的有毒中药是

- A.朱砂  
C.附子  
E.雪上一枝蒿
- B.雄黄  
D.马钱子

39.某女,46岁。因小便频数短赤、灼热疼痛就诊,中医诊断为淋证,

可参考淋证辨治的西医疾病是

- A.泌尿系感染  
C.肾功能衰竭  
E.肾小球肾炎
- B.性功能障碍  
D.肾病综合征

40.即含朱砂又含雄黄的中成药是

- A.六神丸  
C.天王补心丸  
E.追风丸
- B.舒筋丸  
D.牛黄清心丸

## 二、配伍选择题

【41~42】 举一反三

- A.板蓝根与大青叶  
C.陈皮与青皮  
E.麻黄与麻黄根
- B.阿魏与鸡矢藤  
D.山药与天花粉

41.按照斗谱编排基本原则,因植物来源相同但入药部位和功效不同,不能排列在一起的饮片是

42.按照斗谱编排基本原则,因外观形状相似但功效不同,不能排列在一起的饮片是

【43~44】

- A.心  
C.脾  
E.肾
- B.肝  
D.肺

43.某女,41岁。闭经半年余,妊娠反应阴性,体检无其他疾病,来医院就诊。辨证为冲任亏虚、天癸早衰。根据藏象理论,与天癸密切相关的脏是

44.某女,35岁。经常情志抑郁,善太息,食少纳呆,月经不调,诊断为郁证。根据藏象理论,主司疏泄、调畅气机的脏是

【45~46】

- A.髓海  
C.气海  
E.十二经脉之海
- B.血海  
D.水谷之海

45.胃被称为

46.膻中被称为

【47~49】

A.牡丹皮

B.花椒

C.绿豆

D.大蒜

E.细辛

47.泽泻对抗养护宜选

48.人参对抗养护宜选

49.硼砂对抗养护宜选

【50~51】  

A.实寒证

B.实热证

C.虚寒证

D.虚热证

E.亡阳证

50.阳偏盛病机表现的临床证候是

51.阳偏衰病机表现的临床证候是

【52~53】

A.实中夹虚

B.虚中夹实

C.真虚假实

D.真实假虚

E.因虚致实

52.某男,40岁。腹胀痛拒按,潮热谵语,但下利清水。辨证为热结旁流,病机为“大实有羸状”,属于

53.某男,62岁。腹胀腹痛,时胀时止,食少便溏。自行服用气滞胃痛颗粒,症状不减。辨证为脾失健运,病机为“至虚有盛候”,属于

【54~57】

A.千张纸

B.木棉

C.紫参

D.紫丹参

E.淡大芸

54.丹参的别名是

55.肉苁蓉的别名是

56.拳参的别名是

57.杜仲的别名是

【58~59】

A.赤芍

B.木通

C.大腹皮

D.白芷

E.牛膝

58.需防蛀贮存的中药是

59.需防霉贮存的中药是

【60~62】

A.意识不清,突然转佳

B.心烦不宁,呼号骂闹

C.表情淡漠,哭笑无常

D.意识模糊,目光呆滞

E.昏不知人,四肢抽动

60.某女,20岁。平素情志抑郁,因失恋而致神志异常,诊断为癡病,临床表现可见

61.某女,37岁。平素性情急躁,因暴怒而致神志异常,诊断为狂病,临床表现可见

62.某女,31岁。患癡病多年。发作时突然出现神志异常,临床表现可见

【63~64】

A.手厥阴心包经

B.手阳明大肠经

C.足少阳胆经

D.足阳明胃经

E.足太阴脾经

63.手太阴肺经下接

64.手少阳三焦经下接

【65~67】  

A.纳食减少,食后作胀,肢体浮肿,大便溏泻

B.纳食减少,脘腹胀满,头重身倦,便溏稀薄

C.纳食减少,食后作胀,少腹下坠,内脏下垂

D.纳食减少,腹中冷痛,口泛清水,四肢不温

E.纳食减少,脘腹胀满,黄疸鲜明,发热口苦

65.脾失健运证,常见的临床表现是

66.脾阳虚证,常见的临床表现是

67.寒湿困脾证,常见的临床表现是

【68~69】

A.午后发热,五心烦热

B.午后热甚,身热不扬

C.日晡热甚,腹痛便秘

D.长期低热,劳倦则甚

E.发热烦渴,汗多脉洪

68.某男,30岁。居处潮湿,长夏发病。诊断为湿温潮热,其发热特征是

69.某男,30岁。经常便秘,因饮酒且过量食用辛辣烤炙之品而发病。诊断为阳明潮热,其发热特征是

【70~72】

- A. 导致精子产生和成熟发生障碍,抑制女性患者卵巢功能
- B. 恶心呕吐,腹痛腹泻,重者可见黄疸、肝肿大、消化道出血
- C. 直接作用于中枢神经系统,甚或因呼吸中枢完全麻痹而致死
- D. 血小板、白细胞、血红蛋白减少,并可发生急性粒细胞减少
- E. 心律失常,如心率减慢、早搏、房室传导阻滞

70. 苍耳子的主要不良反应是

71. 香加皮的主要不良反应是

72. 细辛的主要不良反应是

【73~75】  举一反三

- A. 柴胡疏肝散加减
- B. 黄芪建中汤加减
- C. 良附丸加减
- D. 左金丸加减
- E. 保和丸加减

73. 某男,21岁。胃痛胀满,噎腐恶食,大便不爽;舌质红,苔厚腻,脉滑,应选用的方剂是

74. 某男,33岁。胃痛暴作,喜温恶寒,得温痛减,口和不渴;舌质淡,苔薄白,脉弦紧。

应选用的方剂是

75. 某女,36岁。胃脘胀痛,连及肋助,善太息生气后症状加重,食欲不振;舌质红,苔薄白脉弦。应选用的方剂是

【76~78】

- A. 肝阳化风
- B. 血虚生风
- C. 热极生风
- D. 阴虚风动
- E. 血燥生风

76. 某男,73岁。平素头胀头痛,午后颧红,口渴咽干。因操劳过度突然发病,肢麻震颤,舌体歪斜,来院急诊。中医辨证为

77. 患儿,5岁。咽部红肿疼痛3日,体温39.9℃,突然肢体抽搐,两眼上翻,来院急诊。中医辨证为

78. 某女,30岁。难产,分娩后头晕目眩,视物模糊,肌肉颤动,手足拘急,面色无华,口唇色淡,中医辨证为

【79~80】  举一反三

- A. 肝气郁结
- B. 脾肾阳虚
- C. 肝肾不足
- D. 阴虚火旺
- E. 肾阴不足

79. 某女,53岁。经断前后,腰膝酸软,烘热汗出,五心烦热,月经周期紊乱,舌红苔少,



配套名师精讲课程

脉细数。中医辨证为

80. 某女,55岁。经断前后,头晕耳鸣,食少便溏,腰膝酸软,腹阴冷坠,形寒肢冷,带下量多,面色晦暗。舌淡,苔白滑,脉沉细而迟,中医辨证为

【81~82】

- A. 盗汗
- B. 自汗
- C. 战汗
- D. 大汗
- E. 绝汗

81. 经常汗出不止,活动后加重

82. 入睡则汗出,醒后则汗止

【83~85】

- A. 桑菊饮
- B. 百合固金汤
- C. 桑杏汤
- D. 清金化痰汤
- E. 银翘散

83. 某女,25岁。干咳少痰,不易咳出,鼻燥咽干。舌红少津,脉细数。辨证为燥邪伤肺,治宜选用的方剂是

84. 某女,40岁。干咳少痰,痰中带血,午后咳甚,五心烦热,潮热盗汗。舌红少苔,脉细数。辨证为肺肾阴虚,治宜选用的方剂是

85. 某男,31岁。咳嗽气粗,咳痰气粗,咳痰黏稠,咽痛,口微渴。舌边尖红苔薄黄,脉浮数。辨证为风热犯肺,治宜选用的方剂是

【86~87】

- A. 痿软舌
- B. 瘦薄舌
- C. 齿痕舌
- D. 裂纹舌
- E. 芒刺舌

根据中医望诊理论

86. 热盛津伤可见

87. 脾虚湿盛可见

【88~90】  举一反三

- A. 蟾酥
- B. 白降丹
- C. 生千金子
- D. 雄黄
- E. 生马钱子

毒性中药系指毒性剧烈,治疗剂量与中毒剂量相近,使用不当会致人中毒或死亡的中药。因此执业药师在审核或调剂含有特殊管理毒性中药的处方时,掌握其用法用量非常重要。

- 88.内服,用量0.05~0.1 g,入丸散用的毒性中药是
- 89.内服,用量0.3~0.6 g,炮制后入丸散用的毒性中药是
- 90.仅供外用的毒性中药是

三、综合分析选择题

(一)

某女,32岁。平素性情急躁易怒,月经不调,因胃痛1周就诊,胃脘灼痛,痛势急迫,烧心泛酸,口苦口干,舌红苔黄,脉弦。

91.该患者舌红提示属于

- A.虚寒证
- B.实热证
- C.虚热证
- D.瘀血症
- E.痰湿证

92.该患者弦脉提示病位相关之脏是

- A.肝
- B.心
- C.脾
- D.肺
- E.肾

(二)

某男,75岁。小便点滴而下,尿如细线,烦躁口苦,舌紫暗,苔黄腻,脉涩。

93.该患者苔黄腻,其临床意义是

- A.湿浊
- B.虚热
- C.瘀血
- D.湿热
- E.水滞

94.四诊合参,病机属于

- A.湿热瘀阻
- B.湿热下注
- C.结石瘀血
- D.热盛津伤
- E.阴虚火旺

(三)

某患者近2年来因不满意自己的工作环境,经常出现精神抑郁,情绪不宁,胸闷太息,胁肋胀痛,乏力萎靡,头晕目眩,不思饮食等症状。按照藏象理论,回答以下问题。

95.该患者病变所影响的脏是

- A.肝
- B.心
- C.脾
- D.肺
- E.肾

96.该病功能失常的是

- A.心主神志
- B.肝主疏泄
- C.肺主治节
- D.脾主运化
- E.肝主藏血

97.与该脏相关的开窍是

- A.肺开窍于鼻
- B.心开窍于舌
- C.心开窍于耳
- D.肝开窍于目
- E.脾开窍于口

(四)

某男,65岁。咳喘10余年,气短乏力,痰多清稀,食纳减少,腹胀便溏,足面浮肿。舌淡苔白,脉细弱。

98.中医辨证是

- A.肾不纳气
- B.肺肾两虚
- C.心肾阳虚
- D.心肺两虚
- E.肺脾两虚

99.辨证要点是既有咳喘、纳少,又兼见

- A.气虚
- B.气滞
- C.血虚
- D.阴虚
- E.阳虚

100.根据八纲辨证,该证属于

- A.表证
- B.寒证
- C.热证
- D.虚证
- E.阳证

(五) 举一反三

某女,29岁。咳嗽2月余,干咳无痰,咽喉干痒,时有声音嘶哑,舌红少苔,脉细数。

101.根据八纲辨证,该证属于

- A.实证
- B.虚证
- C.表证
- D.阳证
- E.寒证

102.根据脏腑辨证,该证属于

- A.脾气虚
- B.风寒袭肺
- C.肺阴虚
- D.风热犯肺
- E.肝火犯肺



配套名师精讲课程

103.根据辨证结果,应采取的治法是

- A.滋阴润肺  
B.补气益肺  
C.辛凉清润  
D.宣肺散寒  
E.清肝滋润

(六)

患者,男,36岁。结婚七年至今无子,半个月前曾到某医院检查,发现精子不正常,总数为1亿,活动力差(20%)。自觉腰部酸软疼痛,精神疲乏,时有耳鸣。按照藏象理论,回答以下问题。

104.该患者病变所影响的脏腑是

- A.肝  
B.心  
C.脾  
D.肺  
E.肾

105.该病功能失常的是

- A.心主神志  
B.脾主统血  
C.肾主藏精  
D.脾主运化  
E.肾主纳气

106.该脏在体为

- A.肺在体为皮  
B.心在体为脉  
C.肾在体为骨  
D.肝在体为筋  
E.脾在体为肉

(七)

某女,51岁。因反复胸闷、胸痛2年余就诊。2年前因琐事与人争吵后,出现左前胸胀痛,伴胸胁胀闷,心悸,休息后缓解,未予重视。此后,胸闷胸痛反复发作,多于情绪波动后症状加重,严重时放射至左后肩。患者情志抑郁,善太息,纳差,寐欠安,小便黄,大便调,唇舌紫暗,脉弦涩。既往有慢性乙型肝炎10余年对酒精过敏。临床给予血脂谱、肝肾功能、心肌酶谱、心电图及平板运动试验等检查,西医诊断为冠心病心绞痛,中医诊断为胸痹,辨证为气滞血瘀,处方如下:中药汤剂:柴胡10g,赤芍10g,炒枳壳10g,生甘草10g,桃仁10g,红花9g,生地黄15g,川牛膝10g,当归9g,党参15g,炙乳没(各)6g,桔梗9g,川楝子15g,延胡索粉(分冲)3g。共5剂,水煎服,每日1剂,早、晚分服中成药:血府逐瘀口服液10m×12支,10ml/次,3次/日 复方丹参滴丸25mg×100丸,10丸/次,3次/日,速效救心丸40mg×100丸,舌下含服10粒,必要时服用茵栀黄口服液10ml×10支,10m次,3次/日。

107.执业药师在审核该患者的中药饮片处方时应指出处方存在的问题是

- A.党参与赤芍属配伍禁忌  
B.生地黄的每日剂量超量  
C.川楝子的每日剂量超量  
D.延胡索粉的药注错误  
E.炙乳没应是炙乳香

108.对上述处方用药的合理性分析,正确的是

- A.汤剂与复方丹参滴丸同时服用,属于重复用  
B.汤剂与血府逐瘀口服液同时服用,属于重复用药  
C.汤剂与速效救心丸同时服用,属于重复用药  
D.汤剂与茵栀黄口服液同时服用,属于重复用  
E.复方丹参滴丸与茵栀黄口服液同时服用,属于重复用药

109.执业药师给该患者发放药品的用药交待正确的是

- A.中药汤剂每日1剂,每剂煎煮2次,每次服用400毫升  
B.所服汤剂及成药中含赤芍、生地黄、冰片等寒凉之品,服药期间应忌食生冷  
C.中药汤剂对胃肠有轻微刺激应在早、晚餐前服用  
D.复方丹参滴丸必须舌下含服,每次10丸,每日3次,长期服用  
E.速效救心丸应舌下含服,每次10丸,每日3次

110.该患者在服用中药治疗的第2天,胃脘部不适加重,并伴恶心呕吐症状,执业药师对此种现象的分析,最恰当的是

- A.所服中药汤剂中含有红花,可能存在消化道  
B.所服中成药中含有丹参,可能存在消化道刺激  
C.所服血府逐瘀口服液中含有酒精,可能存在消化道刺激  
D.所服中药剂中含有乳没,可能存在消化道刺激  
E.所服中药延胡索应该煮后再入药,可避免消化道刺激

#### 四、多项选择题

111.依据五行相克规律确立的治法有



- A.培土制水法  
B.滋水涵木法  
C.泻南补北法  
D.佐金平木法  
E.抑木扶土法

112.关于肝与志、液、体、华、窍关系的表述正确的有

- A.在志为怒  
B.在液为汗  
C.在体为筋  
D.在华为发  
E.在窍为目

113.时行感冒时可以选择用那些中成药

- A.复方金黄连颗粒
- B.清开灵颗粒
- C.羚羊感冒片
- D.正柴胡饮颗粒

E.连花清瘟胶囊

114.多食**肥甘厚味**容易



- A.生痰
- B.助湿
- C.化热
- D.发生痈疡

E.发生瘰疬

115. **出血**可能由什么引起

- A.外伤
- B.气虚
- C.血虚
- D.血热

E.血寒

116. **未病先防**的原则和方法有  

- A.重视精神调养
- B.加强身体锻炼
- C.控制疾病传变
- D.注意生活起居

E.避免病邪侵害

117.处方写**潼白蒺藜**应付

- A.潼蒺藜
- B.白蒺藜
- C.刺蒺藜
- D.沙苑子

E.决明子

118.某男,5岁。来医院就诊。见面色苍白、神疲乏力、夜不能寐、舌质淡,属于**气血两虚**,可用于婴幼儿益气养血的中药有



- A.黄芪
- B.党参
- C.当归
- D.黄精

E.大枣

119.在疾病发展过程中,病变有本质和征象一致者,病变有本质和征象不一致者。因此临床治疗有正治有反治的不同。下列属于**正治**的有

- A.寒者热之
- B.寒因寒用
- C.热者寒之
- D.热因热用

E.虚则补之

120.具有**协同增效**作用的中西药联用药组有  

- A.甘草与呋喃唑酮联用治疗肾盂性肾炎
- B.黄连、黄柏与磺胺甲基异噁唑联用治疗痢疾

C.甘草与氢化可的松联用于抗炎

D.丹参注射液与间羟胺联用于升压

E.柴胡桂枝汤与苯妥英钠联用治疗癫痫



## 模拟试卷(二)

规定时间:120 分钟

自测时间 \_\_\_\_\_

试题预计完成时间 \_\_\_\_\_

### 一、最佳选择题

1. 西医学的**阴道炎**、**宫颈炎**、**盆腔炎**性疾病在中医中可参考什么病治疗



- A. 痛经  
B. 崩漏  
C. 带下过多  
D. 月经的不调  
E. 痹证

2. 某男,23 岁。颜面、胸背痤疮,多时散发于全身,有时聚集于一处,此愈彼起,十分痛苦,常伴有**皮肤油腻**、**口渴**、**尿黄**、**便秘**。舌红苔黄腻,脉滑数,治宜选用的中成药是

- A. 清肺抑火丸  
B. 银翘解毒片  
C. 连翘败毒丸  
D. 湿毒清胶囊  
E. 防风通圣丸

3. 根据中医理论,“病”“证”“症”的概念不同,下列表述中属于“病”的是

- A. 厌食  
B. 吸气  
C. 脘痞  
D. 腹胀  
E. 便溏

4. 某女,年过六旬。**神疲乏力**,声音低微,**自汗**,舌质淡,或有齿痕,脉虚无力,病为虚劳。其证当属于  

- A. 气虚  
B. 血虚  
C. 阴虚  
D. 阳虚  
E. 阴阳两虚。

5. 在五行中,“木”的特性为

- A. 升腾  
B. 收敛  
C. 滋润  
D. 生化  
E. 舒畅

6. 某男,59 岁。近日由于**肝阳上亢**导致头痛、烦闷。后又引起**心慌**、**气短**、**胸闷乏力**,该疾病的转变是

- A. 相生  
B. 子病及母  
C. 相乘  
D. 母病及子  
E. 相侮



配套名师精讲课程

7. 某女,35 岁。胃痛胀满,噎腐恶食,矢气后痛减,医生辨证为**饮食停滞证**。治宜选用的中成药是

- A. 良附丸  
B. 保和丸  
C. 左金丸  
D. 四神丸  
E. 健脾丸

8. 某男,28 岁。鼻塞流脓涕,量多,呈**黄绿色**,有臭味,嗅觉差,头痛,目眩,耳鸣,口苦,心烦易怒,小便黄赤。舌红苔黄,**脉弦数**。治宜选用的中成药是

- A. 鼻炎片  
B. 藿胆片  
C. 辛夷鼻炎丸  
D. 珠黄散  
E. 鼻窦炎口服液

9. 下列**不属于藏医**的治疗方法是

- A. 滴鼻法  
B. 平息法  
C. 抽油法  
D. 消散法  
E. 罨敷法

10. 在服用**茯苓**时忌用的是

- A. 大葱  
B. 蜂蜜  
C. 常山  
D. 醋  
E. 鳖甲

11. 对**黄疸性肝病疗效最佳**的藏药是  

- A. 五味渣驯丸  
B. 六味安消散  
C. 七味红花殊胜丸  
D. 八味沉香散  
E. 十一味金色丸

12. 某女,55 岁。头痛 10 年,**久治不愈**。痛如针刺,**固定不移**,舌紫,脉细涩。治宜选用的方剂是

- A. 补阳还五汤  
B. 川芎茶调散  
C. 通窍活血汤  
D. 羚角钩藤汤  
E. 龙胆泻肝汤

13. 下列药品信息中,执业药师在向医师提供新药咨询时**不必**提供的是

- A. 组方成分  
B. 质量标准  
C. 功效主治  
D. 用法用量  
E. 不良反应

14. **表热证**用**辛凉解表**方药,**里热**证用**清热泻火**方药治疗,体现的治法是

- A. 寒者热之  
B. 热者寒之

C.用热远热 D.寒因寒用

E.热因热用

15.某男,39岁。肛内肿物脱出,肛管紧缩,坠胀疼痛,触痛明显,舌质暗红,苔薄白,脉细涩,中医辨证为**内痔气滞血瘀证**,治宜选用的方剂是

A.止痛如神汤 B.凉血地黄汤

C.补中益气汤 D.桃仁承气汤

E.四妙勇安汤

16.处方书写**穿山甲**应付

A.麸炒品

B.烫制品

C.煅制品

D.炭制品

E.清炒品

17.导致血清**碱性磷酸酶(ALP)**升高的疾病是

A.心肌梗死

B.溶血性疾病

C.胸腔积液

D.骨骼疾病

E.前列腺肿瘤

18.某女,49岁。精神抑郁,情绪不宁,胸胁胀痛,胸闷暖气善太息。舌苔薄腻,脉弦。医生诊断为**郁证**,其中医证候是

A.气滞血瘀

B.肝阳上亢

C.心脾两虚

D.痰气郁结

E.肝气郁结

19.称为“**阴脉之海**”的经脉是

A.带脉

B.冲脉

C.任脉

D.督脉

E.阴维脉

20.某男,20岁。身体**偏热多动、好兴奋**,其体质类型应辨为

A.偏阴质

B.偏阳质

C.瘀血质

D.痰湿质

E.阴阳平和质

21.**八纲辨证**中,**寒热**症候主要辨证的是

A.疾病部位

B.疾病原因

C.疾病性质

D.病势趋向

E.疾病传变

22.**极易生虫**的药材

A.肉桂

B.麦冬

C.白芷

D.赤芍

E.连翘

23.系统论述医德规范,著有“**大医精诚**”专论的方书典籍是

A.《普济方》

B.《千金翼方》

C.《备急千金药方》

D.《太平圣惠方》

E.《太平惠民和剂局方》

24.湿度是影响药物质量的一个重要因素,不仅可引起药物的物理和化学变化,如含水量,外观形态、化学成分发生改变等,而且能影响微生物的繁殖及害虫的生长。**一般中药炮**

**制品的质量控制和贮藏要求**应是

A.绝对含水量应控制在7%~13%,贮存环境的相对湿度应控制在35%~75%

B.绝对含水量应控制在9%~13%,贮存环境的相对湿度应控制在30%~70%

C.绝对含水量应控制在7%~15%,贮存环境的相对湿度应控制在35%~75%

D.绝对含水量应控制在9%~15%,贮存环境的相对湿度应控制在35%~70%

E.绝对含水量应控制在8%~15%,贮存环境的相对湿度应控制在40%~70%

25.依据七情内伤致病的理论,**悲哀太过**常导致

A.气上

B.气结

C.气消

D.气下

E.气乱

26.药师调剂处方时必须做到“四查十对”,“**十对**”中有一项内容是

A.对处方

B.对药品

C.对药名

D.对配伍

E.对用药合理性

27.**易发生霉变**的药材是

A.牛膝

B.白芷

C.苍术

D.胆矾

E.豆蔻

28.含**氢氯噻嗪**的是

A.冠通片

B.新癬片

C.脂降宁

D.脉络通

E.珍菊降压片

29. 中医诊断用以分辨邪正盛衰的纲领是

- A. 阴阳
- B. 表里
- C. 寒热
- D. 虚实
- E. 气血

30. 某女, 25岁。不寐, 心烦, 口渴, 咽燥, 口舌生疮, 小便短赤, 舌尖红, 苔薄, 脉数, 应选

用的中成药是  举一 反三

- A. 人参归脾丸
- B. 天王补心丸
- C. 朱砂安神丸
- D. 养血安神丸
- E. 解郁安神颗粒

31. 某男, 6岁。厌食, 面色萎黄, 神疲多汗, 大便稀薄, 夹有未消化食物, 形体偏瘦, 肢倦乏力。治宜选用的方剂是

- A. 消乳丸
- B. 归脾丸
- C. 四物汤
- D. 清宁丸
- E. 异功散

32. 中药番红花的正名是

- A. 红花
- B. 藏红花
- C. 西红花
- D. 草红花
- E. 红蓝花

33. 由于外观性状相似, 不宜排列在一起的是

- A. 麻黄与麻黄根
- B. 附子与续断
- C. 当归与地肤子
- D. 蛇床子与地肤子
- E. 细辛与人参

34. 服用四神丸, 宜用的“药引”是

- A. 黄酒
- B. 姜汤
- C. 米汤
- D. 盐水
- E. 清茶

35. 中药七叶一枝花的正名是

- A. 蚤休
- B. 紫参
- C. 玉果
- D. 重楼
- E. 草河车

36. 服用银翘解毒丸宜选用的“药引”是

- A. 姜汤
- B. 米汤

C. 盐水

D. 黄酒


E. 鲜芦根煎汤

37. 肾功能不全的慎用的是

- A. 苦杏仁
- B. 艾叶
- C. 雷公藤
- D. 忍冬藤
- E. 夜交藤

38. 某女, 28岁。已妊娠2月, 因关节痛就诊, 医师处方时应禁用的中药是

- A. 川芎
- B. 丹参
- C. 莪术
- D. 当归
- E. 苍术

39. 肝功能不全者应慎用的中药是  举一 反三

- A. 枸杞子
- B. 菟丝子
- C. 决明子
- D. 五味子
- E. 川楝子

40. 主含土的宁的有毒中药是

- A. 川乌
- B. 半夏
- C. 雷公藤
- D. 马钱子
- E. 黄药子

## 二、配伍选择题

【41~44】

- A. 肝火犯肺证
- B. 心肝火旺证
- C. 肝脾不调证
- D. 肝胃不和证
- E. 肝肾阴虚证

41. 脘胁胀痛, 吞酸嘈杂, 常见于

42. 胸胁胀闷, 腹胀便溏, 常见于

43. 头晕目眩, 腰膝酸软, 常见于

44. 胸胁窜痛, 咳嗽阵作, 常见于

【45~47】

- A. 清宁丸
- B. 加味保和丸
- C. 槟榔四消丸
- D. 麻仁滋脾丸
- E. 九制大黄丸

45. 某男, 58岁。大便干结, 小便短赤, 腹胀腹痛, 口干口臭。舌红苔黄腻, 脉滑数。辨



配套名师精讲课程

证为**热结肠胃**,治宜选用的中成药是

46.某男,79岁。大便秘结,欲便不得,腹中胀痛,纳食减少。舌淡白,脉弦。辨证为**气滞郁结**,治宜选用的中成药是

47.某女,67岁。大便秘结,面色无华,头晕目眩,口干。舌淡太少,脉细涩。辨证为**津亏肠燥**,治宜选用的中成药是

【48~50】

- |           |          |
|-----------|----------|
| A.灯心草煎汤送服 | B.淡盐水送服  |
| C.黄酒送服    | D.生姜煎汤送服 |
| E.蜂蜜冲水送服  |          |

48.**九味羌活丸**可用的药引和服用方法是

49.**附子理中丸**可用的药引和服用方法是

50.**腰痛宁胶囊**可用的药引和服用方法是

【51~52】

- |        |        |
|--------|--------|
| A.影响吸收 | B.影响代谢 |
| C.增加排泄 | D.影响分布 |
| E.减少排泄 |        |

51.中西药联用时,**麻仁丸与红霉素**合用,可发生的药动学相互作用是

52.中西药联用时,**女金丹与诺氟沙星**合用,可发生的药动学相互作用是

【53~55】

- |           |            |
|-----------|------------|
| A.乌梅与阿司匹林 | B.乌贝散与头孢拉定 |
| C.石膏与四环素  | D.麻黄与呋喃唑酮  |
| E.大黄与利福平  |            |

53.能**减少药物排泄**的中西药联用药组是

54.能**发生酶抑反应**的中西药联用药组是

55.影响**药物透过生物膜**吸收的中西药联用药组是

【56~59】

- |      |       |
|------|-------|
| A.芫花 | B.丹参  |
| C.犀角 | D.五灵脂 |
| E.郁金 |       |

56.**甘草反**

57.**藜芦反**

58.**草乌畏**

59.**丁香畏**

【60~61】

- |       |      |
|-------|------|
| A.土鳖虫 | B.蛤蚧 |
| C.人参  | D.泽泻 |
| E.葶澄茄 |      |

60.按照对抗贮存法,宜与**牡丹皮同贮**的是

61.按照对抗贮存法,宜与**吴茱萸同贮**的是

【62~63】

- |       |         |
|-------|---------|
| A.固阴煎 | B.丹栀逍遥散 |
| C.圣愈汤 | D.杞菊地黄丸 |
| E.右归丸 |         |

62.某女,18岁。月经提前,量多,经色紫红,质稠有块,经前乳房、少腹胀痛烦躁易怒,口苦咽干。舌红苔黄,脉弦数。辨证为**肝经郁热**,治宜选用的方剂是

63.某女,35岁。月经提前,量少,色淡质稀,腰酸腿软,头晕耳鸣,小便频数。舌淡暗苔薄白,脉沉细。辨证为**肾气虚证**,治宜选用的方剂是

【64~66】

- |             |             |
|-------------|-------------|
| A.呼吸不畅,胸闷气短 | B.呼吸有力,声高气粗 |
| C.呼吸困难,短促急迫 | D.呼吸困难,喉中有声 |
| E.呼多吸少,气不得续 |             |

64.**实热**多见

65.**虚喘**多见

66.**哮证**多见

【67~68】

- |        |        |
|--------|--------|
| A.齿稀根露 | B.齿龈红肿 |
| C.齿龈青紫 | D.齿龈淡白 |
| E.牙齿蛀蚀 |        |

67.根据中医望诊理论,**肾虚**可见

68.根据中医望诊理论,**血虚**可见

【69~70】

- |       |       |
|-------|-------|
| A.炭制品 | B.麸炒品 |
| C.醋炙品 | D.盐炙品 |
| E.清炒品 |       |



配套名师精讲课程

某女,25岁。月经量多,淋漓不断,色淡质稀,气短懒言,四肢不温。舌淡胖苔薄白,脉缓弱。中医诊断为崩漏,证属脾不统血,治以固冲汤(白术、黄芪、煅龙骨、煅牡蛎、山茱萸、白芍、海螵蛸、茜草根、蒲黄、五倍子)

- 69.该处方中的**白术**,调配时应付  
70.该处方中的**蒲黄**,调配时应付

【71~74】  

- A.鹿角霜  
B.鹿角胶  
C.蒲黄  
D.砂仁  
E.当归

- 71.需**包煎**的药是  
72.需**后下**的药是  
73.需用**先煎**的药是  
74.需**烊化**的药是

【75~76】

- A.荆芥  
B.白芍  
C.莱菔子  
D.熟地黄  
E.薏苡仁

- 75.适宜**阴凉**干燥的是  
76.适宜**通风**干燥的是

【77~79】  

- A.培元通脑胶囊  
B.消栓胶囊  
C.逐瘀通脉胶囊  
D.银杏叶片  
E.麝香保心丸

由于老年人的器官或细胞的敏感性增强,尤其是对中枢神经抑制药物、降血糖药物、心血管系统药物反应特别敏感,在正常剂量下的不良反应增加,甚至出现药源性疾病,因此在联合用药中应高度重视。

- 77.老年人使用**法莫替丁**时,应避免联用  
78.老年人在服用**地高辛**时,应避免联用  
79.患有心脑血管疾病的老年糖尿病患者使**二甲双胍**降糖时,应避免联用

【80~82】

- A.通宣理肺丸  
B.二母宁嗽丸  
C.蛇胆川贝液  
D.固本止咳片

- E.小青龙合剂  
80.治疗咳嗽**燥邪伤肺**证,宜选用的中成药是  
81.治疗咳嗽**风寒犯肺**证,宜选用的中成药是  
82.治疗咳嗽**痰热壅肺**证,宜选用的中成药是

【83~84】

- A.恶心呕吐、口中有金属味,腹痛腹泻,口腔黏膜充血,牙龈肿胀溃烂  
B.胸闷,心悸,喉咙干痛,四肢无力,心电图房室传导阻滞  
C.头晕,头痛,烦躁不安,面部肌肉紧张,吞咽困难  
D.严重脱水,低蛋白血症,水肿,精神错乱,幻觉,癫痫样发作  
E.口舌,四肢及全身麻木,头痛,头晕,精神恍惚,牙关紧闭,呼吸衰竭  
83.**朱砂中毒**的主要临床表现  
84.**乌头中毒**的主要临床表现

【85~86】  

- A.不超过 20 ℃  
B.避光且不超过 20 ℃  
C.2~10 ℃  
D.10~30 ℃  
E.2~8 ℃

- 85.**冷处**所指的环境条件是  
86.**阴凉处**所指的环境条件是

【87~88】

- A.另煎  
B.先煎  
C.包煎  
D.后下  
E.捣碎同煎

某女,65岁。大便时溏时泻,水谷不化,稍进油腻之物则大便次数增多,面色萎黄,肢倦乏力。中医辨证为脾胃气虚,治以参苓白术散(人参、茯苓、白术、桔梗、山药、炙甘草、白扁豆、莲子肉、砂仁、薏苡仁)。执业药师发药时,需向患者说明煎药方法

- 87.方中**砂仁**的特殊煎法是  
88.方中**人参**的特殊煎法是

【89~90】

- A.心与肾  
B.脾与肾  
C.肺与心  
D.肝与肾  
E.肾与肺

- 89.治疗**水肿、心悸**等症,主要责于

90. 治疗呼吸不畅、纳气、咳喘等症, 主要责于

三、综合分析选择题

(一)

某男, 70岁。冠心病史7年。常感胸痛隐隐, 神疲乏力, 气短懒言, 心悸自汗, 舌淡暗苔白, 脉弱。

91. 中医辨证为

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 寒凝心脉 | B. 痰瘀痹阻 |
| C. 气虚血瘀 | D. 气阴两虚 |
| E. 心肾阳虚 |         |

92. 根据辨证结果, 应采用的治法是

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 温阳散寒 | B. 益气活血 |
| C. 豁痰化瘀 | D. 益气养阴 |
| E. 温补心肾 |         |

93. 根据样采取的治法, 不宜选用的中成药是

- |          |          |
|----------|----------|
| A. 麝香保心丸 | B. 通心络胶囊 |
| C. 芪参胶囊  | D. 舒心口服液 |
| E. 参芍片   |          |

94. 今日该患者准备外出旅游, 担心旅游劳累途中发病, 自行携带上述不宜服用的中成药, 并加倍服用该药, 结果出现了舌麻感。这是因为该中成药的含有有毒中药是

- |       |        |
|-------|--------|
| A. 斑蝥 | B. 草乌  |
| C. 蟾酥 | D. 生半夏 |
| E. 雄黄 |        |

(二)

某患者表现为下肢关节疼痛剧烈, 遇寒痛增, 得热痛缓, 面色苍白。依据六淫致病特点, 回答以下问题。

95. 该患者病变应属

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 风邪致病 | B. 寒邪致病 |
| C. 湿邪致病 | D. 燥邪致病 |
| E. 火邪致病 |         |

96. 该患者病变体现的致病特点是

- |       |       |
|-------|-------|
| A. 重浊 | B. 收引 |
| C. 凝滞 | D. 善行 |
| E. 动风 |       |



配套名师精讲课程

(三)

某男, 70岁。患糖尿病10年, 长期服用西药降糖药, 血糖稳定。今日听人介绍, 又自行加服了中成药消渴丸。2日后, 出现低血糖反应, 遂去医院就诊。

97. 医师分析出现低血糖反应的原因, 与过量服用降糖药有关。并告知患者, 在其所服的消渴丸中因含有降糖类化学药, 会与原用的降糖药产生叠加作用, 消渴丸中所含的化学药成分

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 二甲双胍 | B. 格列本脲 |
| C. 阿卡波糖 | D. 罗格列酮 |
| E. 瑞格列奈 |         |

98. 进入冬季, 患者加服中药膏方调补, 一段时间后, 出现血糖波动, 时有升高, 分析其原因, 是与其所服膏方中的某些中药有关, 下列中药, 能使血糖升高的药组是

- |            |           |
|------------|-----------|
| A. 鹿茸、甘草   | B. 麦冬、沙参  |
| C. 天冬、赤芍   | D. 肉苁蓉、肉桂 |
| E. 制首乌、熟地黄 |           |

(四)

某女, 49岁。经血非时而下, 出血量多, 淋漓不尽, 色淡质稀, 两目干涩, 腰膝酸软, 面色晦暗舌淡暗, 脉沉弱。

99. 根据临床表现, 该患者的中医辨证是

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 气血两虚 | B. 肝肾不足 |
| C. 脾不统血 | D. 瘀血阻络 |
| E. 阴虚火旺 |         |

100. 根据辨证结果, 应选用的治法是

- |               |               |
|---------------|---------------|
| A. 补益肝肾, 固冲止血 | B. 益气补血, 化瘀止血 |
| C. 健脾益气, 固冲止血 | D. 活血化瘀, 温经止血 |
| E. 滋肾降火, 育阴止血 |               |

101. 根据治法, 宜选用的方剂是

- |            |          |
|------------|----------|
| A. 健固汤加减   | B. 调肝汤加减 |
| C. 丹栀逍遥散加减 | D. 圣愈汤加减 |
| E. 逐瘀止崩汤加减 |          |

102. 患者服用一段时间后, 症状好转, 血量减少, 要求改服中成药, 应选用的中成药是

- |        |          |
|--------|----------|
| A. 定坤丹 | B. 乌鸡白凤丸 |
| C. 女金丹 | D. 安坤赞育丸 |
| E. 坤宁丸 |          |

(五)

某患者出现面红身热,烦躁,背部皮肤局部呈现红肿热痛。依据六淫致病特点,回答以下问题。

103.该患者病变应属

- A.风邪致病 B.寒邪致病  
C.湿邪致病 D.燥邪致病  
E.火邪致病

104.该患者病变体现的致病特点是

- A.易发疮痍 B.生风  
C.干涩 D.数变  
E.伤津

(六)

某女,45岁。患有类风湿性关节炎,长期服用解热镇痛药,近期咽喉肿痛,牙痛,邻居介绍服用新癆片。患者购药时向药师咨询,希望了解该药的更多信息。药师询问患者一般情况和用药目的后,结合病人既往治疗情况,阻止了该患者购买新癆片。

105.因为新癆片含有解热镇痛药,为防止重复用药,药师阻止了患者购药。新癆片所含的化学成分是

- A.双氯芬酸 B.对乙酰氨基酚  
C.布洛芬 D.吲哚美辛  
E.安乃近

106.药师进一步说明,若加用新癆片,造成解热镇痛药重复使用,会加大不良反应发生的可能性。关于该药发生不良反应的说法,错误的是

- A.有头痛、眩晕风中枢神经系统反应 B.发生过敏反应常见为皮疹  
C.常具有胃肠道反应 D.可引起肝肾损害  
E.可引起粒细胞增高

107.接着,药师向患者介绍,服用该药的注意事项,正确的是

- A.孕妇慎用 B.肝肾功能不全患者慎用  
C.哺乳期妇女慎用 D.精神病患者慎用  
E.溃疡病患者慎用

(七)  举一反三

某男,55岁。有糖尿病史,口渴引饮,能食与便溏并见,精神不振,四肢乏力;舌质淡,苔薄白,脉细弱。

108.根据临床表现,该患者的中医辨证是

- A.胃火炽盛 B.肾阴亏虚  
C.阴阳两盛 D.脾胃气虚  
E.肝火上扰

109.根据辨证结果,应采用的治法是

- A.清胃泻火 B.滋养肾阴  
C.健脾益气 D.清肝泻火  
E.阴阳双补

110.根据治法,应用的方剂是

- A.参苓白术丸加减 B.金匱肾气丸加减  
C.白虎汤加减 D.杞菊地黄丸加减  
E.龙胆泻肝丸加减

四、多项选择题

111.下列别名正名表述的正确的有

- A.千金子——续随子 B.天花粉——栝楼根  
C.甘草——紫甘草 D.佩兰——醒头草  
E.白芷——浙白芷

112.某男,72岁。腹泻肠鸣,脐腹作痛,泻后则安,畏寒喜暖,腰膝酸软,舌淡苔白,脉沉细,治宜选用的中成药有

- A.四神丸 B.固本益肠片  
C.香连丸 D.参苓白术散  
E.涩肠止泻散

113.医生处方在书写药名时,对药品产地提出要求的药名有

- A.东阿胶 B.江枳壳  
C.左牡蛎 D.绵茵陈  
E.鹅枳实

114.以下是正治法的是  举一反三



- A.热者寒治 B.热因热用  
C.寒者热治 D.虚则补之  
E.实则泻之

115.肝功能不全患者因肝功能衰退,药物代谢受到严重影响,在肝脏作用时间延长,故此患者应在医师指导下慎重选药,用药时执业药师可给予合理用药指导有

- A.服药初始宜用小剂量开始
- B.不能使用有毒中药
- C.服药期间定期检查肝功能
- D.选择肝毒性小的药物
- E.注意观察用药后的反应

116.治疗**阳痿肾阳不足证**,可选用的中成药有

- A.六味地黄丸
- B.附子理中丸
- C.济生肾气丸
- D.人参归脾丸
- E.桂附地黄丸

117.不宜与川乌合用的是  

- A.半夏
- B.瓜蒌
- C.川贝
- D.白藜
- E.莲子

118.中药饮片调配后,必须经过药师复核无误后可发出,**调配复核**的内容有

- A.核对处方的药味及剂数是否相符
- B.符合有无错味、漏味、多味
- C.审核药品质量有无虫蛀,霉变
- D.审核调配处方有无乱带乱用现象
- E.对于需特殊煎煮的药味是否单包并说明

119.某患者泄泻反复发作5年余,每于**黎明之前**,脐腹作痛,肠鸣即泻,泻后则安,腹部喜温,形寒肢冷,腰膝酸软,舌淡苔白,脉沉细。治宜

- A.消食导滞
- B.温肾健脾
- C.固涩止泻
- D.益气健脾
- E.化湿止泻

120.与**因人制宜**治则相关的有

- A.年龄
- B.性别
- C.体质
- D.地域
- E.职业



## 模拟试卷(三)

规定时间:120分钟

自测时间\_\_\_\_\_

试题预计完成时间\_\_\_\_\_

### 一、最佳选择题

1. 某男,25岁。每日大便3~4次,便质稀溏,稍食生冷油腻之品则腹泻症状加重,该患者应忌用的中药是

- |        |        |
|--------|--------|
| A. 利湿药 | B. 健脾药 |
| C. 固涩药 | D. 补气药 |
| E. 苦寒药 |        |

2. 气滞的临床表现可见  

- |       |       |
|-------|-------|
| A. 胀痛 | B. 重痛 |
| C. 刺痛 | D. 绞痛 |
| E. 灼痛 |       |

3. 与剂量无关的不良反应是

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 副作用  | B. 毒性作用 |
| C. 过敏反应 | D. 首剂效应 |
| E. 后遗症  |         |

4. 安排斗谱时,因外观形状相似易混淆,但功效不同,而不宜装于同一药斗中的饮片是

- |          |           |
|----------|-----------|
| A. 枳壳、枳实 | B. 山药、天花粉 |
| C. 当归、川芎 | D. 党参、生黄芪 |
| E. 砂仁、豆蔻 |           |

5. 蒙药理论为,一个独立的药味以两个元素含量为主,其他元素为辅。形成甘味的主要元素是

- |        |        |
|--------|--------|
| A. 水、气 | B. 火、气 |
| C. 土、水 | D. 火、土 |
| E. 水、火 |        |

6. 成书最早的医学著作是

- |           |            |
|-----------|------------|
| A. 《外台秘要》 | B. 《金匮要略》  |
| C. 《黄帝内经》 | D. 《神农本草经》 |

E. 《备急千金要方》

7. 妊娠忌用的中成药是

- |            |          |
|------------|----------|
| A. 十滴水     | B. 板蓝根颗粒 |
| C. 复方丹参片   | D. 血脂康胶囊 |
| E. 藿香正气软胶囊 |          |

8. 用寒远寒,用热远热,属于

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 因病制宜 | B. 因地制宜 |
| C. 因人制宜 | D. 因时制宜 |
| E. 因证制宜 |         |

9. 血小板计数正常值参考范围是

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A. $(10 \sim 50) \times 10^9/L$   | B. $(50 \sim 100) \times 10^9/L$  |
| C. $(100 \sim 300) \times 10^9/L$ | D. $(300 \sim 500) \times 10^9/L$ |
| E. $(500 \sim 700) \times 10^9/L$ |                                   |

10. 一般中药炮制品贮存环境的相对湿度应控制在

- |            |            |
|------------|------------|
| A. 30%~65% | B. 30%~75% |
| C. 35%~65% | D. 35%~75% |
| E. 40%~70% |            |

11. 属证的是

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 发热恶寒 | B. 肝胃不和 |
| C. 胸胁胀满 | D. 纳呆食少 |
| E. 头身疼痛 |         |

12. 引起血清肌酸激酶(CK)增高的疾病是


- |             |            |
|-------------|------------|
| A. 早期急性心肌梗死 | B. 甲状腺功能亢进 |
| C. 急性颅脑损伤   | D. 成人脑膜炎   |
| E. 癫痫大发作    |            |

13. 因贮存不当,可使饮片的颜色、气味、形态、内部组织等出现变异,其中易虫蛀与霉变的饮片是

- |       |       |
|-------|-------|
| A. 当归 | B. 贝母 |
| C. 山药 | D. 牛膝 |
| E. 黄芪 |       |

14. “壮水之主,以制阳光”指

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 阳病治阴 | B. 阴病治阳 |
| C. 阳中求阴 | D. 阴中求阳 |



配套名师精讲课程

E. 阴阳双补

15. 某男, 66岁。长期吸烟, 喘促气短20年, 加重10天。症见喘促气短, 动则尤甚, 呼多吸少, 气不得续, 形寒肢冷, 面唇青紫; 舌质淡, 苔薄, 脉沉弱。其中医证候是

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 风寒困脾 | B. 风热犯肺 |
| B. 肺脾气虚 | D. 肾不纳气 |
| E. 肝气郁结 |         |

16. 执业药师应对处方进行用药适宜性审核, 如发现有不合理联用的药组, 应建议纠正的是

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| A. 人参养荣丸与归脾丸 | B. 复方丹参滴丸与速效救心丸 |
| C. 四神丸与附子理中丸 | D. 脑立清胶囊与六味地黄丸  |
| E. 二陈丸与平胃散   |                 |

17. 某女, 36岁。近日突然头痛。前几日自行去药店购买都梁丸服用, 不知为何越吃越痛。今天疼痛不忍来医院就医, 与医生表述自己的病情后, 医生让其立即停药, 改用桑菊饮。请问医生辨证为

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 风寒头痛 | B. 风热头痛 |
| C. 肝阳上亢 | D. 瘀血阻络 |
| E. 痰浊上蒙 |         |

18. 某男, 56岁。患有胸痹, 近日胸闷痛如窒, 痛有定处, 外形肥胖, 肢体沉重, 纳呆, 痰多。望舌得知舌暗, 苔浊腻, 脉滑。中医的治法为

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 益气活血 | B. 行气活血 |
| C. 豁痰化瘀 | D. 益气养阴 |
| E. 温补心肾 |         |

19. 某男, 36岁。患有泄泻, 医生诊断后开以方剂四神丸给予治疗。请问该医生诊断为泄泻中的那个辨证。

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 食伤肠胃 | B. 湿热内蕴 |
| C. 脾胃气虚 | D. 脾肾阳虚 |
| E. 脾胃寒凉 |         |

20. 某女, 29岁。因全身浮肿就诊, 经系统检查诊为肾病综合征, 中医诊断为肾阳亏虚证水肿, 采用中西药综合治疗。结合病情, 既符合中医辨证、又能增加西药利尿效果的方剂是

- |          |          |
|----------|----------|
| A. 六味地黄汤 | B. 五苓散   |
| C. 真武汤   | D. 参苓白术散 |

E. 越婢加半夏汤

21. 中成药的贮存中易发生酸败的中成是

- |        |       |
|--------|-------|
| A. 蜜丸  | B. 片剂 |
| C. 注射液 | D. 合剂 |
| E. 酒剂  |       |

22. 某男, 65岁。因肾虚作喘, 服用金匱肾气丸后症状稍有缓解, 但出现口燥咽干等症, 为进步改善症状, 执业药师建议加服的中成药是

- |            |        |
|------------|--------|
| A. 蛇胆川贝液   | B. 生脉饮 |
| C. 清气化痰丸   | D. 参苏丸 |
| E. 桂龙咳喘宁胶囊 |        |

23. 阴虚肺燥的咳声特点是

- |           |         |
|-----------|---------|
| A. 咳声重浊   | B. 咳声清脆 |
| C. 咳声紧闷   | D. 干咳无痰 |
| E. 咳声如犬吠样 |         |

24. 处方一般当日有效。特殊情况下有效期可延长, 但最长不得超过

- |        |       |
|--------|-------|
| A. 2天  | B. 3天 |
| C. 5天  | D. 7天 |
| E. 10天 |       |

25. 某男, 28岁。出租车司机。感冒2日, 发热头痛, 拟服药治疗。执业药师建议, 该患者不宜选用含马来酸氯苯那敏的中成药是

- |            |          |
|------------|----------|
| A. 感冒软胶囊   | B. 抗感灵片  |
| C. 强力感冒片   | D. 速感康胶囊 |
| E. 新复方大青叶片 |          |

26. 某男, 4岁。近日不爱吃饭, 父母带其来看医生, 据父母表述, 已经有一周不爱吃饭, 大便异常稀溏腥臭, 有时夹有食物残渣。医生见患者面色萎黄, 形体消瘦, 神疲肢倦。舌质淡, 苔白腻, 脉濡细而滑。医生辨病积滞。请问该病的治法为

- |               |               |
|---------------|---------------|
| A. 乳食内积       | B. 脾虚夹积       |
| C. 消化不良, 和中导滞 | D. 健脾助运, 消食化滞 |
| E. 调和脾胃, 运脾开胃 |               |

27. 某患者因治疗需要使用柴胡注射液后出现过敏性休克, 立即停药并及时抢救后痊愈, 后该患者因使用其他药物导致原有疾病加重、出现并发症后死亡。现填写该患者用柴胡注射液的不良反应报告, 对“不良反应/事件的结果”应填写

- A.死亡  
B.痊愈  
C.有后遗症  
D.未好转  
E.不详

28.中西药联用得当,相互为用,可取长补短,使疗效增强,病程缩短,药物的毒副作用减少。如与**西药解痉药**联用,既能**提高疗效**,又能消除西药腹胀、便秘等不良反应的方剂是

- A.补中益气汤  
B.越婢加术汤  
C.芍药甘草汤  
D.补阳还五汤  
E.苓桂术甘汤

29.处方药名**枇杷叶**,调配应付的是

- A.生品  
B.酒炙品  
C.蜜炙品  
D.醋炙品  
E.姜炙品

30.根据中医体质学说**偏阴者**多见

- A.畏寒  
B.舌红  
C.畏热  
D.喜动  
E.急躁

31.某些中药可引用肝损害。其中可导致**肝肿大、黄疸**的中药是

- A.半夏  
B.苦杏仁  
C.罂粟壳  
D.苍耳子  
E.香加皮

32.**风邪**的性质

- A.升散  
B.收引  
C.开泄  
D.黏滞  
E.干涩

33.服用**藿香正气丸**宜选用的“药引”是

- A.姜汤  
B.米汤  
C.盐水  
D.黄酒  
E.芦根煎汤

34.因含有**朱砂**,加过量服用,可致急性肾功能衰竭的中成药是

- A.牛黄上清丸  
B.天王补心丸  
C.牛黄降压丸  
D.冠心苏合丸  
E.牛黄解毒丸

35.下列中成药中含有**强心苷**有毒成分的是  举一 反三

- A.木瓜丸  
B.追风丸  
C.人参再造丸  
D.九分散  
E.六应丸

36.根据三部脉分候脏腑的方法,**左尺候**的是

- A.心  
B.肺  
C.脾  
D.肝  
E.肾

37.因过量服用,可导致**心律失常**的药物是

- A.雄黄  
B.川乌  
C.蜂毒  
D.肉桂  
E.斑蝥

38.**不属于**“十八反”的组药是

- A.草乌与瓜蒌  
B.郁金与丁香  
C.乌头与半夏  
D.甘草与京大戟  
E.人参与藜芦

39.**虚证**的病机是

- A.邪正俱盛  
B.正气不足  
C.正邪相持  
D.邪正交争  
E.正盛邪祛

40.近年来,涉及中药注射剂不良反应的报道较多,执业药师应高度关注。**中药注射剂**临床使用中最常见的不良反应是

- A.生殖毒性  
B.致癌作用  
C.过敏反应  
D.消化道反应  
E.血液系统损害

## 二、配伍选择题

【41~43】

- A.泻下粪便臭如败卵,伴未消化食物,暖腐吞酸  
B.泻下急迫,泻下不爽,肛门灼热,小便短黄  
C.大便时溏时泻,稍进油腻食物,便次明显增多  
D.黎明之前,脐腹作痛,肠鸣即泻,泻后则安  
E.泄泻清稀,甚则如水样,腹痛肠鸣,脘闷食少



配套名师精讲课程

- 41.泄泻脾肾阳虚证的临床表现是  
 42.泄泻湿热内蕴证的临床表现是  
 43.泄泻食伤肠胃证的临床表现是

【44~46】  举一 反三

- A.胖嫩舌  
 B.齿痕舌  
 C.瘦薄舌  
 D.裂纹舌  
 E.芒刺舌

- 44.阴精亏损,不能荣润,常见的舌形是  
 45.脾肾阳虚,水饮内停,常见的舌形是  
 46.脏腑火盛,热邪亢盛,常见的舌形是

【47~50】

- A.宗气  
 B.中气  
 C.营气  
 D.卫气  
 E.元气

- 47.可以生成血液的气是  
 48.能调控腠理的开合及汗液排泄的  
 49.贯心脉以行气血,走息道以行呼吸  
 50.促进人体生长发育的

【51~53】  举一 反三

- A.四物颗粒  
 B.四神丸  
 C.四君子丸  
 D.龟鹿二仙膏  
 E.六味地黄丸

51.某女,31岁。头晕眼花,面色萎黄,口唇色淡,月经量少,舌质淡,脉细。医生辨证为虚劳血虚证。应选用的中成药是

52.某女,45岁。不耐寒热,头晕,乏力,神疲,自汗盗汗,舌淡少津,苔薄白,脉沉细。医生辨证为虚劳阴阳两虚证。应选用的中成药是

53.某男,57岁。神疲乏力,少气懒言,自汗舌质淡,苔薄白,脉虚。医生辨证为虚劳气虚证应选用的中成药是

【54~55】

- A.1~3 g  
 B.2~5 g  
 C.3~6 g  
 D.3~9 g  
 E.5~9 g

- 54.《中国药典》规定,北豆根的内服量应是  
 55.《中国药典》规定,山豆根的内服量应是

【56~57】

- A.从胸到手  
 B.从手到胸  
 C.从手到头  
 D.从头到手  
 E.从手到腑

- 56.根据十二经脉的走向规律,手三阴的走向是  
 57.根据十二经脉的走向规律,手三阳的走向是

【58~60】  举一 反三

- A.耗气伤津  
 B.暑多夹湿  
 C.热急生风  
 D.阻遏气机  
 E.善行数变

58.某女,58岁。患有荨麻疹,奇痒难耐,非常痛苦。上药店买药。其病因性质是

59.某女,39岁。在户外工作,近日天气连续高温,症状发热、心烦还见四肢困倦、胸闷恶心。其病因的性质是

60.某女,56岁。由于孩子离婚,近日情绪不佳。突然高热不下并伴随神昏谵语、角弓反张。其病因的性质是

【61~62】

- A.乳香  
 B.牛膝  
 C.肉桂  
 D.麻黄  
 E.青皮

61.饮片贮存过程中,易泛油的是

62.饮片贮存过程中,易变色的是

【63~64】

- A.麻黄汤  
 B.桑白皮汤  
 C.金匱肾气丸  
 D.桑菊饮  
 E.百合固金汤

63.治疗喘证风寒闭肺证,宜选用的方剂是

64.治疗喘证肾不纳气证,宜选用的方剂是

【65~67】

- A.兑服  
 B.后下  
 C.先煎  
 D.包煎



配套名师精讲课程

E.另煎

某男,60岁。半身不遂,患侧僵硬拘挛,头晕头痛,面赤耳鸣。舌红,苔薄黄,脉弦。中医辨证为肝阳上亢,治以天麻钩藤饮加减,药用天麻、钩藤、石决明、牛膝、桑寄生、栀子、黄芩、益母草、茯神、竹沥。执业药师发药时,需向患者交待正确的煎药和服用方法

65.处方中**石决明**应采用的是

66.处方中**钩藤**应采用的是

67.处方中**竹沥**应采用的是

【68~69】

A.泽泻

B.西红花

C.细辛

D.灯心草

E.花椒

68.按照对抗贮存法,宜与**蕲蛇**同贮的是

69.按照对抗贮存法,宜与**人参**同贮的是

【70~71】  举一反三

A.阳虚寒凝

B.津亏血燥

C.脾肾两虚

D.脾胃虚寒

E.气机壅滞

70.大便秘结难解,面色无华、口干,证属

71.大便秘结不解,畏寒喜暖,唇淡口和,证属

【72~73】

A.煅制品

B.蜜炙品

C.醋制品

D.盐炙品

E.烫制品

72.处方名**益智仁**,调剂时应付

73.处方名**延胡索**,调剂时应付

【74~76】

A.蜂蜜水

B.盐水

C.姜汤

D.米汤

E.黄酒

74.某女,25岁。恶寒重,发热轻,无汗头痛,肢体酸痛,鼻流清涕。舌苔薄白,脉浮紧。诊断为**风寒感冒**,医师给予**感冒清热颗粒**治疗。为增强疗效,执业药师建议可使用的药引是

75.某男,51岁。肢体关节紧痛,屈伸不利,痛有定处,遇寒痛甚,痛处常有冷感,舌苔薄白,脉弦紧。诊断为**痛痹**,医师给予**寒湿痹颗粒**治疗。为增强疗效,执业药师建议可使用的药引是

76.某女,36岁。胃痛隐隐,喜温喜按,空腹痛甚,泛吐清水,纳差,神疲乏力,大便溏薄。舌淡苔白,脉迟缓。诊断为**脾胃虚寒**,医师给予**小建中颗粒**治疗。为增强疗效,执业药师建议可使用的药引是

【77~78】

A.恶寒发热

B.但寒不热

C.但热不寒

D.寒热往来

E.长期低热

77.**里实热证**的症状是

78.**外感表证**的症状是

【79~82】

A.协同增效

B.产生或增加不良反应

C.增加药量

D.降低药物疗效

E.降低西药不良反应

79.**逍遥散**与**催眠镇静药**同用能

80.**柴胡桂枝汤**与**抗癫痫药**同用能

81.**石膏**与**四环素类抗生素**同用能

82.**朱砂**与**溴化钾**同用能

【83~84】

A.天麻丸与川贝枇杷露

B.四神丸与更衣丸

C.胆宁片与苏合香丸

D.复方丹参滴丸与速效救心丸

E.乌鸡白凤丸与平胃散

83.隐含有“**十八反**”的中成药药组是

84.隐含有“**十九畏**”的中成药药组是

【85~87】  举一反三

A.午后发热,五心烦热

B.长期低热,劳累则甚

C.午后热甚,身热不扬

D.日晡热甚,腹痛便结

E.发热烦渴,汗多脉洪

85.**气虚发热**的症状特点是

86.**湿温潮热**的症状特点是

87. 阴虚内热的症状特点是

【88~90】

- |          |          |
|----------|----------|
| A. 人参归脾丸 | B. 六味地黄丸 |
| C. 人参健脾丸 | D. 龟龄集   |
| E. 龟鹿二仙膏 |          |

老年人因脏腑生理功能衰退,常感体力不济,神疲健忘,想服用滋补药增强体质。但选药时需辨别症候,合理使用。

88. 肾阴虚者宜选用

89. 心脾两虚者宜选用

90. 肾阳虚者宜选用

### 三、综合分析选择题

(一)

某患者因受情志刺激出现意志消沉、精神萎靡、气短胸闷、乏力懒言等症。依据七情内伤致病特点,回答以下问题。

91. 该患者病变应属

- |        |        |
|--------|--------|
| A. 怒伤心 | B. 悲伤肺 |
| C. 思伤脾 | D. 恐伤肾 |
| E. 惊伤心 |        |

92. 该患者病变导致的气机紊乱的是

- |       |       |
|-------|-------|
| A. 气上 | B. 气缓 |
| C. 气消 | D. 气结 |
| E. 气下 |       |

(二)

某女,56岁。小便点滴而下,量极少而短赤灼热,小腹胀满,口苦口黏,渴不欲饮,大便不畅。舌质红,苔黄腻,脉滑数。



93. 中医诊断是

- |       |       |
|-------|-------|
| A. 痹症 | B. 虚劳 |
| C. 淋证 | D. 癃闭 |
| E. 郁证 |       |

94. 中医辨证是

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 肾阳衰惫 | B. 膀胱湿热 |
| C. 肾阴亏虚 | D. 脾胃气虚 |



配套名师精讲课程

E. 肝气郁结

95. 治疗宜选用的方剂是

- |          |          |
|----------|----------|
| A. 八正散   | B. 代抵挡丸  |
| C. 济生肾气丸 | D. 参苓白术散 |
| E. 逍遥散   |          |

96. 治疗宜选用的中成药是

- |        |        |
|--------|--------|
| A. 三金片 | B. 归脾丸 |
| C. 逍遥丸 | D. 右归丸 |
| E. 丹萎片 |        |

(三)

某患儿,七岁。发育迟缓。冬季来临,家长希望服用膏方调理,带患儿到医院就诊。初诊时见患儿面黄肌瘦,食欲不振,大便溏薄,医师认为暂先不宜服用膏方,拟用汤药调理。

97. 根据初诊情况,宜选用的中药是

- |          |          |
|----------|----------|
| A. 陈皮、半夏 | B. 党参、桂枝 |
| C. 当归、牛膝 | D. 白术、稻芽 |
| E. 白芍、砂仁 |          |

98. 经一段时间调理,患儿症状有所改善,医师根据其发育迟缓情况,综合分析辨证为肾虚,给予膏方调补,宜选用的中药是

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| A. 菟丝子、补骨脂、肉苁蓉、熟地黄 | B. 太子参、淫羊藿、牡丹皮、冬瓜皮 |
| C. 人参、鹿茸、菟丝子、补骨脂   | D. 龟甲、鳖甲、生地黄、山茱萸   |
| E. 人参、党参、丹参、玄参     |                    |

(四)

某男,85岁。动作迟缓,健忘恍惚,腰膝酸软,头晕耳鸣,齿摇发脱;舌淡红,苔白,脉沉无力。

99. 根据临床表现,该患者的主要病位是

- |      |      |
|------|------|
| A. 脑 | B. 肾 |
| C. 心 | D. 肝 |
| E. 脾 |      |

100. 根据辨证要点分析,该患者的证候是

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 肾精不足 | B. 脑髓亏虚 |
| C. 心肝两虚 | D. 心肝血虚 |
| E. 脾气不足 |         |

(五)

5岁幼儿嗜食坚果,某日该儿童出现眩晕,恶心,呕吐等症状来医院就诊。来院后病情继续恶化,出现神志改变,惊厥、查体:瞳孔散大,对光反射迟钝,询问家长得知,患儿发病前服用过某种坚果。

101.结合病情,医师推测患儿可能因误食某种**坚果中毒**,误食的坚果是

- A.桃仁  
B.榛子  
C.苦杏仁  
D.松子  
E.甜杏仁

102.若医师诊断正确,患儿病情又**进一步发展**,可能出现的严重后果是

- A.黏膜出血  
B.呼吸麻痹  
C.中毒性肝炎  
D.急性肾衰竭  
E.中毒性休克

(六)

患者,女,45岁。患有类风湿关节炎,长期服用解热镇痛药,近期咽喉肿痛,牙痛,邻居介绍服用新癢片。药师询问患者一般情况和用药目的后,结合病人既往治疗情况,阻止了该患者购买新癢片。

103.因为新癢片含有解热镇痛药,为防止重复用药,药师阻止了患者购药。**新癢片**所含有的化学成分是

- A.双氯芬酸  
B.对乙酰氨基酚  
C.布洛芬  
D.吲哚美辛  
E.安乃近

104.药师进一步说明,若加用新癢片,造成解热镇痛药重复使用,会加大不良反应发生的可能性,关于该药发生不良反应的说法,**错误**的是

- A.有头痛、眩晕等中枢神经系统反应  
B.发生过敏反应常见为皮疹  
C.常具有胃肠道反应  
D.可引起肝肾损害  
E.可引起粒细胞增高

105.接着,药师向患者介绍,服用该药的注意事项,正确的是

- A.孕妇慎用  
B.肾功能不全患者慎用  
C.哺乳期妇女慎用  
D.精神病患者慎用  
E.溃疡病患者慎用

(七)

某女,65岁。患有冠心病,伴慢性心功能不全,表现为心慌气短、动则加剧下肢浮肿、倦怠乏力等症状,医师开具益气温阳、活血通络、利水消肿中药汤剂(黄芪、人参、黑顺片、

丹参、葶苈子、水蛭、泽泻、桂枝、红花、香加皮)患者服用3剂后出现恶心、呕吐、腹泻、心率减慢、早搏等临床症状。

106.该题者服用的汤药中,与出现的**不良反应症状相关**的中药是

- A.黄芪  
B.水蛭  
C.香加皮  
D.桂枝  
E.葶苈子

107.上述与不良反应有关的中药,《中国药典》规定其**内服剂量**是

- A.9~15 g  
B.5~10 g  
C.3~9 g  
D.3~6 g  
E.1~3 g

(八)

患者原来不欲言语,语声低弱,时断时续,突然转为言语不休者;原来精神极度衰颓,意识不清,突然精神转“佳”;原来面色十分晦暗,忽然两颧发红如妆。脉象极细而软,按之欲绝,若有若无。

108.该患者属于**望神**中的变化是

- A.得神  
B.少神  
C.假神  
D.神乱  
E.失神

109.患者原来面色十分晦暗,忽然**两颧发红如妆**可见于

- A.戴阳证  
B.假热证  
C.实热证  
D.虚热证  
E.瘀血证

110.患者的**改变**提示

- A.痰气凝结,阻蔽心神  
B.阴不敛阳,即将离决  
C.气郁化火,痰火扰心  
D.肝风挟痰,蒙蔽清窍  
E.阳明热盛,扰乱神明

四、多项选择题

111.氢氯噻嗪常见的不良反应为低钾血症、低钠血症、高糖血症、高尿酸血症等,故使用时应注意氢氯噻嗪的不良反应,同时也要避免重复用药,含有**氢氯噻嗪**的中成药有

- A.珍菊降压片  
B.脂降宁片  
C.新癢片  
D.脉君安片  
E.冠通片

112.**蒙**医理论内容主要包括

- A.三根  
B.三因

C.七素 D.三稗

E.三化味

113.执业药师在**咨询服务和用药指导**过程中,需特别提示的情形有

- A.首次使用的药品
- B.多种药物合并应用
- C.使用含有毒成分的药品
- D.处方用法与说明书不一致
- E.使用需特殊条件贮存的药品

114.与磺胺类药物合用,会使其在体内溶解性降低而引起**结晶尿**,导致肾毒性增加的中药有

- A.地榆
- B.乌梅
- C.陈皮
- D.木瓜
- E.女贞子

115.使用**乌头类药物引起中毒**的原因有

- A.过量服用
- B.饱酒服用
- C.使用生品
- D.煎煮时间太短
- E.个体差异引起蓄积性中毒

116.医生处方时会**将几种疗效基础相似或协同作用的饮片缩写在一起并开,炒四仙应付**的饮片有



- A.炒山楂
- B.炒槟榔
- C.炒谷芽
- D.炒神曲

E.炒麦芽

117.肾脏是药物代谢和排泄的重要器官,肾功能不全时药物代谢和排泄均会受到影响,导致药物蓄积而加重肾脏损害,故**肾功能**不全者用药时注意事项有

- A.忌用有肾毒性的药物
- B.注意药物相互作用
- C.坚持少而精的用药原则
- D.定期检查及时调整治疗方案
- E.坚持以疾病是否治愈作为判断终点

118.治疗**阳痿惊恐伤肾证**,可选用的中成药有

- A.六味地黄丸
- B.附子理中丸
- C.蚕蛾公补片
- D.人参归脾丸
- E.补肾安神口服液

119.关于**罂粟壳**使用管理规定的规定,下列正确的有



- A.处方须有麻醉药处方权的执业医师签名
- B.须使用麻醉药专用处方方可调配
- C.成人一次正常用量为每天3~6g
- D.每张处方不得超过7日用量
- E.须与群药一起调配

120.导致发生中药不良反应的药物因素和使用因素有

- A.用错品种
- B.炮制不当
- C.剂量过大
- D.配伍失度
- E.辨证错误



## 模拟试卷(四)

规定时间:120 分钟

自测时间\_\_\_\_\_

试题预计完成时间\_\_\_\_\_

### 一、最佳选择题

1. 中医理论认为“证”、“症”、“病”含义不同,下列表述中,属于“证”的是



- |         |         |
|---------|---------|
| A. 腰膝酸软 | B. 胆怯多疑 |
| C. 胃胀腹痛 | D. 阳虚寒凝 |
| E. 绞痛难忍 |         |

2. 妊娠慎用的中药是

- |       |       |
|-------|-------|
| A. 桂枝 | B. 麻黄 |
| C. 防风 | D. 连翘 |
| E. 黄芩 |       |

3. 阴虚的常见症状是

- |           |         |
|-----------|---------|
| A. 脉沉     | B. 神疲   |
| C. 乏力、眩晕  | D. 五心烦热 |
| E. 舌红,苔黄腻 |         |

4. 某男,42岁。先由于肾虚引起乏力,后又引起肝脏病变。该疾病的转变是

- |       |         |
|-------|---------|
| A. 相生 | B. 子病及母 |
| C. 相乘 | D. 母病及子 |
| E. 相侮 |         |

5. 表邪未解者忌用的中药是

- |          |          |
|----------|----------|
| A. 固表止汗药 | B. 活血化瘀药 |
| C. 苦寒清热药 | D. 淡渗利湿药 |
| E. 涩肠止泻药 |          |

6. 藏医学认为既能使身体坚实,又有疏通作用的药味是

- |       |       |
|-------|-------|
| A. 涩味 | B. 辛味 |
| C. 苦味 | D. 甘味 |
| E. 咸味 |       |

7. 下列治则中,属正治法的是

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 以热治热 | B. 以寒治寒 |
| C. 塞因塞用 | D. 寒者热之 |
| E. 通因通用 |         |

8. 调配饮片时,每剂中药的重量误差应控制在

- |           |          |
|-----------|----------|
| A. ±1%以内  | B. ±2%以内 |
| C. ±3%以内  | D. ±5%以内 |
| E. ±10%以内 |          |

9. 患者近日,畏寒喜暖、血行不畅,体温下降其症状与气机功能失常密切

相关的是

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 温煦作用 | B. 推动作用 |
| C. 防御作用 | D. 固摄作用 |
| E. 气化作用 |         |

10. 面赤多见于

- |       |       |
|-------|-------|
| A. 寒证 | B. 痛证 |
| C. 虚证 | D. 热证 |
| E. 饮证 |       |

11. 妊娠慎用的中成药是

- |          |          |
|----------|----------|
| A. 六味地黄丸 | B. 牛黄上清丸 |
| C. 香砂养胃丸 | D. 天王补心丸 |
| E. 九味羌活丸 |          |

12. 患者腹部坠胀,伴少气倦怠,动则尤甚,脉弱,应辨证为

- |        |        |
|--------|--------|
| A. 气虚证 | B. 气陷证 |
| C. 气滞证 | D. 气逆证 |
| E. 气脱证 |        |

13. 患者肢体关节疼痛较重,部位固定,遇寒加剧,所属病症为

- |       |       |
|-------|-------|
| A. 行痹 | B. 热痹 |
| C. 着痹 | D. 尪痹 |
| E. 痛痹 |       |

14. 某女,55岁。大便艰涩,排出困难,腹冷腹痛,小便清长,畏寒喜暖,面色无华,舌质淡,苔薄白,脉沉迟,应选用的方剂是

- |          |           |
|----------|-----------|
| A. 六陪汤加减 | B. 麻子仁丸加减 |
| C. 润肠丸加减 | D. 半硫丸加减  |



配套名师精讲课程

E 大承气汤加减

15.成人血清天门冬氨酸转移酶速率正常值范围是

- A.<20 U/L  
B.<30 U/L  
C.<40 U/L  
D.<50 U/L  
E.<60 U/L

16.某男,32岁。近3天所在单位多人发热,患者1天前突然发热,高热不退,周身酸痛,无汗,干咽喉疼痛,舌质红,苔黄,脉浮数,应选用的中医治法是

- A.辛凉解表  
B.辛温解表  
C.益气解表  
D.解表除湿  
E.清热解毒

17.某女,40岁。神疲乏力,少气懒言,声音低微,舌质淡,或有齿痕,苔薄白,脉虚无力。医生诊断后开具处方:人参、白术、茯苓、甘草。以益气健脾、和胃治疗。该患者最为适宜的服药时间是

- A.饭前  
B.饭后  
C.睡前  
D.空腹  
E.频服

18.合理用药基本原则中首要考虑的是

- A.有效  
B.安全  
C.经济  
D.使用方便  
E.便于贮存

19.某女,42岁。月经不调来医院就诊,症状月经提前,量少,色淡还伴随腰膝酸软,头晕耳鸣,舌淡暗,苔薄白,脉沉细而弱。应选用什么方剂治疗

- A.固阴煎  
B.逍遥散  
C.四物汤  
D.归脾丸  
E.丹栀逍遥散

20.某男,56岁。遍体浮肿,腹胀,二便不利,服用峻下逐水的舟车丸,为防伤正气,可联用的中成药是

- A.二陈丸  
B.麻仁丸  
C.四君子丸  
D.附子理中丸  
E.六味地黄丸

21.若患者症见头晕目涩,胁肋隐痛,面部烘热,潮热盗汗,舌红少苔,脉弦细数,应诊断为

- A.肝火炽盛  
B.肝阴虚

C.肝胆湿热

D.肝阳上亢

E.肝风内动

22.下列配伍应用的药组中,属于不合理联用的是

- A.附子理中丸与四神丸  
B.归脾丸与人参养荣丸  
C.朱砂安神丸与天王补心丸  
D.六味地黄丸与补中益气丸  
E.二陈丸与平胃散

23.处方书写僵蚕应付

- A.盐炙品  
B.醋炙品  
C.麸炒  
D.清炒  
E.酒炒

24.可参考癃闭辩证论治的西医疾病是

- A.前列腺炎  
B.尿结石  
C.尿潴留  
D.尿路感染  
E.尿道综合征

25.可抑制胃蠕动及排空,延长某些药物在胃内滞留时间的中药是

- A.玫瑰花  
B.旋覆花  
C.金银花  
D.合欢花  
E.洋金花

26.服用六味地黄丸宜用药引

- A.黄酒  
B.姜汤  
C.淡盐水  
D.芦根汤  
E.清茶

27.因含有马来酸氯苯那敏,司机和登高作业者感冒时不宜服用的中成药是

- A.强力感冒片  
B.金羚感冒片  
C.抗感灵片  
D.新复方大青叶片  
E.舒肺糖浆

28.能疏肝解郁、利胆退黄、消炎解毒的藏药方剂是

- A.二十五味珊瑚丸  
B.二十五味松石丸  
C.二十五味鬼臼丸  
D.二十九味能消散  
E.三十五味沉香丸

29.不能装于同一药斗或上下药斗的药组是

- A.附子与天花粉  
B.升麻与葛根

C.小茴香与橘核 D.川乌与草乌

E.射干与北豆根

30.因含有**雄黄**,过量服用可致**肝肾功能**损害的中成药是

A.小金丸 B.牛黄降压丸

C.牛黄解毒片 D.冠心苏合丸

E.桂枝茯苓丸

31.具有**肝脏**毒性的中药是

A.使君子 B.黄药子

C.女贞子 D.车前子

E.牛蒡子

32.极易**发霉**的饮片是

A.秦艽 B.莪术

C.桔梗 D.柴胡

E.独活

33.某女,45岁。头痛10年,久治不愈。**痛如针刺,固定不移**,舌紫,脉细涩。宜选用的

中成药是  

A.天麻钩藤颗粒 B.通窍活血汤

C.都梁丸 D.通天口服液

E.脑立清

34.医生在中药处方中应用不同的术语,对饮片炮制、产地、质地、采时、新陈、颜色、气味等有特殊要求加以注明。下列与药名有关的术语中,属于对**采时、新陈有特殊要求**的是

A.田三七 B.江枳壳

C.霜桑叶 D.明天麻

E.紫丹参

35.某女,49岁。精神抑郁,**情绪不宁**,胸胁胀痛,**胸闷暖气善太息**。舌苔薄腻,脉弦。

医生诊断为郁证,其治法为

A.疏肝解郁 B.化痰利气

C.健脾养心 D.益气补虚

E.补益心脾

36.患儿,5岁。形体偏瘦,不思饮食,食而不化**面色萎黄**,神倦多汗,大便偏稀**夹有不消化食物**,舌质淡,苔薄白,脉弱。应选用的方剂是

A.异功散加减 B.养胃增液汤加减



配套名师精讲课程

C.不换金正气散加减

D.保和丸加减

E.枳术丸加减

37.因服用过量而发生药物不良反应,可致**呼吸麻痹而死亡**的中药是

A.细辛 B.使君子

C.胆矾 D.雷公藤

E.香加皮

38.中西药联用**协同增效**

A.健胃消食片与红霉素 B.丹参注射液与能量合剂

C.磁朱丸与诺氟沙星 D.参茸片与格列本酮

E.半夏止咳糖浆与地高辛

39.中国古代,内容**涉及临床各科**,为医学史的研究提供不少珍贵资料的典籍是



举一反三

A.千金翼方

B.普济方

C.外台秘要

D.太平圣惠方

E.太平惠民和剂局方

40.某女,36岁。咽部干痒灼热,微痛,**有异物感**,咳嗽少痰,**颧红潮热**;舌质红,苔少,脉细数。应选用的中成药是

A.清咽利膈丸 B.玄麦甘桔颗粒

C.板蓝根颗粒 D.复方鱼腥草片

E.利咽解毒颗粒

## 二、配伍选择题

【41~42】

A.瓜蒌 B.白芍

C.丹参 D.甘草

E.乌头

根据中药“十八反”

41.与**海藻**相反的中药是

42.与**半夏**相反的中药是

【43~45】

A.薄荷 B.阿胶

C.蒲黄 D.鹿角霜

E.人参

43.先煎的中药是

44.后下的中药是

45.包煎的中药是

【46~48】

A.出项各种出血症状,严重脱水,低蛋白血症

B.呼吸麻痹,昏迷、惊厥,瞳孔散大,对光反射消失

C.急性肾功能衰竭,粒细胞减少,再生障碍性贫血

D.呼吸浅表不规则,面色苍白、发绀。瞳孔极度缩小呈针尖样

E.四肢麻木,谵妄,痉挛,脑水肿,意识障碍,精神错乱

46.罂粟壳中毒,严重者主要表现为

47.雷公藤中毒,严重者主要表现为

48.苦杏仁中毒,严重者主要表现为

【49~51】

A.保和丸加减

B.四神丸加减

C.参苓白术散加减

D.加味左金丸加减

E.舒肝丸加减

49.伤食泄泻宜选用的方药是

50.肾阳虚衰宜选用的方药是

51.脾胃虚弱泄泻宜选用的方药是

【52~53】  

A.形寒肢冷、精神不振、腰膝酸软、阳痿不举

B.头晕目眩、耳鸣耳聋、失眠遗精、五心烦热

C.成人早衰、脱发齿摇、健忘恍惚、动作迟缓

D.滑精早泄、腰膝酸软、面色淡白、听力减退

E.气虚喘促、呼多吸少、动则喘甚至、面部虚浮

52.肾精不足证,常见的临床表现是

53.肾阴虚证,常见的临床表现是

【54~57】  

A.咳嗽声重,痰稀色白,无汗或兼头痛

B.咳嗽气粗,咯痰黏稠,色白或黄,声音嘶哑

C.干咳无痰,或痰少而黏,不易咳出,或痰中带血

D.咳嗽气粗,痰多黄稠,烦热口干

E.干咳少痰,或痰中带血,午后咳甚,五心烦热

54.咳嗽燥邪伤肺证的临床症状

55.咳嗽风寒犯肺证的临床症状

56.咳嗽痰热壅肺证的临床症状

57.咳嗽肺肾阴虚证的临床症状

【58~59】  

A.紫苏子

B.吴茱萸

C.马兜铃

D.延胡索

E.何首乌

58.处方直接写名,需要配蜜炙品的是

59.处方直接写名,需要配醋炙品的是

【60~61】

A.黄芪建中汤加减

B.保和丸加减

C.柴胡疏肝丸加减

D.丹栀逍遥散加减

E.良附丸加减

60.患者症见胃痛隐隐,喜温喜按,大便溏薄最适合用的方剂是

61.患者症见胃脘灼热,烦躁易怒,口干口苦最适合用的方剂是

【62~63】  

A.开窍药

B.苦寒药

C.收敛药

E.涩肠药

E.淡渗利湿药

62.脱证神昏者,忌用

63.阴虚津亏者,忌用

【64~65】

A.海藻

B.巴豆

C.芒硝

D.乳香

E.山药

64.易虫蛀的饮片是

65.易风化的饮片是

【66~68】

A.吴茱萸、蛇床子

B.车前子、地肤子

C.山豆根、制川乌

D.马钱子、天仙子

E. 枇杷叶、侧柏叶  
根据《中国药典》对有毒中药的分类

66. “小毒”中药是  
67. “有毒”中药是  
68. “大毒”中药是

【69~72】   举一 反三

- A. 气虚血瘀  
B. 气滞血瘀  
C. 痰瘀闭阻  
D. 气阴两虚  
E. 心肾阳虚

患者诊断为胸痹症见

69. 心悸而痛,甚则胸痛彻背,畏寒肢冷,腰酸肢肿辨证为  
70. 胸闷隐痛,时作时止,心悸气短,倦怠懒言辨证为  
71. 胸痛隐隐,遇劳则发,神疲乏力,气短懒言辨证为  
72. 胸痛胸闷,胸胁胀满,心悸辨证为

【73~75】

- A. 风痛药酒与二甲双胍  
B. 牛黄解毒片与利福平  
C. 银杏叶与地高辛  
D. 补中益气丸与环磷酰胺  
E. 大山楂与阿司匹林

73. 两者合用影响吸收的是  
74. 两者合用影响分布的是  
75. 两者合用影响排泄的是

【76~77】

- A. 涂膜剂  
B. 气雾剂  
C. 贴膏剂  
D. 凝胶剂  
E. 流浸膏剂

中成药因剂型不同,采用的贮存养护方法也不同

76. 除另有规定外,应置遮光容器内密封和阴凉处贮存的中成药剂型是  
77. 除另有规定外,应避光,密闭存,并应防冻的中成药剂型是

【78~79】

- A. 不思饮食  
B. 消谷善饥  
C. 恶闻食臭  
D. 饥不择食  
E. 食欲减退



78. 胃热火证的表现是

79. 胃阴虚证的辩证要点是

【80~81】

- A. 1~3 g  
B. 3~6 g  
C. 3~9 g  
D. 5~9 g  
E. 6~9 g

80. 水蛭的内服用量是

81. 全蝎的内服用量是

【82~83】

- A. 心  
B. 肺  
C. 脾  
D. 肝  
E. 肾

82. 主宰精神活动的脏是

83. 主司调畅情志的脏是

【84~85】   举一 反三

- A. 人参归脾丸  
B. 六味地黄丸  
C. 红参  
D. 西洋参  
E. 生脉饮

84. 老年人因脏腑生理功能衰退,常感到体力不济,神疲健忘,想服用滋补药增强体质,但选药时需辨别证候,合理使用。肺阴虚者不宜选用

85. 老年人因脏腑生理功能衰退,常感到体力不济,神疲健忘,想服用滋补药增强体质,但选药时需辨别证候,合理使用。阴虚者宜选用

【86~87】

- A. 升散  
B. 凝滞  
C. 重浊  
D. 开泄  
E. 收引

86. 暑邪的性质是

87. 湿邪的特点是

【88~90】   举一 反三

- A. 黄疸以及中毒性肝病,呼吸、循环系统衰竭  
B. 口腔、喉头烧伤,呕吐腹泻,虚脱,甚至死亡  
C. 粪便多呈蓝绿色,口中金属色涩味,黄疸、中毒性肝炎

- D.血小板、白细胞、血红蛋白减少,并可发生急性粒细胞减少
- E.心律失常,如心率减慢、早搏、房室传导阻滞

- 88.白矾的主要不良反应是
- 89.蓖麻子的主要不良反应是
- 90.胆矾的主要不良反应是

三、综合分析选择题

(一)

患者,男,48岁。胃脘胀痛2周,连及胁肋,暖气后疼痛减轻,生气时胃痛加重,食欲不振,或见嘈杂吞酸,舌红,苔薄白,脉弦。根据病例回答以下问题。

- 91.该患者应**诊断**为
- A.胃痛
- B.胁痛
- C.呕吐
- D.腹痛
- E.郁证

- 92.该患者应**辨证**为
- A.寒凝气滞
- B.饮食停滞
- C.肝胃不和
- D.肝胃郁热
- E.脾胃虚寒

- 93.针对此证,应采用的**治法**是
- A.温中散寒,和胃止痛
- B.导滞和胃
- C.疏肝理气,和胃止痛
- D.疏肝泄热,和胃止痛
- E.温中健脾,和胃止痛

- 94.治疗**方剂**应该选用
- A.良附丸
- B.保和丸
- C.黄芪建中汤
- D.丹栀逍遥散合左金丸
- E.柴胡疏肝散

(二)  

患者,女,28岁。腹痛肠鸣2天,泻下粪便臭如败卵,泻后痛减,泻下伴有不消化食物,脘腹胀满,嗝腐吞酸,不思饮食,舌苔垢浊或厚腻,脉滑。根据病例回答以下问题。

- 95.该患者应**诊断**为
- A.腹痛
- B.泄泻
- C.痢疾
- D.发热
- E.胃痛



- 96.该患者应**辨**为何证
- A.食伤肠胃
- B.湿热内蕴
- C.脾胃气虚
- D.脾肾阳虚
- E.肝郁脾虚

- 97.针对此证,应采用的**治法**是
- A.健脾益气,化湿止泻
- B.消食导滞
- C.温肾健脾,固涩止泻
- D.清热利湿
- E.疏肝健脾止泻

- 98.治疗**方剂**应选用
- A.保和丸
- B.葛根芩连汤
- C.参苓白术散
- D.四神丸
- E.归脾丸

(三)

患者,女,52岁。双侧乳房出现肿块,月经前增大,乳房胀痛,乳房肿块随喜怒消长,伴有胸闷胁胀、善郁易怒、失眠多梦、心烦口苦,舌苔薄黄、脉弦滑。根据病例回答以下问题。

- 99.该患者应**辨**为
- A.心血不足证
- B.饮食停滞证
- C.肝郁痰凝证
- D.肝胃郁热证
- E.冲任失调证

- 100.针对此证,应采用的**治法**是
- A.调摄冲任
- B.疏肝理气,化痰消坚
- C.疏肝理气,和胃止痛
- D.清热健脾利湿
- E.疏散风热

- 101.治疗**方剂**应该选用
- A.茵陈蒿汤
- B.保和丸
- C.柴胡舒肝散
- D.二仙汤合四物汤
- E.逍遥萎贝散加减

(四)

患者,女,30岁。经前小腹胀痛拒按,经血量少,经行不畅,经色紫暗有块,块下痛减,胸胁、乳房作胀。舌紫暗或有瘀点,脉弦涩。根据病例回答以下问题。

- 102.该患者应**诊断**为
- A.腹痛
- B.胁痛
- C.腰痛
- D.痛经

E.乳癖

103.该患者应辨证为

A.气滞血瘀

B.阴寒内盛

C.阳虚内寒

D.肾阳不足

E.脾胃虚寒

104.针对此证,应采用的治法是

A.温中散寒,和胃止痛

B.清热解毒,活血止痛

C.理气活血,化瘀止痛

D.健脾益气,和胃止痛

E.助阳暖宫,温经止痛

105.治疗方剂应该选用

A.四物汤

B.桃红饮

C.血府逐瘀汤加减

D.身痛逐瘀汤加减

E.膈下逐瘀汤加减

(五)

患者,女,30岁。怀孕6周。因身体不适去医院看病。医生根据病情,结合妊娠用药禁忌开具处方。

106.以下哪个药物为妊娠禁用中药,处方中不能出现

A.枸杞

B.半夏

C.三棱

D.人参

E.当归

107.以下哪个药物为妊娠慎用中药,处方中应尽量避免

A.川牛膝

B.薄荷

C.茯苓

D.鳖甲

E.党参

(六)

患者,男,55岁。2天前受寒后随即恶寒、发热、头身痛、咽痛、鼻塞,自行服用重感冒灵片和扑热息痛后,出现大汗淋漓,虚脱。遂去医院就诊。

108.医师分析出现大汗淋漓的原因,与其服用药物有关。因其所服的重感冒灵片中含有西药成分,与扑热息痛产生叠加作用,导致大量出汗,甚至虚脱。重感冒灵片中所含的西药成分是

A.安乃近

B.咖啡因

C.阿司匹林

D.盐酸麻黄碱

E.对乙酰氨基酚

109.对该西药成分的使用注意描述正确的是

A.可长期使用

B.哮喘患者禁用

C.对阿司匹林林过敏者可用

D.不可加大剂量或长期使用

E.肝肾功能不全者禁用

110.长期使用该类成分的药可引发的疾病是

A.胃溃疡

B.低血压

C.胃肠道疾病

D.过敏性疾病

E.血小板减少性紫癜、再生障碍性贫血

#### 四、多项选择题

111.症见不易入睡,多梦易醒,心悸健忘,神疲食少,四肢倦怠,腹胀便溏,面色少华,舌淡苔薄,脉细无力。可选用的治法、方药有

A.朱砂安神丸

B.养血安神丸

C.健脾养心

D.归脾汤

E.滋阴养血

112.影响中药质量变异的因素有

A.空气

B.日光

C.霉菌

D.包装容器

E.贮存时间

113.不合理用药的后果

A.浪费医药资源

B.引发药源性疾病

C.延误疾病治疗

D.引发药物不良反应

E.造成医疗纠纷

114.易引起肝损伤的中药有

A.艾叶

B.莱菔子

C.川楝子

D.黄药子

E.牛蒡子

115.下列书籍中,不属于国家药品标准的有

A.《中华本草》

B.《中药大辞典》

C.《中华人民共和国药典》

D.《中华人民共和国卫生部标准》

E.《中华人民共和国药典临床用药须知》

116.与氨茶碱合用会发生酸碱中和反应而降低或失去药效的中药

A.乌梅

B.木瓜

C.山楂  
E.女贞子

117.疫疠邪气的致病特点有

A.发病急骤  
C.症状相似  
E.易于流行

118.亡阳证的临床表现有

A.汗热而黏  
C.脉微欲绝

D.麻黄

B.病情较重  
D.传染性强

B.冷汗淋漓  
D.呼吸气微

E.四肢厥冷

119.属于气机失常的病机变化有



A.气滞  
C.气陷  
E.气虚

B.气逆  
D.气脱

120.滑脉所主的病症有

A.痰饮  
C.食滞  
E.痞块

B.瘀血  
D.实热

金英杰医学