

2021 中医助理医师考试



扫码关注获取更多免费  
资料及医考资讯

**2021 年**

**中医助理医师资格考试  
专用**

## 第一单元

### A1 型选择题 (1~80 题)

(答题说明: 每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案。)

1. 下列表述中不属于症的是

- A. 胸闷
- B. 恶寒
- C. 口苦
- D. 发热
- E. 消渴

2. 人体是一个有机整体, 其中心是

- A. 心
- B. 脑
- C. 经络
- D. 脏腑
- E. 五脏

3. 两汉时期“元气一元论”认为, 构成宇宙万物最基本、最原始的物质是

- A. 元气
- B. 精气
- C. 谷气
- D. 云气
- E. 精

4. 关于阴和阳的概念描述中, 最确切的是

- A. 阴和阳是中国古代的两点论
- B. 阴和阳即是矛盾
- C. 阴和阳代表对立的事物
- D. 阴和阳代表对立又相互关联的事物 属性
- E. 阴和阳说明相互关联着的事件

5. “阴在内, 阳之守也; 阳在外, 阴之使也”, 主要说明阴阳之间存在何种关系

- A. 对立制约
- B. 互根互用

C. 互为消长

D. 平衡协调

E. 互相转化

6. 下列哪种治法体现了五行相克规律

- A. 金水相生
- B. 益火补土
- C. 抑木扶土
- D. 滋水涵木
- E. 培土生金

7. 属于“相侮”的脏病传变是

- A. 肝病及脾
- B. 肝病及肾
- C. 肝病及肺
- D. 肝病及心
- E. 脾病及心

8. 具有“主肃降”生理特性的脏是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

9. “浊气归心, 淫精于脉”中的“浊气”主要靠哪一个脏腑的运化

- A. 心
- B. 肺
- C. 脾
- D. 肾
- E. 大肠

10. 促进机体滋润、宁静、成形和制约阳热功能的物质是

- A. 肾精
- B. 肾气
- C. 肾阴

D. 肾阳

E. 肾血

11. 与维持正常呼吸关系最密切的两脏是

- A.心与脾  
B.脾与肾  
C.肾与肝  
D.肝与肺  
E.肺与肾
12. “中精之腑”指  
A.胆  
B.胃  
C.大肠  
D.小肠  
E.三焦
- 13.具有“喜润恶燥”生理特性的是  
A.胆  
B.胃  
C.小肠  
D.大肠  
E.膀胱
- 14.何脏在病理状态下会出现“清气在下，则生殖泄”  
A.AT  
D.心  
n Hit  
E.肾
- 15.脑主司感觉运动，有赖于  
A.脑髓充养  
B.营血充养  
C.肾精充养  
D.肝血充养  
E.脾精充养
- 16.中医诊断的基本原则是  
A.整体审察，四诊合参，病证结合  
B.辨证求因，审因论治，脉症合参  
C.证候真假，证候错杂，诊法合参  
D.证候转化，病证结合，辨证求因  
E.司外揣内，见微知著，以常衡变
- 17.热极的患者其唇的色泽可表现为  
A.唇色深红  
B.唇色青紫  
C.口唇青黑  
D.口唇赤肿而干  
E.口唇呈樱桃红色者
- 18.斑与疹的主要区别是  
A.是否色红成片  
B.是否时现时隐  
C.是否抚之碍手  
D.是否压之褪色  
E.是否伴有身热
- 19.下列哪项不是得神的表现  
A.目光精彩  
B.神志清楚  
C.额赤如妆  
D.面色荣润  
E.呼吸调匀
- 20.鼻流浊涕者，多属  
A.外感风热  
B.胆经湿热  
C.阳气虚弱  
D.外感风寒  
E.阴虚肺燥
- 21.眼窝凹陷多属  
A.肺胀  
B.吐泻伤津  
C.肝胆火炽  
D.脾胃虚衰  
E.肾阴不足
- 22.舌苔薄白而干者多见于  
A.湿浊中阻  
B.食积内停  
C.脾肾阳虚  
D.外感风热  
E.燥热伤津
- 23.外感秽浊与热毒之邪相合的舌象是  
A.白腻苔  
B.黄腻苔  
C.积粉苔  
D.灰黑苔  
E.腐苔
- 24.舌中部点刺者多为

- A. 肝胆火盛  
B. 心火亢盛  
C. 肺热壅盛  
D. 胃肠热盛  
E. 大肠湿热
25. 舌苔脱落处舌面不光滑，仍有新生苔质颗粒者称  
A. 花剥苔  
B. 地图舌  
C. 镜面舌  
D. 光滑舌  
E. 类剥苔
26. 导致出现咳声如犬吠，声音嘶哑，吸气困难的病因是  
A. 风邪与痰热搏结  
B. 久病肺气虚损  
C. 燥邪犯肺  
D. 寒痰湿浊停肺  
E. 阴虚疫毒攻喉
27. 病室中有尸臭气多为  
A. 患者失血  
B. 瘟疫发作  
C. 脏腑衰败  
D. 肾衰  
E. 消渴病重
28. 下列除哪项外均为苦味药的作用  
A. 清热泻火  
B. 泄降气逆  
C. 收敛固涩  
D. 通泄大便  
E. 燥湿坚阴
29. 善于鼓舞脾胃清阳之气又可治疗湿热泻痢、脾虚泄泻的药物是  
A. 芦根  
B. 天花粉  
C. 葛根  
D. 薄荷  
E. 桑叶
- A. 清热解毒，凉血止痢  
B. 清热解毒，止痢截疟  
C. 清热解毒，息风止痉，清肝明目  
D. 清热解毒，消痈排脓，利尿通淋  
E. 清热解毒，消痈排脓，祛瘀止痛
31. 既能清热解毒，又能疏散风热的药对是  
A. 桑叶、菊花  
B. 薄荷、牛蒡子  
C. 牛黄、水牛角  
D. 金银花、连翘  
E. 蒲公英、紫花地丁
32. 防己的功效是  
A. 祛风湿，舒经络，解表  
B. 祛风湿，消骨鲛，解暑  
C. 祛风湿，止痛，化湿和胃  
D. 祛风湿，止痛，安胎  
E. 祛风湿，止痛，利水消肿
33. 可用于养血安胎的药物是  
A. 狗脊  
B. 砂仁  
C. 乌梢蛇  
D. 五加皮  
E. 桑寄生
34. 既能化湿，又能解暑的药物是  
A. 藿香、佩兰  
B. 苍术、厚朴  
C. 砂仁、豆蔻  
D. 陈皮、青皮  
E. 茯苓、玉竹
35. 虎杖的功效是  
A. 活血调经，清热利湿，解毒消疮，化痰平喘  
B. 利湿退黄，清热解毒，散瘀止痛，化痰止咳  
C. 活血定痛，清热利湿，解毒通便，化痰止咳  
D. 活血通络，祛湿退黄，清热解毒，利尿通便

30.鱼腥草的功效是

E.活血消癥，利湿退肿，解毒疗疮，化痰

通便

36. 既能温中止痛，又能杀虫，可用于蛔虫腹痛、呕吐或吐蛔的药物是
- 干姜
  - 吴茱萸
  - 砂仁
  - 小茴香
  - 花椒
37. 既能消食健胃，又能涩精止遗，还可治疗小儿脾虚疳积的药物是
- 银柴胡
  - 麦芽
  - 乌梅
  - 莱菔子
  - 鸡内金
38. 既能凉血止血，又能清热利尿，清肺胃热的药物是
- 大蓟
  - 小蓟
  - 白茅根
  - 地榆
  - 槐花
39. 既能收敛止血，止痢，又能截疟，补虚的药物是
- 苦楝皮
  - 沙苑子
  - 侧柏叶
  - 仙鹤草
  - 三七
40. 桑白皮与草苗子既能泻肺平喘，又能
- 利水渗湿
  - 利水通淋
  - 利水消肿
  - 利水止泻
  - 利水退黄
41. 具有镇静安神，平肝潜阳，收敛固涩功效的药物是
- 龙骨
  - 牡蛎
  - 珍珠母
  - 磁石
  - 石决明
42. 下列关于巴豆的用法及用量叙述正确的是
- 入丸散，每次 0.1~0.3g
  - 入丸散，每次 0.2~0.5g
  - 入汤剂，每次 0.3~0.5g
  - 入汤剂，每次 0.1~0.5g
  - 入汤剂，每次 0.5~1.5g
43. 败毒散中配伍人参的主要用意是
- 大补肺脾，以复正气
  - 补脾益肺，培土生金
  - 扶助正气，鼓邪外出
  - 益气生津，以资汗源
  - 益气和中，温阳止痹
44. 九味羌活汤的功用是
- 散寒解表，祛风除湿
  - 发汗解表，疏风止痛
  - 发汗祛湿，兼清里热
  - 宣肺散寒，除湿止痛
  - 散寒除湿，通痹止痛
45. 麻子仁丸的组成药物中不含
- 大黄
  - 枳实
  - 当归
  - 杏仁
  - 芍药
46. 半夏泻心汤与小柴胡汤两方组成中均含有的药物是
- 人参、生姜、半夏、甘草、大枣
  - 半夏、黄连、黄芩、甘草、大枣
  - 人参、黄芩、半夏、干姜、甘草
  - 柴胡、人参、黄芩、生姜、甘草
  - 半夏、黄芩、人参、炙甘草、大枣
47. 香薷散的功用是
- 祛湿化浊，理气宽中
  - 散寒解表，化湿和中
  - 解表散寒，理气和中
  - 祛暑解表，化湿和中

- E. 祛暑解表, 清热化湿
48. 四逆汤与当归四逆汤二方组成中均含有的药物是
- A. 当归
  - B. 附子
  - C. 桂枝
  - D. 干姜
  - E. 甘草
49. 炙甘草汤的组成药物中含有
- A. 麦冬、麻仁、枣仁
  - B. 生地、元参、麦冬
  - C. 阿胶、当归、芍药
  - D. 生姜、大枣、黄芷
  - E. 生地、阿胶、麦冬
50. 温经汤的组成药物中不包括
- A. 干姜、肉桂
  - B. 丹皮、麦冬
  - C. 半夏、甘草
  - D. 当归、芍药
  - E. 人参、阿胶
51. 川尊茶调散的组成药物中含有
- A. 牛蒡
  - B. 羌活
  - C. 苍术
  - D. 当归
  - E. 蝉蜕
52. 以清宣肺, 润肺止咳为参功用的方剂是
- A. 杏苏散
  - B. 增液汤
  - C. 桑杏汤
  - D. 养阴清肺汤
  - E. 清燥救肺汤
53. 抽搐病因中, 属于感染性颅脑疾病的是
- A. 癫痫
  - B. 脑外伤
  - C. 脑肿瘤
  - D. 脑寄生虫病
  - E. 脑血管性疾病
54. 急性心梗患者常有发热, 其主要机制是
- A. 变态反应
  - B. 代谢障碍
  - C. 体温调节中枢失常
  - D. 神经功能障碍
  - E. 吸收热
55. 在非感染性发热中, 属抗原-抗体反应性疾病的是
- A. 血清病
  - B. 中暑
  - C. 重度安眠药中毒
  - D. 大面积烧伤
  - E. 急性心肌梗死
56. 发热 10 天, 每天体温最高达 39.62 ~ 40.10 最低 37.6 度, 试问该热型属于
- A. 波状热
  - B. 稽留热
  - C. 弛张热
  - D. 不规则热
  - E. 间歇热
57. 脑出血引起发热的主要原因是
- A. 皮肤散热量的减少
  - B. 感染性发热
  - C. 植物神经功能紊乱
  - D. 体温调节中枢的功能失常
  - E. 无菌性坏死物质的吸收
58. 反复发作的呼气性呼吸困难, 主要见于
- A. 气道异物
  - B. 支气管哮喘
  - C. 大叶性肺炎



- D. 肺不张
  - E. 气胸
59. 肺气肿时，呼吸困难的主要特点是
- A. 呼气费力
  - B. 吸气和呼气均感费力
  - C. 呼吸浅快
  - D. 吸气费力
  - E. 呼吸深慢
60. 引起痰分层现象的疾病是

- A.肺炎链球菌肺炎  
B.心源性哮喘  
C.慢性支气管炎  
D.肺脓肿  
E.肺结核
- 61.下列可以表现为局部性水肿的是  
A.创伤  
B.丝虫病  
C.局部炎症  
D.血栓性静脉炎  
E.以上都是
- 62.幽门梗阻时，呕吐物多为  
A.咖啡色  
B.黄绿色稀薄液  
C.含血液  
D.隔日食物  
E.大量黏液
- 63.手少阳三焦经的主治特点是  
A.前头、鼻、口、齿病  
B.前头、口齿、胃肠病  
C.侧头、胁肋病  
D.后头、肩胛病、神志病  
E.后头、背腰痛
- 64.中极穴是以下哪个脏腑之募穴  
A.大肠  
B.小肠  
C.膀胱  
D.肾  
E.肝
- 65.胸剑联合中点至脐中的骨度分寸是  
A.4寸  
B.6寸  
C.8寸  
D.9寸  
E.12寸
- 66.善于治疗无脉症的腧穴是  
A.孔最  
B.尺泽  
D.太渊  
E.少商
- 67.下列腧穴中，可以治疗胆道蛔虫症的是  
A.商阳  
B.合谷  
C.阳溪  
D.手三里  
E.迎香
- 68.下列何经循行，绕肩胛”  
A.手阳明大肠经  
B.足太阳膀胱经  
C.手太阳小肠经  
D.手少阳三焦经  
E.足少阳胆经
- 69.下列腧穴中，常用于治疗呃逆症的是  
A.睛明  
B.攒竹  
C.承泣  
D.四白  
E.印堂
- 70.足少阴肾经在腹部的循行是旁开前正中线  
A.0.5寸  
B.1寸  
C.2寸  
D.4寸  
E.6寸
- 71.针刺环跳穴的最佳体位是  
A.坐位  
B.站位  
C.仰卧位  
D.俯卧位  
E.侧卧位
- 72.下列哪项不是大椎穴的主治病证  
A.热病、疟疾  
B.骨蒸潮热  
C.癫狂痫、小儿惊风  
D.腹泻、痢疾、脱肛  
E.风疹、瘰疬

C.列缺

73.有关晕针的处理方法，叙述不正确的是

- A. 立即停止针刺，将针全部起出
- B. 使患者平卧，头部抬高
- C. 宽衣解带，注意保暖
- D. 予以饮温开水或糖水
- E. 可刺人中、素髻、内关、足三里等穴

74. 属于行针基本手法的是

- A. 循法
- B. 弹法
- C. 刮法
- D. 提插法
- E. 震颤法

75. 治疗感冒的主穴是

- A. 列缺、合谷、肺俞、太渊、大椎
- B. 太渊、肺俞、合谷、鱼际、三阴交
- C. 列缺、合谷、大椎、太阳、风池
- D. 鱼际、尺泽、膻中、肺俞、定喘
- E. 尺泽、肺俞、膏肓、太溪、足三里

76. 漏肩风手阳明经证的针灸配穴是

- A. 外关
- B. 后溪
- C. 合谷
- D. 列缺
- E. 内关

77. 以下哪项不是三阴交穴的主治病证

- A. 脾胃虚弱证
- B. 妇产科病证
- C. 生殖泌尿系统病证
- D. 心悸、失眠
- E. 阳虚诸证

78. 医务人员对患者诚信、宽厚，潜心医学事业，对医学科学忠诚，体现了

- A. 仁爱
- B. 刚
- C. 诚挚
- D. 公正
- E. 奉献

79. 医学人道主义的含义包括

- A. 认为人的生命是宝贵的
- B. 人的生命和尊严具有最高的价值
- C. 医学人道主义要求医务人员同情、关心、尊重和爱护患者
- D. 是人道主义思想在医学领域中的具体体现
- E. 以上皆是

80. 患者的基本权利不包括

- A. 基本医疗权
- B. 疾病认知权
- C. 知情同意权
- D. 自主决定权
- E. 社会免责权

二、A2型选择题（81~90题）

（答题说明：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。）

81. 患者头痛且空，每兼眩晕，腰痛酸软，神疲乏力，遗精带下，耳鸣失眠，舌红少苔，脉细无力，此属何种头痛

- A. 肝阳头痛
- B. 肾虚头痛多
- C. 气血亏虚头痛
- D. 瘀血头痛
- E. 痰浊头痛

82. 患儿，7个月。病起1天，发热，泄泻9次，大便稀薄如水，泻下急迫，恶心呕吐，阵阵啼哭，小便短黄。治疗应首选

- A. 保和丸
- B. 平胃散
- C. 参苓白术散
- D. 藿香正气散
- E. 葛根黄芩黄连汤

83. 患者，男，45岁。面色浮红如妆，但非满面通红，口渴但不欲饮，小便清长，舌淡，苔白，脉浮大，按之无力。其病证多为

- A. 阴虚火旺

- B. 肝胆湿热  
C. 实热内炽  
D. 真热假寒  
E. 真寒假热
84. 患者脱腹绵绵作痛,喜温喜按,呕吐便澹,脘痞食少,畏寒肢冷,口不渴,舌淡苔白润,脉沉细。治宜选用  
A. 小建中汤  
B. 四逆汤  
C. 参苓白术散  
D. 补中益气汤  
E. 理中丸
85. 患者,男,58岁。近日生气后胸膈痞闷,脘腹胀痛,暖腐吞酸,恶心呕吐,饮食不消。治疗应首选  
A. 藿香正气散  
B. 平胃散  
C. 半夏厚朴汤  
D. 半夏泻心汤  
E. 越鞠丸
86. 患者,男,20岁。受凉后突发寒战、高热3天,右下胸痛,咳铁锈色痰,胸片发现右下肺大片阴影,最有可能的诊断是  
A. 大叶性肺炎  
B. 浸润性肺结核  
C. 病毒性肺炎  
D. 支原体肺炎  
E. 结核性胸膜炎
87. 肝硬化患者血清免疫学检查,发现免疫球蛋白的IgM显著增加,血清抗线粒体抗体强阳性(1:128),最可能的诊断是  
A. 肝炎后肝硬化  
B. 原发性胆汁性肝硬化  
C. 酒精性肝硬化  
D. 血吸虫性肝硬化  
E. 血色病所致肝硬化
88. 患者,男,70岁。大便艰涩,排出困难,腹中冷痛,面色觥白,四肢不温,畏寒喜暖,小便清长,舌淡苔白,脉沉迟。治疗本病,除主穴外,还应加用  
A. 合谷、内庭  
B. 太冲、中脘  
C. 脾俞、气海  
D. 神阙、关元  
E. 足三里、三阴交
89. 患者,女,53岁。2小时前突然发现右半身麻木,口角歪斜,言语不利。现神志清,头晕目眩,苔白腻,脉弦滑。其诊断是  
A. 中经络,风痰阻络证  
B. 中经络,肝阳暴亢证  
C. 中经络,阴虚风动证  
D. 中脏腑,气虚血瘀证  
E. 中脏腑,阴虚风动证
90. 患者,男,75岁。咽喉微感疼痛,色暗红,入夜尤甚。针灸治疗主穴选取  
A. 尺泽、合谷、少商、照海  
B. 关冲、合谷、少商、列缺  
C. 关冲、厉兑、鱼际、内庭  
D. 太溪、照海、鱼际、列缺  
E. 太溪、曲池、鱼际、合谷
- 三、B1型选择题(91~150题)  
(答题说明:以下提供若干组考题,每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个与问题最密切的答案,某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。)
- (91~92题共用备选答案)  
A. 冲脉  
B. 任脉  
C. 督脉  
D. 带脉  
E. 阴阳维脉
91. “阳脉之海”指的是  
92. “阴脉之海”指的是  
(93~94题共用朝答案)  
A. 肝

- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

93. '在液为涎"的脏是
94. '在液为泪"的脏是

(95~96 题共用备选答案)

- A. 脾胃
- B. 肝胆
- C. 心肾
- D. 肝肾
- E. 肝肺

95. 与气机调节关系密切的是

96. 气机升降之枢纽指的是

(97~98 题共用备选答案)

- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 三焦
- E. 膀胱

97. 具有受纳水谷功能的是

98. 具有受盛化物功能的是

(99~100 题共用备选答案)

- A. 精神不集中, 甚则失神狂乱
- B. 精神萎靡不振, 气短乏力
- C. 二便失禁, 昏厥, 遗精
- D. 纳呆, 腹胀
- E. 心悸, 惊恐不安

99. 暴喜可引起

100. 过度悲伤可引起

(101~102 题共用备选答案)

- A. 胖大舌
- B. 瘦薄舌
- C. 点刺舌
- D. 老舌
- E. 强硬舌

101. 气血两虚的舌象是

102. 水湿内停的舌象是

(103~104 题共用备选答案)

- A. 肝风内动
- B. 热入心包
- C. 阴虚火旺
- D. 心脾热盛
- E. 中风先兆

103. 歪斜舌多见于

(105~105 题共用备选答案)

- A. 热扰心神
- B. 痰热扰心
- C. 心气不足
- D. 脏气衰微
- E. 宗气大虚

105. 导致自言自语, 见人便止, 首尾不续的病因是

106. 导致语言时有错乱, 语后自知言错的病因是

(107~108 题共用备选答案)

- A. 心肾不交
- B. 胆郁痰扰
- C. 心脾两虚
- D. 心阳亏虚
- E. 心脉痹阻

107. 睡眠时时惊醒, 不易安卧多见于

108. 不易入睡, 甚至彻夜不眠, 兼心烦不寐多见于

(109~110 题共用备选答案)

- A. 证候相兼
- B. 虚实真假
- C. 寒热真假
- D. 证候错杂
- E. 证候转化

109. 麻疹麻毒外透属于

110. 寒包火证属于

(题共用备选答案)

- A. 开窍醒神, 活血通经, 消肿止痛
- B. 开窍醒神, 清热止痛
- C. 开窍醒神, 清心化痰
- D. 开窍醒神, 化湿和胃, 宁神益智
- E. 开窍醒神, 辟秽止痛

111. 苏合香的功效是

112. 冰片的功效是

(113~114 题共用备选答案)

- A. 太子参
- B. 白术
- C. 山药
- D. 人参



E. 甘草

113. 治疗脾虚水肿宜选用的药物是

114. 治疗心气虚、脉结代，宜选用的药物是

(115~116 题共用朝答案)

A. 滋补肝肾，养胃生津

B. 补脾益气，养胃生津

C. 滋阴除烦，养胃生津

D. 养阴润燥，清肺生津

E. 清肺养阴，益胃生津

115. 北沙参的功效是

116. 天冬的功效是

(117~118 题共用备选答案)

A. 龟板

B. 龙骨

C. 鳖甲

D. 牡蛎

E. 代赭石

117. 功效为平肝潜阳，软坚散结，收敛固涩的药物是

118. 功效为滋阴潜阳，软坚散结，善于治疗阴虚风动的药物是

(119~120 题共用纪答案)

A. 风湿痹痛

B. 湿热黄疸

C. 血虚失眠

D. 肾虚腰痛

E. 肠燥便秘

119. 川芎可用于治疗的病证是

120. 郁金可用于治疗的病证是

(121~122 题共用备选答案)

A. 芍药、大腹子

B. 白术、炮附子

C. 生姜、草豆蔻

D. 肉桂、炮干姜

E. 桂枝、茯苓皮

121. 真武汤的组成药物中含有

B. 清热化湿，理气和中

C. 清热泻火，利水通淋

D. 利湿化浊，清热解毒

E. 利水渗湿，温阳化气

123. 八正散的功用

124. 三仁汤的功用

(125~126 题共用宛答案)

A. 玉液汤

B. 炙甘草汤

C. 麦门冬汤

D. 养阴清肺汤

E. 清燥救肺汤

125. 治疗肺胃阴虚之肺痿，宜用

126. 治疗气阴两亏之肺痿，宜用

(127~128 题共用备选答案)

A. 大黄、芒硝、赤芍

B. 桃仁、丹皮、芒硝

C. 大黄、桃仁、甘草

D. 赤芍、丹皮、甘草

E. 大黄、赤芍、丹皮

127. 大黄牡丹汤的组成中含有药物是

128. 桃核承气汤的组成中含有药物是

(129~130 题共用备选答案)

A. 结核病

B. 急性喉炎

C. 疟疾

D. 败血症

E. 伤寒

129. 稽留热可见于

130. 弛张热可见于

(131~132 题共用备选答案)

A. 白血病

B. 传染性单核细胞增多症

C. 急性胆囊炎

D. 钩端螺旋体病

E. 流行性感冒

131. 发热伴寒战常见于

122. 实脾散的组成药物中含有  
(123-124 题共用答案)  
A,宣畅气机, 清利湿热

(133334 题共用<>案)

- A. 高血压脑病
- B. 有机磷中毒
- C. 吗啡中毒
- D. 脑外伤
- E. 尿毒症

133. 意识障碍伴发热见于

134. 意识障碍伴高血压见于

(135~136 题共用备选答案)

- A. 水肿
- B. 甲状腺肿
- C. 反甲
- D. 爪形手
- E. 梭状关节

135. 类风湿性关节炎时出现

136. 贫血时出现

(137-138 题共用备选答案)

- A. 从胸走手
- B. 从手走胸
- C. 从手走头
- D. 从头走足
- E. 从胸腹走足

137. 足三阳经的循行走向规律是

138. 手三阴的循行走向规律是

(139340 题共用备选答案)

- A. 手阳明大肠经
- B. 足阳明胃经
- C. 足太阳膀胱经
- D. 手太阳小肠经
- E. 足少阳胆经

139. 起于目内眦的经脉是

140. 起于目锐眦的经脉是

(141342 题共用备选答案)

- A. 胸痛
- B. 落枕
- C. 腕痛
- D. 头痛

141. 在头部, 当眉梢与目外眦之间, 向后约一横指凹陷处的腧穴善于治疗

142. 在手背侧, 当第 2、第 3 掌骨间, 掌指关节后约 0.5 寸处的腧穴善于治疗

(143-144 题共用备选答案)

- A. 癰疽、初起的肿疡
- B. 哮喘、肺癆、瘰癧
- C. 吐泻并作、中风脱证
- D. 因寒而致的呕吐、腹痛
- E. 命门火衰而致的阳痿、早泄

143. 隔蒜灸的适应病证是

144. 隔姜灸的适应病证是

(145-146 题共用备选答案)

- A. 闪罐法
- B. 留罐法
- C. 走罐法
- D. 刺血拔罐法
- E. 留针拔罐法

145. 治疗丹毒、扭伤常选用

146. 治疗局部皮肤麻木或功能减退常选用

(147-148 题共用备选答案)

- A. 感冒取列缺、合谷
- B. 牙痛取合谷、内庭
- C. 耳鸣取耳门、中渚
- D. 胃痛取双侧梁丘
- E. 头痛取头临泣、足临泣

147. 属于左右配穴的是

148. 属于表里经配穴的是

(149-150 题共用备选答案)

- A. 要有急病人所急的紧迫感
- B. 要有敢担风险团结协作的使命感
- C. 要有深厚的同情感
- D. 抢救前先让患者知情同意
- E. 要有经济头脑, 保证少花钱多办事

149. 在抢救危重病人时, 保证抢救成功的前提条件是

150. 不属于抢救危重病人时优先考虑的是

**E. 呃逆**



## 第二单元

### 一、A1 型选择题（1~50 题）

（答题说明：每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。）

#### 1. 加减葶苈汤主要用于

- A. 风寒感冒
- B. 风热感冒
- C. 阴虚感冒
- D. 气虚感冒
- E. 暑湿感冒

#### 2. 治疗咳嗽凉燥证的最佳方剂是

- A. 杏苏散
- B. 桑杏汤
- C. 香苏散
- D. 清金化痰汤
- E. 桑菊饮

#### 3. 哮病的主症是

- A. 咳嗽胸痛痰黏
- B. 呼吸急促困难
- C. 咳吐浊唾涎沫
- D. 发作性痰鸣喘咳
- E. 咳嗽潮热盗汗

#### 4. 清热化痰，宣肺平喘用于喘证的哪一个证型

- A. 风寒袭肺
- B. 表寒里热
- C. 痰热郁肺
- D. 痰浊阻肺
- E. 肺气郁闭

#### 5. 《千金》苇茎汤用于治疗下列哪个病最为适合

- A. 肺痈
- B. 肺痿
- C. 肺胀
- D.
- E. 肺痔

#### 6. 肺房虚火灼肺，咳血较著者，在辨证方中宜加入

- A. 当归、三七
- B. 泽兰、红花
- C. 黑山栀、紫珠草
- D. 冬虫夏草、蛤蚧
- E. 木蝴蝶、诃子

#### 7. 下列各项，不属肺胀实证治疗原则的是

- A. 祛邪宣肺
- B. 找化痰
- C. 温阳利水
- D. 益肾健脾
- E. 开窍息风

#### 8. 不属于肺痿虚热证的症状是

- A. 气急喘促
- B. 午后潮热
- C. 皮毛干燥
- D. 舌质淡
- E. 舌红而干

#### 9. 下列何项不是惊悸与怔忡的鉴别要点

- A. 致病多由外因或内因引起
- B. 诱因常与惊恐、恼怒或劳累有关
- C. 全身情况尚或较差
- D. 病性属实或属虚
- E. 病位在肝或在心

#### 10. 胸痹心痛发作时，疼痛可以放射到

- A. 右胸
- B. 肩背
- C. 左胁下
- D. 右胁下
- E. 背正中

#### 11. 治疗不寐痰热扰心证，首选的方剂是

- A. 羚角钩藤汤
- B. 黄连温胆汤
- C. 涤痰汤

- D.碌石滚痰丸  
E.半夏白术天麻汤
- 12.外感头痛致病因素的主因是
- A.风邪  
B.寒邪  
C.湿邪  
D.热邪  
E.燥邪
- 13.眩晕的特点是
- A.坐立不安  
B.头重如蒙  
C.头痛头胀  
D.头晕眼花  
E.恶心呕吐
- 14.下列哪项不是中风中经络的主症
- A.猝然昏仆  
B.半身不遂  
C.口眼歪斜  
D.语言不利  
E.手足拘挛
- 15.发于下部的疾病常见的病因是
- A.痰湿  
B.湿热  
C.火郁  
D.风湿  
E.风温
- 16.手指关节处脓肿的切口选择应
- A.越过关节切开  
B.放射状切开  
C.自然纹理切开  
D.避免越过关节  
E.以脓肿为中心，放射状切开
- 17.红丝疔挑刺疗法的操作要点为
- A.沿红线两头针刺出血  
B.梅花针沿红线打刺，微微出血  
C.用三棱针从中挑断红线，微微出血  
D.按“B”选项方法，并加神灯照法  
E.用三棱针沿红线寸寸岫并令微微出血
- A.龙胆泻肝汤  
B.消风散  
C.化斑解毒汤  
D.当归饮子  
E.清营汤
- 19.药毒是药物进入人体内所致的急性炎症反应，与其他疾病相比，其特点是
- A.发病前有用药史，有一定的潜伏期，皮损多形性  
B.发病前均有明显的接触某种物质病史  
C.皮损呈丘疹样风团，上有针尖大小的瘀点、丘疹或水疱，呈散在性分布  
D.皮损主要表现为浅在性脓疱和脓痂，有接触传染和自体接种的特性  
E.对称分布，多形损害，剧烈瘙痒，倾向湿润，反复发作，易转为慢性
- 20.下列疾病中，分为单发性和多发性两种，前者多见于儿童的疾病是
- A.内痔  
B.息肉痔  
C.血栓性外痔  
D.锁肛痔  
E.肛隐窝炎
- 21.产后红恶露的持续天数是
- A. 3~4  
B. 5~6  
C. 7~8  
D. 9~10  
E. 11-12
- 22.治崩三法是
- A.塞流、澄源、复旧  
B.塞流、澄源、求因  
C.止血、求因、固本  
D.塞流、止血、澄源  
E.健脾、调肝、补肾
- 23.经行泄泻主要责之于
- A.肝脾虚弱  
B.脾胃虚弱

18.接触性皮炎风热蕴肤证的代表方为

C.脾肾虚弱





- D. 肝胃虚弱  
E. 肝肾虚弱
24. 带下过少的治疗原则重在
- A. 除湿  
B. 益气养血  
C. 滋补肝肾之阴精  
D. 疏肝养肝  
E. 调理冲任
25. 产后三急是指
- A. 产后血晕、产后痉病、产后腹痛  
B. 产后病痉、产后大便难、产后郁冒  
C. 产后小便不通、产后恶露不绝、产后小便淋痛  
D. 产后呕吐、泄泻、盗汗  
E. 产后冲心、冲肺、冲胃
26. 一般认为月经量超过多少为月经过多
- A. 80ml  
B. 120ml  
C. 150ml  
D. 100ml  
E. 60ml
27. 小儿“纯阳”之体的含义是
- A. 纯阳无阴  
B. 阳常有余  
C. 阴亏阳亢  
D. 发育迅速  
E. 肝常有余
28. 下列不属于内伤咳嗽证的是
- A. 痰热咳嗽证  
B. 痰湿咳嗽证  
C. 气虚咳嗽证  
D. 阴虚咳嗽证  
E. 风寒咳嗽证
29. 小儿痫证的特征，下列哪项是错误的
- A. 突然仆倒  
B. 昏不知人  
C. 口吐涎沫  
D. 四肢抽搐  
E. 发作后留有后遗症
30. 小儿尿频湿热下注证的治法为
- A. 清热利湿，通利膀胱  
B. 清热泻火，利湿通淋  
C. 清热利湿，升提固摄  
D. 清热利湿，固涩小便  
E. 利湿通淋，清热固脬
31. 麻疹在治疗上，为顺的是以
- A. 升  
B. 散  
C. 清  
D. 透  
E. 和
32. 蛔虫病以腹痛为主要症状，其疼痛部位主要是
- A. 胃脘部  
B. 脐周部  
C. 左下腹  
D. 右下腹  
E. 痛无定处
33. 肺炎链球菌肺炎抗菌治疗应首选
- A. 红霉素  
B. 青霉素 G  
C. 复方磺胺甲基异恶唑  
D. 氟喹诺酮类  
E. 头弛菌素类
34. COPD 急性加重期的重要治疗措施是
- A. 止咳、祛痰  
B. 解痉、平喘  
C. 控制感染  
D. 避免及减少各种诱因  
E. 抗过敏

35. 急性型特发性血小板减少性紫癜的特点是
- A. 多见于女性
  - B. 无感染病史
  - C. 多数病程迁延
  - D. 骨髓幼稚型巨核细胞增多
  - E. 多见于成人
36. 不属类风湿关节炎关节外表现的是
- A. 类风湿结节
  - B. 周围神经病变
  - C. 贫血
  - D. 肺间质病变
  - E. 心脏瓣膜病变
37. 心绞痛发作时心电图 S-T 段抬高可能是
- A. 变异型心绞痛
  - B. 卧位型心绞痛
  - C. 劳累性心绞痛
  - D. 稳定型心绞痛
  - E. 恶化型心绞痛
38. 支气管哮喘的典型表现主要是
- A. 先兆症状后出现吸气困难
  - B. 发作性带有哮鸣音的呼气性呼吸困难
  - C. 伴哮鸣音的混合性呼吸困难
  - D. 伴哮鸣音的呼吸困难, 粉红色泡沫痰
  - E. 哮喘发作 24 小时以上, 伴咯血
39. 肝硬化最常见的并发症是
- A. 自发性腹膜炎
  - B. 肝肺综合征
  - C. 急性上消化道出血
  - D. 肝性脑病
  - E. 肝肾综合征
40. 慢性肾衰竭时常有的水与电解质紊乱表现是
- A. 代谢性酸中毒, 高钾和低镁血症
  - B. 代谢性酸中毒, 失水和低钠、低钾血症
  - C. 代谢性酸中毒, 低血磷和低钙血症
  - D. 代谢性碱中毒, 低钾和低氮血症
  - E. 代谢性酸中毒, 高磷和低钙血症
41. 关于急性肾盂肾炎临床表现。说法错误的是
- A. 肉眼血尿
  - B. 贫血
  - C. 畏寒、发热
  - D. 尿频、尿急、尿痛
  - E. 腰痛
42. 早期诊断肝硬化, 最有价值的检查是
- A. X 线检查
  - B. 放射性核素检查
  - C. 肝活检
  - D. B 超检查
  - E. AFP 检查
43. 某种传染病在某一地区的近几年发病率的一迹平称为
- A. 散发
  - B. 暴发
  - C. 流行
  - D. 流行性
  - E. 大流行
44. 下述哪项不是艾滋病的传播途径
- A. 性接触
  - B. 注射及输血和血制品
  - C. 母婴传播
  - D. 器官移植
  - E. 消化道
45. 慢性乙型肝炎的治疗关键是
- A. 休息
  - B. 保肝
  - C. 降酶
  - D. 抗病毒
  - E. 调节免疫
46. 下列哪项不是急性菌痢的典型表现
- A. 里急后重
  - B. 发热
  - C. 呕吐
  - D. 腹痛

- E. 黏液便
47. 有关隔离的描述, 错误的是
- 是控制传染病流行的重要措施
  - 便于管理传染源
  - 可防止病原体向外扩散给他人
  - 根据传染病的平均传染期来确定隔离期限
  - 某些传染病患者解除隔离后尚应进行追踪观察
48. 受吊销医师执业证书行政处罚, 自处罚决定之日起至申请注册之日止不满多长时间的不给予注册
- 6个月
  - 12个月
  - 18个月
  - 24个月
  - 36个月
49. 关于突发公共卫生事件的应急预案措施中, 有关部门及医疗卫生机构应当对传染病做到下列哪“四早”
- 早发现、早报告、早隔离、早治疗
  - 早发现、早隔离、早诊断、早治疗
  - 早发现、早报告、早诊断、早治疗
  - 早发现、早报告、早诊断、早治疗
  - 早发现、早报告、早观察、早治疗
50. 下列各项中, 属于发生医疗事故争议时, 应在医患双方在场的情况下封存和启封的材料是
- 会诊意见
  - 手术同意书
  - 特殊检查同意书
  - 手术及麻醉记录单
  - 医学影像检查资料
- 案, 请从中选择一个最佳答案。)
51. 患者因皮肤疮痍破溃而引发水肿, 肿势自颜面渐及全身, 小便不利, 恶风发热, 咽红, 舌红苔薄黄, 脉滑数。治疗应首选
- 越婢加术汤合桑白皮汤
  - 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮
  - 麻黄连翘赤小豆汤合五皮散
  - 麻黄连翘赤小豆汤合猪苓汤
  - 实脾饮合五味消毒饮
52. 患者, 男, 40岁。急性发病, 发病半日, 尿道窘迫疼痛, 少腹拘急, 腰部绞痛, 大便秘结, 曾发作二次排尿突然中断。舌质红, 苔黄腻, 脉弦紧数。应选用的主方为
- 石韦散
  - 八正散
  - 沉香散
  - 四妙丸
  - 大柴胡汤
53. 患者, 男, 65岁。排尿不畅3年, 加重1个月, 小便点滴而出, 小腹胀痛, 腰膝酸痛, 神疲乏力, 畏寒肢冷, 舌质淡, 苔白, 脉沉细无力, 应诊为
- 淋证
  - 关格
  - 少尿
  - 腰痛
  - 痺闭
54. 患者精神恍惚, 心神不宁, 悲忧善哭, 时时欠伸, 舌淡苔薄白, 脉弦细。其治法是
- 益气养血
  - 补肾宁心
  - 养心安神
  - 解郁化痰
  - 疏肝解郁
55. 患者吐血色红, 夹有食物残渣, 脱腹胀闷, 口臭, 便秘, 大便色黑, 舌红, 苔黄, 脉滑数, 治疗宜选用

## 二、A2型选择题 (51~94题)

(答题说明: 每一道考题是以一个小案例出现的, 其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答

- A. 泻心汤合清胃散  
 B. 泻心汤合十灰散  
 C. 玉女煎合左金丸  
 D. 龙胆泻肝汤合清胃散  
 E. 清胃散合茜根散
56. 患者烦渴多饮半月余，口干舌燥，尿频量多，舌边尖红，苔黄，脉洪数有力。治则宜用  
 A. 清热润肺，生津止渴  
 B. 养阴润肺，生津止渴  
 C. 清胃泻火，养阴保津  
 D. 滋阴固肾，生津止渴  
 E. 滋养胃阴，生津止渴
57. 患者夜寐盗汗，五心烦热，两颧色红，口渴，舌红少苔，脉细数。治疗应首选  
 A. 黄连阿胶汤  
 B. 黄连温胆汤  
 C. 当归六黄汤  
 D. 养阴清肺汤  
 E. 甘麦大枣汤
58. 患者午后或夜间发热，不欲近衣，手足心热，烦躁，少寐多梦，盗汗，口干咽燥，舌质红，苔少，脉细数。辨证应属  
 A. 阴虚发热证  
 B. 气虚发热证  
 C. 血虚发热证  
 D. 血瘀发热证  
 E. 气郁发热证
59. 患者刘某，男，69岁。平素体弱多病，现症见腰酸背痛，小便失禁，畏寒肢冷，下利清谷，舌质淡胖，苔白，脉沉迟。最佳方剂为  
 A. 附子理中丸  
 B. 拯阳理劳汤  
 C. 左归丸  
 D. 右归丸  
 E. 归脾汤
60. 患者由情志异常、精神刺激而发作，突然昏倒，不知人事，或四肢厥冷，呼吸气粗，口噤握拳，舌苔薄白，脉伏或沉弦。证属  
 A. 血厥实证  
 B. 痰厥  
 C. 气厥虚证  
 D. 血厥虚证  
 E. 气厥实证
61. 患者肢体关节酸楚，重着，疼痛，关节活动不利，麻木不仁，舌苔白腻，脉濡缓。治疗应首选  
 A. 独活寄生汤  
 B. 蠲痹汤  
 C. 意苣仁汤  
 D. 乌头汤  
 E. 白虎加桂枝汤
62. 腰痛患者，腰部冷痛重着，转侧不利，静卧痛不减，遇阴雨天疼痛加重，舌苔白腻，脉沉缓。其证候是  
 A. 寒湿腰痛  
 B. 风寒腰痛  
 C. 瘀血腰痛  
 D. 湿热腰痛  
 E. 肾虚腰痛
63. 患者咳嗽频剧，咯痰不爽，痰黏稠而黄，咳声嘶哑，喉燥咽痛，身热恶风，头痛肢楚，鼻流黄涕，口渴，小便黄，苔薄黄，脉浮数。治法宜  
 A. 疏风清肺，润肺止咳  
 B. 疏风散寒，宣肺止咳  
 C. 疏风清热，宣肺止咳  
 D. 滋阴润肺，化痰止咳  
 E. 清热肃肺，豁痰止咳
64. 患者症见呼吸急促，喉中哮鸣有声，胸膈满闷如塞，面色晦青，形寒肢冷，苔白滑，脉弦紧者。选用下列何方  
 A. 定喘汤  
 B. 温胆汤  
 C. 控涎丹  
 D. 射干麻黄汤

- E. 草房大枣泻肺汤
65. 患者一侧臀部结块, 肿胀疼痛, 皮肤灼热, 红肿以中心为著, 边界不清, 步行困难, 身热头痛, 病前有局部肌肉注射史。应诊断为
- A. 丹毒  
B. 流注  
C. 臀痈  
D. 环跳疽  
E. 附骨疽
66. 患者, 男, 21岁。双手背起结节1年, 如豆般大, 坚硬粗糙, 表面蓬松枯槁, 色黄。皮损范围有扩大趋势, 无任何不适, 舌红, 苔薄, 脉弦数。诊断为
- A. 线瘕  
B. 跖疣  
C. 鼠乳  
D. 疣目  
E. 丝状疣
67. 患者, 女, 40岁。慢性肾病, 病程日久, 平素头发焦黄, 发病时呈大片均匀脱落; 伴头昏, 耳鸣, 目眩, 腰膝酸软; 舌质淡, 舌苔薄, 脉细。治疗宜选用
- A. 八珍汤  
B. 大补阴丸  
C. 通窍活血汤  
D. 六味地黄汤  
E. 七宝美髯丹
68. 患者肛门突然剧烈疼痛, 肛门缘周围有暗紫色椭圆形肿块突起, 表面水肿, 其诊断是
- A. 肛管癌  
B. 血栓性外痔  
C. 肛旁脓肿  
D. 肛裂  
E. 内痔嵌顿
69. 患者, 男, 38岁。患急性子痛2天, 恶寒发热, 左侧睾丸肿大疼痛, 疼痛引及子系(精索), 舌红苔黄腻, 脉滑数。证属湿热下注, 气血壅滞, 经络阻隔为患。治宜清热解毒, 利湿消肿, 应首选
- A. 透脓散  
B. 滋阴除湿汤  
C. 革薜化毒汤  
D. 柴胡疏肝散  
E. 枸橘汤加減
70. 患者, 女, 40岁。肛门坠胀, 痔核脱出, 需用手托方能复位, 便血鲜红或淡红; 面色无华, 神疲乏力, 少气懒言, 纳呆便溏; 舌淡胖, 边有齿痕, 苔薄白, 脉弱。应选方药为
- A. 凉血地黄汤加減  
B. 槐花散加減  
C. 脏连丸加減  
D. 止痛如神汤加減  
E. 补中益气汤加減
71. 某患者, 一侧乳房广泛紧韧肿硬, 皮色紫红, 皮肤呈橘皮样变, 全身炎症反应不明显, 应首先考虑为
- A. 乳岩  
B. 乳痔  
C. 乳瘤  
D. 乳发  
E. 乳核
72. 患者, 女, 26岁。多次发生经间期出血, 此次阴道出血量稍多, 色深红, 质粘腻, 无血块, 平素带下量多色黄, 时现异味, 小腹隐痛, 神疲乏力, 胸闷烦躁, 纳呆腹胀, 小便短赤, 舌红苔黄腻, 脉滑数。辨属何证
- A. 脾虚证  
B. 血瘀证  
C. 肝郁证  
D. 血热证  
E. 湿热证
73. 患者, 女, 30岁。月经停闭半年未行, 形体肥胖, 胸脱满闷, 泛恶, 带下量多、色白, 苔

- 腻,脉滑。首选
- A. 启宫丸合四君子汤  
B. 苍附导痰丸合四君子汤  
C. 丹溪治痰方合四君子汤  
D. 革癖渗湿汤  
E. 化痰燥湿通经汤
74. 患者江某,新产后一周小腹隐隐作痛,数日不止,喜按喜揉,恶露量少,色淡红,质稀无块,面色苍白,头晕,眼花,心悸怔忡;舌质淡,苔薄白,脉细弱。最佳治法是
- A. 补血益气,缓急止痛  
B. 补血养血,化瘀止痛  
C. 补血益气,温经止痛  
D. 补血益气,暖宫止痛  
E. 温经散寒,化瘀止痛
75. 陈某,女,婚后5年未怀孕,月经多推后几天,经来小腹胀痛,经色紫,有血块,块下痛减,有时经行不畅;伴见肛门坠痛,性交痛;舌质紫暗,脉弦细。最佳治法是
- A. 逐瘀荡胞,调经助孕  
B. 活血化瘀  
C. 疏肝理气  
D. 理气活血化瘀  
E. 补肾活血,调经助孕
76. 急性盆腔炎患者,下腹部疼痛拒按,寒热往来,带下量多、色黄、质稠、味臭秽,经量增多,经期延长,淋漓不止,大便燥结,小便短赤;舌红有瘀点,苔黄厚,脉弦滑。治疗首选
- A. 五味消毒饮  
B. 清营汤  
C. 大黄牡丹汤  
D. 仙方活命饮  
E. 犀角地黄汤
77. 一妇人产后遍身关节酸楚,疼痛,肢体麻木,面色萎黄,头晕,心悸,舌淡,苔薄,脉细弱。最佳治法是
- A. 养血活血,温阳通络  
B. 疏肝养血,通络止痛  
C. 养血益气,温经通络  
D. 养血温中,通络止痛  
E. 养血滋阴,通络止痛
78. 患者,女,25岁。月经提前九天而至,连续两月,量多,色深红,质黏稠;伴心烦,口干,面赤,大便干,小便黄;舌质红,苔黄,脉滑数。最佳选方是
- A. 清热固经汤  
B. 清经散  
C. 保阴煎  
D. 两地汤  
E. 丹栀逍遥散
79. 患儿,5岁。舌苔花剥,经久不愈,状如“地图”。病机多为
- A. 脾之气阳虚弱  
B. 肺脾气阴亏虚  
C. 乳食积滞内停  
D. 胃之气阴不足  
E. 寒湿生冷内停
80. 患儿,2岁。发热1天。证见高热,恶寒,无汗,鼻塞,惊惕哭闹,睡卧不宁,大便干结,小便短黄,舌质红,指纹紫达于气关。其治法,应在解表的基础上加用
- A. 清热镇惊  
B. 清心开窍  
C. 清肝熄风  
D. 清热解毒  
E. 通腑泄热
81. 患儿,10岁。反复咳嗽哮喘4年余。证见咳嗽无力,声低息微,自汗畏风,面白少华,神疲懒言,形体消瘦,大便稀澹,舌淡红,苔薄白,脉细弱。其证候是
- A. 寒性哮喘  
B. 肺实肾虚  
C. 肺肾阴虚  
D. 肺脾气虚

E. 脾肾阳虚

82. 患儿,1岁。面色苍白,神疲乏力,发黄稀疏,消瘦4月,诊断为“营养性缺铁性贫血”。选用铁剂治疗时,正确的停药时间为

- A. 血红蛋白开始升高时
- B. 血红蛋白恢复正常时
- C. 血红蛋白恢复至正常后2个月左右
- D. 血红蛋白恢复至正常后4个月左右
- E. 血红蛋白恢复至正常后6个月左右

83. 患儿,8岁。罹患心肌炎2年,症见神疲乏力,畏寒肢冷,面色苍白,头晕多汗,舌质淡胖,脉缓无力。治疗应首选方剂是

- A. 银翘散
- B. 失笑散
- C. 生脉散
- D. 葛根苓连汤
- E. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤

84. 男孩,10岁。身体消瘦,上课注意力不能集中,多动而不暴躁,言语冒失,做事有头无尾,睡眠不实,记忆力差,伴自汗盗汗,偏食纳少,面色无华,舌质淡,苔薄白,脉虚弱。治疗应首选方剂是

- A. 八珍汤



- B. 二陈汤合黄连温胆汤  
C. 杞菊地黄丸  
D. 孔圣枕中丹  
E. 归脾汤合甘麦大枣汤
85. 患儿, 2岁。发热3天, 口腔、手足、四肢、臀部可见疱疹, 疹色紫暗, 疱液混浊, 口臭流涎, 小便黄, 大便秘结, 舌质红绛, 苔黄厚腻, 指纹紫。治疗首选  
A. 甘露消毒丹  
B. 清瘟败毒饮  
C. 凉营清气汤  
D. 清胃解毒汤  
E. 透疹凉解汤
86. 患者十二指肠溃疡病史7年, 饮酒后突发上腹剧痛, 查体呈板状腹, 拟诊为急性穿孔, 确诊最重要的检查是  
A. 粪便隐血试验  
B. 腹腔穿刺  
C. 腹部X线透视  
D. 钡餐透视  
E. 血常规
87. 患者王某, 因水肿、高血压、蛋白尿就诊, 经检查拟诊为慢性肾炎, 需与慢性肾盂肾炎鉴别, 需要做何检查  
A. 肾功能检测  
B. 静脉肾盂造影  
C. 尿细菌培养  
D. 尿常规  
E. 血常规
88. 患者, 女, 48岁。反复尿频、尿急、尿痛、夜尿增多、低热1年余, 近2天来高热, 上述症状加剧入院。每次发作抗生素治疗有效。既往有肺结核病史, 血压165/95mmHg, 尿蛋白(+), 白细胞8个/HP, 静脉肾盂造影示肾盂肾盏瘢痕狭窄扩张, 尿菌培养阴性, 诊断最可能的是  
A. 慢性肾小球肾炎  
B. 慢性肾盂肾炎  
C. 急性肾盂肾炎  
D. 肾结石  
E. 肾结核
89. 患者, 女, 29岁。因月经量多2年, 出现贫血表现, 拟诊断为缺铁性贫血, 可作为缺铁依据的检查结果是  
A. 转铁蛋白饱和度<15%  
B. FEP>4.5 (jLg/gHb)  
C. 血清铁蛋白<12jg/L  
D. 总铁结合力>64.4xmmol/L  
E. 血清铁 <8.9 μL mmol/L
90. 男性, 55岁, 患有慢性肾炎, 水肿明显, 血压160/95mmHg, 控制血压应首选的药物是  
A. 利血平  
B. 降压灵  
C. 苯那普利  
D. 硝苯地平  
E. 呋塞米
91. 患者, 男, 12岁。发热伴鼻出血1周。检查皮肤出血点, 胸骨中下段有压痛。Hb90g/L, WBC $10 \times 10^9/L$ , PLT $50 \times 10^9/L$ , 血涂片可见幼稚细胞。下列哪项检查对诊断最有意义  
A. 胸片检查  
B. 尿液检查  
C. 骨髓检查  
D. 酸化血清溶血试验  
E. 网织红细胞计数
92. 患者, 男, 50岁。确诊为慢性髓细胞白血病慢性期。首选治疗是  
A. 骨髓移植  
B. 泼尼松  
C. 长春新碱  
D. 羟基脲  
E. 环磷酰胺
93. 患者, 女, 50岁。类风湿关节炎病史6年, 可生活自理, 不能参加工作, 活动受限, 其关节功能障碍的分级是  
A. N级

- B. V 级
- C. I 级
- D. II 级
- E. m 级

94. 患者，女，56岁。身高155cm，体重55kg，体检发现空腹血糖6.4mmol/L，下列正确的是
- A. 可诊断糖尿病
  - B. 应进行口服葡萄糖耐量试验
  - C. 可排除糖尿病
  - D. 应进行100g口服葡萄糖耐量试验
  - E. 应做24小时尿糖定量

### 三、A3型选择题（95~118题）

（答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设多道考题。请根据题干所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案。）

（95~97题共用题干）

患者，女，65岁。咳嗽5天。咳嗽声重，气急，咽痒，咳痰稀薄色白，鼻塞，流清涕，头痛，肢体酸楚，舌苔薄白，脉浮。

95. 其治法是
- A. 疏风清肺，润燥止咳
  - B. 疏风散寒，宣肺止咳
  - C. 疏风清热，宣肺止咳
  - D. 清肺泻肝，顺气降火
  - E. 清热肃肺，豁痰止咳
96. 治疗应首选
- A. 三拗汤合止嗽散加减
  - B. 黛蛤散合黄芩泻白散加减
  - C. 桑杏汤加减
  - D. 清金化痰汤加减
  - E. 桑菊饮加减
97. 若素有寒饮伏肺，兼见咳嗽上气，痰液清稀，胸闷气急，舌淡红，苔白而滑，脉浮紧者，可改投
- A. 沙参麦冬汤
  - B. 二陈平胃散

- C. 桑杏汤
- D. 清金化痰汤加减
- E. 小青龙汤

（98~100题共用题干）

患者，女，52岁。情绪不宁，急躁易怒，咽中梗塞，胸胁胀满，口苦而干，或头痛，目赤，耳鸣，或嘈杂吞酸，大便秘结，舌质红，苔黄，脉弦数。

98. 该病诊断为

- A. 噎膈
- B. 郁证
- C. 瘰疬
- D. 佛
- E. 聚证

99. 证型为

- A. 肝气郁结
- B. 肝阳上亢
- C. 痰气郁结
- D. 气郁化火
- E. 肝郁不舒

100. 选方为

- A. 柴胡疏肝散
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 丹栀逍遥散
- D. 半夏厚朴汤
- E. 泻白散

（101~103题共用题干）

患者，男，43岁。头后部疼痛，牵连至项，常有拘急收紧感，或伴恶风畏寒，遇风尤剧，口不渴，苔薄白，脉浮紧。

101. 该病治则为

- A. 活血祛风通络
- B. 散寒通窍止痛
- C. 散寒胜湿通络
- D. 疏风散寒和络
- E. 疏散风寒止痛

102. 该病治疗可选择以下哪项药物

- A. 葛根、白芷

- B. 柴胡、川芎
- C. 羌活、蔓荆子
- D. 羌活、葛根
- E. 吴茱萸、藁本

103. 该病针灸治疗选择配穴为

- A. 印堂、内庭
- B. 天柱、后溪、昆仑
- C. 率谷、外关、足临泣
- D. 四神聪、太冲、内关
- E. 印堂、后溪、足临泣

(104~106 题共用题干)

患者，女，43岁。颈部呈弥漫性肿大3年，表面平坦，质软不痛，边缘不清，随喜怒消长，皮色如常，肿块随吞咽上下移动；伴急躁易怒，善太息。舌质淡红，苔薄白，脉沉弦。

104. 根据题干分析，其诊断是

- A. 肉瘦
- B. 瘦痛
- C. 石瘦
- D. 肉瘤
- E. 气瘰

105. 根据题干分析，该病治法是

- A. 解郁安神，化痰软坚
- B. 补益气血，解毒化痰
- C. 清肝泻火，祛瘀解毒
- D. 益气养阴，软坚散结
- E. 疏肝解郁，化痰软坚

106. 在105题的基础上，其首选方剂是

- A. 四海舒郁丸
- B. 逍遥散
- C. 柴胡疏肝散
- D. 四七汤
- E. 逍遥散合海藻玉壶汤

(107~109 题共用题干)

患者经期或经后小腹冷痛，喜按，得热则舒，经量少，经色黯淡，腰腿酸软，小便清长。舌淡胖，苔白润，脉沉。

107. 其证是

- A. 寒凝血瘀证
- B. 阳虚内寒证
- C. 脾肾阳虚证
- D. 气血虚弱证
- E. 肾气亏损证

108. 其治法是

- A. 理气行滞，化瘀止痛
- B. 温经散寒，化瘀止痛
- C. 益气养血，调经止痛
- D. 温经扶阳，暖宫止痛
- E. 补肾益精，养血止痛

109. 治疗应选的方剂是

- A. 温经汤（《金匮要略》）
- B. 艾附暖宫丸
- C. 温经汤（《妇人大全良方》）
- D. 少腹逐瘀汤
- E. 膈下逐瘀汤

(110~112 题共用题干)

患儿，3岁。体重10kg，身长80cm。其形体消瘦，面色无华，毛发干枯，精神萎靡不振，不思饮食，腹膨如鼓，一身浮肿，双踝肿甚，按之凹陷，舌质淡，苔薄白，指纹淡。

110. 其治法是

- A. 补益气血，佐以运脾
- B. 养血柔肝，活血化痰
- C. 滋阴生津，养血安神
- D. 健脾温阳，利水消肿
- E. 调脾健运，开胃进食

111. 其选方是

- A. 防己黄芪汤合五苓散
- B. 黄芪桂枝五物汤合真武汤
- C. 五皮饮合胃苓汤
- D. 实脾饮合五苓散
- E. 麻黄连翘赤小豆汤

112. 根据材料分析，判断该患儿的生长发育状况

- A. 体重正常，身高正常
- B. 体重偏低，身高偏低

- C. 体重偏低, 身高正常
- D. 体重偏高, 身高偏低
- E. 体重偏低, 身高偏高

(113314 题共用题干)

患者张某, 77 岁, 患慢性支气管炎病 35 年, 两周前因受凉出现胸闷、咳嗽、喘憋加重, 咳白色黏痰, 经治疗咳嗽减轻, 但出现烦躁, 昼睡夜醒, 精神恍惚。动脉血气分析示  $\text{PaO}_2$  45mmHg,  $\text{PaCO}_2$  为 70mmHg, 血象: 白细胞  $12 \times 10^9/\text{L}$ , 中性粒细胞 0.88。

113. 患者的诊断哪项根据不足

- A. 肺部感染
- B. 呼吸衰竭
- C. 肺性脑病
- D. 支气管哮喘
- E. 慢性支气管炎

114. 目前的治疗, 哪项措施欠妥

- A. 吸氧
- B. 氨茶碱
- C. 抗菌药物
- D. 呼吸机治疗
- E. 氨溴索

(115~116 题共用题干)

女性患者, 38 岁。心慌气短十余年, 加重伴不能平卧 2 小时。查体: 心率 142 次/分, 心音强弱不等, 心律绝对不齐, 心尖区闻及收缩期杂音和舒张期隆隆样杂音, 双肺底闻及细小湿啰音, 心界向左侧扩大, 肝大, 肋下 5cm, 肝-颈静脉反流征阳性, 双下肢水肿。

115. 此患者的诊断为

- A. 二尖瓣狭窄、房颤、右心衰竭
- B. 二尖瓣关闭不全、房颤、右心衰竭
- C. 二尖瓣狭窄、房颤、左心衰竭
- D. 三尖瓣狭窄、房颤、右心衰竭
- E. 三尖瓣关闭不全、房颤、右心衰竭

116. 治疗应首选

- A. 口服地高辛
- B. 静注西地兰
- C. 肌注映塞米

- D. 皮下注射吗啡
- E. 静注普萘洛尔

(117~118 题共用题干)

男性患者, 38 岁, 间歇性左下腹痛 5 个月, 解脓血便 2 个月, 反复抗菌药物治疗无效。查体: 腹平软, 左下腹轻压痛, 未扪及包块。

117. 根据以上资料, 最有可能的诊断是

- A. 克隆病
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 结肠癌
- D. 慢性细菌性痢疾
- E. 慢性阿米巴痢疾

118. 为明确诊断, 最有价值的诊断方法是

- A. 临床症状及体征
- B. 大便常规与培养
- C. X 线钡剂灌肠
- D. 结肠镜检查
- E. 血清免疫球蛋白测定

四、B1 型选择题 (9~150 题)

(答题说明: 以下提供若干组考题, 每组考题共用列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个与问题最密切的答案, 某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。)

(119~121 题共用做答案)

- A. 风寒感冒
- B. 风热感冒
- C. 暑湿感冒
- D. 气虚感冒
- E. 阴虚感冒

119. 身热, 微恶风, 汗少, 肢体酸重或疼痛, 头昏重胀痛, 咳嗽痰黏, 鼻流浊涕, 心烦口渴, 渴不多饮, 胸闷脘痞, 泛恶, 腹胀, 大便或澹, 小便短赤, 舌苔薄黄而腻, 脉濡数。证属

120. 恶寒重, 发热轻, 无汗, 头痛, 肢节酸疼, 鼻塞声重或鼻痒喷嚏, 时流清涕, 咽痒, 咳嗽, 痰吐稀薄色白, 口不渴或渴喜热饮, 舌苔薄白而润, 脉浮紧。证属

121. 身热,微恶风寒,少汗,头昏,心烦,口干,干咳少痰,舌红少苔,脉细数。证属  
(122-124 题共用备选答案)
- A. 养血祛风通络  
B. 平肝潜阳,活血通络  
C. 息风化痰,活血通络  
D. 化痰息风,宣郁开窍  
E. 回阳救阴,益气固脱
122. 中风中脏腑脱证的治法是  
123. 中风中脏腑风痰瘀阻证的治法是  
124. 中风中经络风阳上扰证的治法是  
(125-126 题共用备选答案)
- A. 心阳虚证  
B. 心气虚证  
C. 肾气虚证  
D. 肾阳虚证  
E. 阴虚证
125. 七福饮治疗虚劳的证型为  
126. 大补元煎治疗虚劳的证型为  
(127-128 题共用备选答案)
- A. 五味消毒饮  
B. 柴胡清肝汤  
C. 普济消毒饮  
D. 犀角地黄汤  
E. 五神汤合革藓渗湿汤
127. 丹毒风热毒蕴证选用的方剂是  
128. 丹毒湿热毒蕴证选用的方剂是  
(129-130 题共用备选答案)
- A. 皮损对称分布,多形损害,剧烈瘙痒,反复发作易成慢性  
B. 好发于颈项、肘、尾骶部,皮损分布常不对称  
C. 发于接触部位,皮损表现单一,伴有痒或灼热感  
D. 皮损剧烈瘙痒,搔抓后皮损肥厚,皮沟加深,皮嵴隆起,极易形成苔藓样变  
E. 损害多为暗红、淡紫或皮肤色多角扁平丘疹,有蜡样光泽、网状纹
129. 牛皮癣的特点是  
130. 湿疮的皮损特点是  
(131-132 题共用备选答案)
- A. 痛经  
B. 带下过少  
C. 胎动不安  
D. 子晕  
E. 滑胎
131. 肝气郁结,血为气滞,冲任不畅,可发生  
132. 肝阴不足,肝阳偏亢,可发生  
(133-134 题共用备选答案)
- A. 归脾丸  
B. 大补阴丸  
C. 四君子汤  
D. 大补元煎  
E. 补中益气汤
133. 气虚型阴挺首选  
134. 肾虚型阴挺首选  
(135-136 题共用备选答案)
- A. 头面部  
B. 四肢  
C. 下肢伸侧及臀部  
D. 四肢及头面部  
E. 躯干
135. 过敏性紫癜的常见部位  
136. 血小板减少性紫癜的常见部位  
(137-138 题共用备选答案)
- A. 清解透表汤  
B. 透疹凉解汤  
C. 凉营清气汤  
D. 清胃解毒汤  
E. 化斑解毒汤
137. 治疗猩红热毒炽气营证的首选方剂是  
138. 治疗风痧邪入气营证的首选方剂是  
(139-140 题共用备选答案)
- A. 颗粒管型  
B. 透明管型  
C. 少量白细胞  
D. 畸形红细胞

E. 白细胞管型

139. 尿沉渣检查, 肾盂肾炎多见

140. 尿沉渣检查, 慢性肾衰竭多见

(141-142 题共用备选答案)

A. 下垂性压陷性水肿

B. 脾肿大

C. 劳力性呼吸困难

D. 咳嗽、咳痰

E. 咯血

141. 左心衰竭时最早出现的症状是

142. 右心衰竭时典型的体征是

(143-144 题共用备选答案)

A. 淋巴转移

B. 种植转移

C. 直接蔓延

D. 血行转移

E. 上行转移

143. 胃癌最早、最常见的转移方式是

144. 原发性肝癌最常见的转移方式是

(145-146 题共用备选答案)

A. 体液传播

B. 土壤传播

C. 飞沫传播

D. 水、食物、苍蝇传播

E. 蚊虫传播

145. 流感传播途径主要是

146. 流脑传播途径主要是

(147-148 题共用备选答案)

A. 病程超过 2 周

B. 病程超过 3 月

C. 病程超过 2 月

D. 病程超过半年

E. 病程超过 1 年

147. 慢性肝炎

148. 慢性菌痢

(149-150 题共用备选答案)

A. 以人为本, 践行宗旨

B. 遵纪守法, 依法执业

C. 尊重患者, 关爱生命

D. 廉洁自律, 恪守医德

E. 优质服务, 医患和谐

149. 弘扬高尚医德, 严格自律, 不索取和非法收受患者财物所属的行为规范范畴是

150. 坚持救死扶伤、防病治病的宗旨, 以病人为中心, 全心全意为人民健康服务所属的行为规范范畴是