押题密卷二

第一单元

A1型题

1.答案：C

解析:1.急性龋病变进展快，多见于儿童或青年人，病变的牙组织颜色浅，质地软而湿润，容易受到感染而发生牙髓病变。故选C。

2.答案：D

解析:2.骨折达到组织学的完全骨性愈合一般需要时5～6个月。故本题答案是D。数据要牢记。

3.答案：C

解析:3.Le FortII型骨折：锥形骨折，鼻额缝横过鼻梁—眶内侧壁—眶底—颞上颌缝—上颌骨侧壁至翼突。故选C。

4.答案：A

解析:4.口腔颌面部损伤清创的原则是尽可能保留颌面部组织。故选A。

5.答案：A

解析:5.多形性腺瘤、血管瘤及淋巴管瘤均不是牙源性，排除B、C、E。角化囊肿其本质是牙源性的颌骨囊肿，囊肿在病理学上不属于肿瘤，与题意不符，排除D。成釉细胞瘤是由成釉器或牙板上皮发育而来的牙源性颌骨肿瘤，并在临床上最为常见，故选A。

6.答案：C

解析:6.复发性口腔溃疡好发于唇、颊、舌缘等，在黏膜的任何部位均能出现。但在角化完全的部位例如硬腭则少见。故选C。

7.答案：C

解析:7.慢性复发性腮腺炎青春期后有自愈趋势，随年龄增长，发作期缩短，间隔期延长，故选C。急性化脓性腮腺炎、流行性腮腺炎以及腮腺良性肥大都没有自愈性。

8.答案：E

解析:8.一旦发生干槽症，治疗原则是彻底清创以及隔离外界对牙槽窝的刺激，促进肉芽组织的生长。在阻滞麻醉下，用3%过氧化氢和生理盐水反复冲洗至流出液清亮，在牙槽窝内放入碘仿纱条。故选E。

9.答案：E

解析:9.颞下颌关节脱位时，髁突位于关节结节之前上方而无法自行复原，同时患侧的下颌骨前伸，使得下颌骨整体向健侧偏斜，同时下颌牙弓也向健侧偏移，出现健侧的后牙反（牙合），颏部中线以及下前牙中线也偏向健侧。故选E。

10.答案：D

解析:10.腮腺咬肌区的境界：前界为咬肌前缘，后界为胸锁乳突肌、乳突及二腹肌后腹的前缘，上界为颧弓及外耳道，下界为下颌骨下缘，内侧为咽旁间隙，外侧为皮肤。故选D。

11.答案：E

解析:11.黏液囊肿可分为外渗性黏液囊肿及潴留性黏液囊肿：①外渗性黏液囊肿，占黏液囊肿的80%以上，病理特点表现为无上皮衬里，外渗性黏液囊肿是由创伤引起的；②潴留性黏液囊肿，有上皮衬里、潴留的黏液团块及结缔组织被膜，发病原因主要是导管系统的阻塞。故选E。

12.答案：D

解析:12.舍格伦综合征的病理表现：①腺体内大量淋巴细胞及组织细胞增生；②病变从小叶中心开始，向周边扩展；③病变严重时腺泡消失，形成滤泡，但腺小叶轮廓清楚；④腺小叶内缺乏纤维结缔组织修复；⑤小叶内导管上皮增生，形成上皮岛。故选D。

13.答案：C

解析:13.脓肿切开引流的要求：①切口位置在低位，便于自然引流；②切口在瘢痕隐蔽位置，长度以保证引流通畅为准则，首选口内引流，颜面部要顺皮纹切开；③切开至黏膜下或皮下即可，血管钳钝性分离至脓腔，勿损伤重要解剖结构；④手术操作准确轻柔，严禁在危险三角挤压。故选C。

14.答案：A

解析:14.心理是人脑对客观现实的主观能动反映，主观性是指同一事物对不同人来说，由于经历不同，信念、认识不同，反映也不同。能动性指对事物不是全部反映，而是有选择的进行反映。故选A。

15.答案：B

解析:15.心身疾病是介于躯体疾病与神经症之间的一类疾病。最早提出的七种心身疾病包括：溃疡病、溃疡性结肠炎、甲状腺功能亢进、局限性肠炎、类风湿性关节炎、原发性高血压及支气管哮喘。故选B。

16.答案：C

解析:16.心理评估有5种常用方法：①调查法；②观察法；③会谈法；④作品分析法；⑤心理测验法。故选C。

17.答案：E

解析:17.尊重原则是医学伦理学的一个重要的基本原则。当患者的自主选择有可能危及其生命时，医生应积极劝导患者作出最佳选择。当患者（或家属）的自主选择与他人或社会的利益发生冲突时，医生既要履行对他人、社会的责任，也要使患者的损失降低到最低限度。故选E。

18.答案：B

解析:18.直条图用等宽直条的长和短来表示各统计量的大小，适用于彼此独立的资料互相比较。不同职业人群的人相对独立，适用于直条图统计变量。故选B。

19.答案：C

解析:19.《中华人民共和国执业医师法》第二章考试和注册第十八条规定：中止医师执业活动二年以上以及有本法第十五条规定情形消失的，申请重新执业，应当由本法第三十一条规定的机构考核合格，并依照本法第十三条的规定重新注册。故选C。

20.答案：A

解析:20.白念珠菌为一卵圆形芽生酵母样菌，在培养基、组织中和分泌物中均能产生假菌丝，假菌丝在结节处形成芽生孢子，有时在末端形成厚壁孢子。故选A。

21.答案：D

解析:21.牙齿萌出的特点有：①牙齿萌出有一定次序，萌出先后与牙胚发育的先后基本一致；②牙齿的萌出有一定的时间，但其生理范围较宽，个人差异较大；③左右同名牙大致同时出龈；④下颌牙萌出略早于上颌的同名牙；⑤最早萌出的乳牙是下颌乳中切牙，最早萌出的恒牙是下颌第一恒磨牙。故选D。

22.答案：C

解析:22.维生素PP（烟酸）是具有生物活性的全部吡啶-3-羧酸及其衍生物的总称。其能构成辅酶I（CoI）或烟酰胺二核普酸（NAD+）及辅酶II或烟酰胺二核昔酸磷酸（NADP+）。NAD+和NADP+均为不需氧脱氢酶的辅酶。故选C。

23.答案：C

解析:23.完全脱位牙 如能在30min内再植，多可避免牙根吸收。

24.答案：E

解析:24.根管充填材料的性能要求：①根管充填后有持久的消毒作用；②与根管壁能密合；③能促进根尖周病变的愈合；④根管充填后不收缩；⑤易于消毒、使用和去除；⑥不使牙变色；⑦对机体无害；⑧X线阻射，便于检查。故选E。

25.答案：B

解析:25.根尖周炎的感染途径大多数是由牙体-牙髓途径造成根尖周组织的感染，少数经由牙周病变、邻牙根尖周病变或血缘的引菌作用感染。故答案为B。

26.答案：D

解析:26.从乳牙开始萌出到20个乳牙出齐，患病率一直升高，尤其7～8岁为患齲率高峰。故选C。

27.答案：C

解析:27.高压蒸汽灭菌法适用于一般器械、生理盐水、玻璃容器及注射器、布类、纱布、棉花、橡胶及各类耐高温耐湿等物品的灭菌。但是明胶海绵、凡士林、油脂、液体石蜡和各种粉剂等物品不宜用高压蒸汽灭菌。故选C。

28.答案：C

解析:28.脑脊液耳漏提示合并中颅底骨折。Le Fort III型骨折可以形成颅面分离，伴有不同部位的颅底骨折，包括中颅底骨折，发生脑脊液耳漏。故选C。

29.答案：A

解析:29.甲状舌管囊肿是胚胎发育中甲状舌管不消失，由残存上皮分泌物聚集形成的先天性甲状舌管囊肿。故选A。

30.答案：D

解析:30.具有局部浸润性生长的肿瘤主要是指恶性肿瘤，但也有肿瘤生物学行为介于良性和恶性之间，具有恶性倾向可转变为恶性肿瘤，称为“临界瘤”，如成釉细胞瘤、多形性腺瘤，故选D。

31.答案：B

解析:31.嵌体按覆盖的牙面不同，可分为单面嵌体、双面嵌体和多面嵌体。双面嵌体具体可以叫做近中（牙合）嵌体（MO嵌体）、远中（牙合）嵌体（DO嵌体）、颊（牙合）嵌体（BO嵌体）、舌（牙合）嵌体（LO嵌体），C为单面嵌体，D的设计方案不符合嵌体的洞型要求，E高嵌体亦为多面嵌体。故选B。

32.答案：B

解析:32.开口初期或开口初、闭口末弹响是可复性关节盘前移位的主要症状，其机制是关闭口关节盘前移位，在开口运动的初期，髁突撞击关节盘后带的后缘，关节盘向后反跳，从而恢复正常的髁突—关节盘的结构关系，形成开口初的弹响。故选B。

33.答案：E

解析:33.牙囊起源于外胚间充质，是包绕在成釉器外围的一层致密的结缔组织，在牙齿发育及萌出过程中，牙囊细胞在上皮根鞘及牙乳头细胞的诱导下分化形成牙骨质细胞、成纤维细胞及成骨细胞，分泌牙骨

质、胶原纤维、骨基质，最终形成牙周组织。所以牙发育时，X线片上最先出现的是圆形密度低的牙囊影。故选E。

34.答案：C

解析:34.乳牙的临床牙位表示：A：乳中切牙；B：乳侧切牙；C：乳尖牙；D：第一乳磨牙；E：第二乳磨牙。乳牙的萌出顺序为：乳中切牙（6～8个月），乳侧切牙（8～10个月），第一乳磨牙（12～16个月），乳尖牙（16～20个月），第二乳磨牙（20～24个月），可表示为ABDCE。故选C

35.答案：A

解析:35.酶的催化作用实质为降低化学反应活化能，从而起到催化化学反应的作用，加快化学反应的速度，提高化学反应的效率。故选A。

36.答案：E

解析:36.间接盖髓术的适应证为：深龋引起的可复性牙髓炎、外伤冠折或牙体预备后的大面积牙本质暴露。

37.答案：D

解析:37.根尖周囊肿生长很慢，多无自觉症状，牙体变色、呈深灰色，牙体无光泽。根尖部的龈黏膜呈半球形隆起，手压时像有乒乓球感，有弹性；根管内可溢出黄色清亮液体。囊肿压迫邻近牙时，有松动或移动。X线片上可见到根尖有较大的圆形透明区，边界清楚，周围骨质有一圈致密骨白线围绕。故选D。

38.答案：C

解析:38.局限性青少年牙周炎主要发生于青春期至25岁的青少年，早期无明显症状，女性多于男性；有家族聚集性早期患者的菌斑、牙石量很少，牙龈炎症轻微；好发牙位为第一恒磨牙和上下切牙；X线片上发现局限性的、深的垂直骨吸收，故选C。

39.答案：D

解析:39.将刮治器工作面与根面平行（0°角），缓缓放入袋底牙石基部，然后改变洁治器角度，使工作面与牙根面呈45°～90°角，以80°为最佳。故选D。

40.答案：A

解析:40.儿童的乳尖牙退换时间较晚，龋坏应尽量治疗，过早拔除，其他牙齿占据位置，会造成尖牙异位萌出。故选A。

41.答案：A

解析:41.以上五种局麻药中丁卡因的穿透性和扩散性最强，且麻醉作用也较强，因此在临床上常用1%～2%丁卡因进行表面麻醉。故选A。

42.答案：D

解析:42.两条牙尖嵴相交成钝角。

43.答案：C

解析:43.近中面有近中沟的牙是上颌第一前磨牙。

44.答案：C

解析:44.硬腭的表面解剖标志：腭中缝、切牙乳头（腭乳头）、腭皱襞、腭大孔和蝶骨翼突钩。

45.答案：C

解析:45.正常成人每天的唾液分泌量为1000～1500ml。

46.答案：A

解析:46.无应答偏倚实际就是漏查。在随机抽样时，属于样本人群中的受检者，由于主观或客观原因未能接受检查属于无应答偏倚。

47.答案：C

解析:47.龋均是指受检查人群中每个人口腔中平均龋、失、补牙数。

48.答案：D

解析:48.社区口腔卫生服务任务：①提高人群口腔健康水平、改善生活质量。②提供口腔卫生服务、满足社区居民日益增长的口腔卫生服务要求。③营造口腔健康社区。④保证区域卫生规格的实施、保证医疗卫生体制改革和城镇职工基本医疗保险制度改革的实施。⑤完善社区口腔卫生服务机构的功能。

49.答案：A

解析:49.属于全身应用氟化物防龋措施的是饮水氟化。

50.答案：E

解析:50.口腔促进的领域中有：①制定健康的公共政策；②创建支持性环境；③强化社区行动；④调整卫生服务方向；⑤发展个人技能。

51.答案：D

解析:51.预真空高温高压灭菌法是最有效的牙科手机消毒灭菌方法。

52.答案：D

解析:52.低甜度的糖代用品是木糖醇。

53.答案：A

解析:53.牙周膜的功能包括：①支持功能；②感觉功能；③营养功能；④形成功能。其中，支持功能起连接牙和牙槽骨，将牙固定在牙槽窝中，缓冲外力的冲击，保护牙组织免受外力损害的作用。

54.答案：D

解析:54.分泌管与闰管相延续。管径较粗，管壁由单层柱状上皮所组成。核圆形，位于细胞中央或近基底部。胞质丰富，呈强嗜酸性。在基底部有垂直于基底面的纵纹，所以分泌管又称纹管。

55.答案：D

解析:55.牙本质龋病变分为透明层、脱矿层、细菌侵入层、坏死崩解层。细菌侵入层位于脱矿层的表面，细菌侵入小管后并繁殖，小管扩张形成串珠状，而后小管破裂。管间牙本质脱矿，收缩，小管相互融合形成大小不等的坏死灶和裂隙。

56.答案：E

解析:56.根尖周肉芽肿中增生的上皮绝大多数来源于Malassez上皮剩余。

57.答案：B

解析:57.在下颌体正中联合两旁近下颌骨下缘处，左右各有一隆起称颏结节。从颏结节经颏孔之下向后上与下颌支前缘相连的骨嵴，称外斜线或外斜嵴，有降下唇肌及降口角肌附着，外斜线之下，有颈阔肌附着。

58.答案：D

解析:58.门（急）诊病历由医疗机构保管的，保存时间自患者最后一次就诊之日起不少于15年；住院病历保存时间自患者最后一次住院出院之日起不少于30年。

59.答案：D

解析:59.根尖分叉病变分为以下四度：I度；从牙周袋内能探到根分叉的外形，但不能水平探入分叉内，X线片上看不到改变。II度；根分叉区的骨质吸收仅限于颊或舌侧，但未相通，X线片显示此区仅有牙周膜增宽，或骨质密度降低。III度；病变波及整个根分叉区，根尖牙槽骨全部吸收，探针可通过，但仍有牙龈覆盖。X线片可见该区骨质消失呈透射区。IV度；根间骨隔完全破坏，且牙龈退缩而使病变的根分叉区完全开放而能直视。X线片所见与III度相似。

60.答案：C

解析:60.理解记忆，聚合度过大不会引起全冠翘动。

61.答案：C

解析:61.暂时冠的粘固应使用专用的暂时粘固剂，既要保证在戴用期间不松动脱落，又要方便在正式修复体试戴前取下。常用的暂时粘固剂是氧化锌丁香油水门汀，丁香油酚对牙髓有很好的安抚作用，可避免牙本质敏感。但丁香油酚会阻碍树脂粘接剂的聚合，如果需要用树脂粘接剂粘固正式修复体，就需要选择不含丁香油的暂时粘固剂。

62.答案：D

解析:62.自由联想是精神分析学派的治疗手段。其他都是行为疗法。故本题答案是D。易误选C。

63.答案：B

解析:63.固定义齿对于基牙的牙周储备力要求较高。

64.答案：D

解析:64.口腔桥体分类：（1）接触式桥体；桥体的龈端与牙槽嵴黏膜接触，便于恢复缺失牙的颈部边缘外形，也有利于恢复发音功能，为临床常采用的一种桥体形式。当固定桥行使咀嚼功能时，桥体随基牙的生理性动度对牙槽嵴黏膜起到按摩作用，有利于黏膜组织健康，部分（牙合）力经桥体龈端传递于牙槽嵴，减缓牙槽嵴吸收。①盖嵴式桥体：桥体龈端与牙槽嵴唇颊侧黏膜的一小部分呈线性接触。与牙槽嵴接触面积小，自洁作用好，适用于上前牙牙槽嵴吸收较多者。②改良盖嵴式桥体：将盖嵴式桥体龈端向舌侧延伸，使唇颊侧接触区扩展至牙槽嵴顶。可防止食物进入龈端，自洁作用好，患者感觉舒适，上下颌固定桥均可使用。③鞍式桥体：桥体龈端骑跨在牙槽嵴顶上，与牙槽嵴接触面积大，自洁作用差。④改良鞍式桥体：桥体唇颊侧龈端与牙槽嵴顶接触，颈缘线位置与邻牙协调一致，符合美观要求。桥体龈端舌侧部分缩窄，尽量扩大舌侧邻间隙，减小龈端舌侧与牙槽嵴顶的接触面积。外形近似天然牙，美观，舒适，自洁作用好。是一种应用较多的较理想的桥体形式。⑤船底式桥体：桥体龈端呈船底式与牙槽嵴顶接触，接触

面积最小，容易清洁。但桥体下部唇颊舌侧与牙槽嵴间的三角间隙很容易滞留食物。只用于下颌牙槽嵴狭窄的病例。（2）悬空式桥体：桥体与黏膜不接触，留有至少3mm以上的间隙，此间隙便于食物通过而不积聚，有较好的自洁作用，又称为卫生桥。但悬空式桥体与天然牙的形态差异大，仅适用于后牙缺失且缺牙区牙槽嵴吸收明显的修复病例。

65.答案：B

解析:65.牙列缺损的Kennedy分类：第一类，双侧缺隙位于余留牙的远中，即双侧远中游离缺失。

66.答案：D

解析:66.牙列缺损的Kennedy分类：第一类，双侧缺隙位于余留牙的远中，即双侧远中游离缺失。第二类，单侧缺隙位于一侧余留牙的远中，即单侧远中游离缺失。第三类，缺隙位于牙弓一侧，缺隙前后均有余留牙，即单侧非游离缺失。第四类，单个越过中线的缺隙，位于所有余留牙的近中。

67.答案：A

解析:67.RPI卡环组的优点：①义齿受力后，I杆离开牙面，邻面板也移向倒凹区，可以减小对基牙的扭力；②近中（牙合）支托的小连接体和邻面板，可保证必需的对抗作用，因此不需舌侧对抗臂，患者感觉舒适，舌面龈组织没有基托覆盖，可受到生理性刺激；③I型卡环臂与牙的接触面小，美观，产生龋病和牙周病的机会少；④义齿受力时，近中（牙合）支托对基牙的扭力比远中（牙合）支托小，对基牙的远中龈组织不产生挤压作用。

68.答案：B

解析:68.可摘局部义齿腭（舌）侧基托边缘应与余留天然牙邻面和舌面非倒凹区接触。

69.答案：D

解析:69.基托后缘应止于硬软腭交界处的软腭上，此区黏膜组织有弹性，基托边缘可在此区稍加压，以加强后缘的封闭作用，后缘两侧应伸展到翼上颌切迹。

70.答案：B

解析:70.上颌前牙排列在正中关系时应是浅覆（牙合），浅覆盖，上下前牙不接触。

71.答案：C

解析:71.人工后牙排列时后牙功能尖要尽量排在牙槽嵴顶上，（牙合）力沿垂直方向传至牙槽嵴。如果牙槽嵴吸收较多，要根据牙槽嵴斜坡倾斜方向调整后牙倾斜度，使（牙合）力尽可能以垂直方向传至牙槽嵴。如果牙槽嵴严重吸收，则要注意将（牙合）力最大处放在牙槽嵴最低处，减少义齿在功能状态下的翘动。

72.答案：B

解析:72.NAD+为传递氢原子和电子的辅酶，参与氧化还原反应，可作为多数脱氢酶的辅酶。

73.答案：B

解析:73.核糖体RNA是细胞内含量最丰富的RNA，约占细胞总RNA的80%以上。故选B。

74.答案：A

解析:74.呋塞米为高效利尿药，静脉注射本药后能迅速扩张容量血管，减少回心血量。在利尿作用发挥之前即可缓解急性肺水肿，是急性肺水肿的迅速有效治疗手段之一。

75.答案：D

解析:75.多巴胺除能直接激动心脏β受体，增强心肌收缩力，增加心排出量外，尚能选择性激动血管平滑肌的多巴胺受体，引起肾血管和肠系膜血管扩张，增加肾血流量和肾小球滤过率，使尿量增加。

76.答案：D

解析:76.肝素的临床应用：①肝素是需要迅速达到抗凝作用的首选药物，可用于外科预防血栓形成以及妊娠者的抗凝治疗。对于急性心肌梗死患者，可用肝素预防患者发生静脉栓塞病，并可预防大块的前壁透壁性心肌梗死患者发生动脉栓塞等。②肝素的另一重要临床应用是在心脏、手术和肾脏透析时维持血液体外循环畅通。③用于治疗各种原因引起的弥散性血管内凝血（DIC），也用于治疗肾小球肾炎、肾病综合征、类风湿性关节炎等。

77.答案：D

解析:77.医学心理学基本观点：心身统一的观点、社会影响的观点、认知评价的观点、主动调节的观点、情绪作用的观点、个性特征的观点。

78.答案：C

解析:78.对乙类传染病中传染性非典型肺炎、炭疽中的肺炭疽和人感染高致病性禽流感，采取甲类传染病的预防、控制措施。

79.答案：D

解析:79.医疗机构发现可能与用药有关的严重不良反应，必须及时报告。有权接受其报的单位是药品监督管理部门和卫生计生行政部门。

80.答案：A

解析:80.本题考查的是医疗行为。医务人员就医疗行为进行说明的首选对象是患者本人。

81.答案：C

解析:81.增强CT可以显示某些软组织结构所出现的不同密度变化。因此，该患者最好还应该进行增强CT检查，其他检查效果均没有该方法好。故选C。

82.答案：D

解析:82.WHO对12岁儿童患龋水平高低的衡量标准：龋均（DMFT）0～1.1，流行等级很低；1.2～2.6，流行等级低；2.7～4.4，流行等级中；4.5～6.5，流行等级高；6.6以上，流行等级很高。该地区

12岁儿童DMFT为4.8，流行等级为高，故选D。

83.答案：B

解析:83.牙隐裂又称不全牙裂或牙微裂，指牙冠表面的非生理性细小裂纹，常不易被发现。表浅的隐裂常无明显症状，较深时则遇冷热刺激敏感，或有咬合时不适感，并出现定点性咀嚼剧痛。该患者出现上述症状且未能发现患牙有深的龋洞或深的牙周袋，牙面上探不到过敏点，应考虑牙隐裂存在。故选B。

84.答案：B

解析:84.患者颌面部创伤后，有昏迷史，故主要考虑颅内组织的损伤。昏迷后一度清醒，随后又昏迷，伤侧瞳孔散大，对光反射消失，呼吸脉搏变慢是硬脑膜外血肿表现，与题干叙述情况基本吻合，故考虑是颅内出血，选B。

85.答案：C

解析:85.深龋的治疗原则：①停止龋病发展，促进牙髓的防龋性反应。②保护牙髓；备洞尽量减少产热，应有冷却；以球钻作间断磨除，不向洞底加压；深洞

行双层垫底；洞底可保留脱矿软化牙本质。③正确判断牙髓状况，是深龋治疗成功的基础。安抚治疗：备洞时，洞深近髓角较敏感者选用氧化锌丁香油糊剂充填，观察1～2周，无症状才做永久性充填。故选C。

86.答案：D

解析:86.该患者做了充填治疗后一直食物嵌塞，并出现疼痛和牙龈出血，首先考虑充填体与邻牙接触点恢复不良，在牙齿之间形成缝隙，或接触点位置不对，这样造成的垂直嵌塞，食物嵌塞压迫刺激牙龈。故选D。

87.答案：A

解析:87.最常见的、发病率最高的是慢性单纯性龈炎，即边缘性龈炎，表现为：龈缘充血发红、肿胀、松软，触之可出血；龈缘变厚，牙间乳头变为钝圆，与牙面不紧贴，而且龈沟加深；只侵犯牙龈组织，不侵犯其他牙周组织，因而牙齿不发生松动。X线片检查无异常。该患者可诊断为边缘性龈炎。故选A。

88.答案：C

解析:88.牙周组织与牙髓组织间存在着以下的交通途径：①根尖孔；②根管侧支：由深牙周袋内的细菌、毒素通过根尖1/3处的根管侧支进入牙髓；③牙本质小管。通过以上三种途径，二者的感染和病变可以相互影响和扩散。故选C。

89.答案：D

解析:89.牙外伤治疗前的X线片对于诊断和治疗方案选择非常重要；对外伤牙摄X线牙片，确认患牙有无根折及根折部位、移位和牙槽有无损伤。故选D。

90.答案：B

解析:90.拔牙后血凝块充满拔牙创口，有保护创口、防止感染的作用，A、C和D的处理虽然可以保护牙根间隔，但是没有被血液淹没，创口愈合缓慢，故不正确。不做处理，易使牙根间隔骨质发生感染，故E不正确。咬除根间隔可以彻底解决血液未充盈的问题，并且可以避免日后再进行牙槽嵴修整的可能，B项正确。故选B。

91.答案：D

解析:91.以上五个选项，触诊时均感觉质软有压缩感，都可能有较长的病史，且生长缓慢，但是只有海绵状血管瘤具有体位移动试验阳性的特点，即肿物体积的大小可随体位改变而发生变化。故选D。

92.答案：B

解析:92.硅橡胶印模材料是目前印模质量最佳的一种材料，适用于各种义齿修复印模，由于其价格较高，目前临床上多用于精密铸造和高档次义齿修复时的使用。故选B。

93.答案：B

解析:93.患者在戴金属全冠粘固后一个月，咀嚼时出现咬合痛。应检查牙松动度确定是否是创伤性牙周炎或根尖周炎。故选B。

94.答案：E

解析:94.本例中最可能的原因为上颌硬区未做缓冲而造成的，因此首选的方法是基托组织面相应处缓冲，故选E。

95.答案：D

解析:95.慢性增生性牙髓炎又称牙髓息肉，多见于青少年患者，一般无自发痛；可以定位患牙，有进食疼痛；深龋洞内检查感觉较迟钝；患牙大而深的龋洞中有红色的牙髓息肉，探之无痛，但极易出血；由于长期废用，常可见患牙及其邻牙有大量牙石堆积。该患者症状与上述表现符合，可以诊断为该病症。故选D。

96.答案：D

解析:96.考点为白斑的临床表现。从临床表现是单独发生在牙龈的白色斑块来看，可首先排除答案E；白色角化病病损附近应有机械摩擦刺激物，本题题干中未提及，因而排除A；颗粒状白斑发生在充血发红的黏膜上，本题未提及，可排除C；选项B均质型白斑无表面小结节，不符合本题描述，可排除；应选D为

答案。

97.答案：A

解析:97.临床上以面神经主干和分支平面为界，将腮腺分为浅、深两叶。腮腺浅叶上缘神经血管的排列：从后向前依次为颞浅静脉、耳颞神经、颞浅动脉、面神经颞支及颧支。

98.答案：C

解析:98.乙肝病毒在口腔临床中的传播方式主要是接触传播，通过直接接触患者的血液、唾液、龈沟液以及接触被污染的环境都可能感染疾病。故最危险途径为C。

99.答案：C

解析:99.慢性根尖周脓肿部分患者有咀嚼不适或咀嚼痛；有瘘管形成者可见患者相对应的皮肤或龈黏膜上有红色肉芽状外观的瘘管口；X线片示根尖周呈现边界模糊不清的不规则透射区，其周围骨质较疏松而呈云雾状；镜下观察，根尖区牙周膜内脓肿形成，脓肿中央为坏死液化组织和脓细胞，周围为炎性肉芽组

织，其中散在炎细胞浸润，并可见新生毛细血管；根尖部牙槽骨和牙骨质呈现不同程度的吸收破坏。

100.答案：E

解析:100.慢性盘状红斑狼疮是一种自身免疫性疾病，发生在口腔颌面部，是狼疮病中最轻的一个亚型，为皮肤黏膜病，很少累及内脏器官，好发于女性。临床主要发生于口颊部的皮肤与黏膜。面部蝴蝶斑或圆形红斑，皮肤呈鲜红色斑，上面覆盖白色鳞屑。揭去鳞屑，可见扩张的毛囊。在鳞屑内面可见呈棘状突起的角质栓塞。唇颊黏膜为红斑样病损，糜烂、出血，唇红部可出现结痂。结痂常为瘢痕性愈合，周围出现白色放射状条纹。上皮表面过度角化或不全角化，上皮棘层萎缩，基底细胞液化变性，毛细血管扩张，血管外类纤维蛋白沉积。基底膜增厚，出现狼疮带。

101.答案：D

解析:101.由于患者为4缺失，且大面积银汞充填，故D选项为最佳选项。

102.答案：C

解析:102.冠戴入后自发性疼痛原因：(1)其常见原因为牙髓炎、金属微电流刺激和根尖炎或牙周炎。(2)由于牙体切割过多，粘固前未戴暂时冠做牙髓安抚治疗，牙髓受刺激由充血发展为牙髓炎。(3)修复体戴用一段时间后出现的自发性疼痛，多见于继发龋引起的牙髓炎。(4)由于修复前根管治疗不完善，根尖周炎未完全控制。(5)根管侧壁钻穿未完全消除炎症。(6)咬合创伤引起的牙周炎。综上所述，患者双尖牙为活髓，戴入已两天最有可能为牙髓炎。

103.答案：B

解析:103.为了固位、美观，保证修复体边缘强度、牙周组织健康、冠边缘的封闭，所以要预备肩台。所以说B选项最符合题目要求。桩的长度：为确保牙髓治疗效果和预防根折，一般要求根尖部保留3～5mm的充填材料，桩的长度为根长的2/3～3/4。对于根比较短的情况，应保证让桩的长度大于等于临床冠的长度，并且保证桩处于牙槽骨内的长度大于根在牙槽骨内的总长度的1/2。D选项中提到“在不引起根管侧穿的情况下，尽可能争取较长的冠桩长度”，为了加强义齿的稳定性，尽可能争取较长的冠长度是正确的。

虽有干扰，但出题人的意图很明确，重在考查桩冠修复时肩台的要求。

104.答案：C

解析:104.题干提示前牙牙冠变色，已做根管治疗，因此考虑桩核烤瓷冠。根疗牙做桩可以增加抗力性，防止修复后使用中应力过大导致冠折。桩核烤瓷冠适应证(经过完善的根管治疗后)（1）牙冠大部分缺损无法充填治疗或做全冠修复固位不良者。（2）牙冠缺损至龈下，牙周健康，牙根有足够的长度，经龈切除术后能暴露缺损面者。（3）前牙横形冠折，断面在牙槽嵴以上者，或斜折到牙槽嵴以下，行牙槽突切除术。残根尚有足够的长度和牙槽骨支持者。（4）前牙错位牙、扭转牙没有条件做正畸治疗者。（5）牙冠短小的变色牙、畸形牙不能做全冠修复者。（6）作固定义齿的固位体的残冠残根。（7）根管充填后选择桩冠修复的时间参考治疗情况和全身状况而定。

105.答案：D

解析:105.这种应对应激的方式为取得社会支持以解

决问题。

106.答案：A

解析:106.患者的隐私权是指患者拥有保护自身的隐私部位、病史、身体缺陷、特殊经历、遭遇等隐私，不受任何形式的外来侵犯的权利。

A3型题

107.答案：DCB

解析:（107～109）.牙髓活力温度测验是根据患牙对冷或热刺激的反应来检查牙髓状态的方法；急性牙髓炎患者，患者不能定位患牙，温度测验时患牙的反应极其敏感，刺激去除后，疼痛症状要持续一段时间，为确定牙位，此时应行温度测试，故110题选D。急性牙髓炎剧烈疼痛，疼痛性质具有下列特点：①自发性阵发性痛；②夜间痛；③温度刺激加剧疼痛；④疼痛不能自行定位。患牙可查及极近髓腔的深龋或其他牙体硬组织疾患，或见牙冠有充填体存在，或有深牙周袋。探诊常可引起剧烈疼痛，有时可探及微小穿髓孔。该患者为自发性疼痛，夜间痛和温度刺激疼痛明显，不能定位，检查见龋洞，诊断首先考虑急性牙髓炎。故111题选C。选择性麻醉是通过局部麻醉的方

法来判定引起疼痛的患牙；当其他诊断方法对两颗可疑患牙不能作出最后鉴别，且两颗牙分别位于上、下颌或该两颗牙均在上颌但不相邻，采用选择性麻醉可确诊患牙。故112题选B。

108.答案：EC

解析:（110～111）.牙周脓肿诊断要点：①有牙周病病史；②患牙持续性胀痛、跳痛、咀嚼痛；③患牙松动，有深牙周袋，叩痛（+），牙髓测试有活力；④龈组织近龈缘处呈半球形隆起，脓肿局限。该患者牙龈肿胀，有波动感，热测反应无异常，有深牙周袋，首选考虑发生牙周脓肿。故113题选E。急性牙周脓肿的应急处理：①扩开牙周袋口，行牙周袋引流；②局麻下切开脓肿，放置橡皮条引流或消炎药条；③酌情给予消炎止痛药及含漱剂。故114题选C。

109.答案：CC

解析:（112～113）.晕厥的症状主要有头晕、恶心、胸闷，以及血压下降，符合题意，故115题选C。一旦发生晕厥，应急处理包括停止注射，放平座椅，置病员于头低位；松解衣领，保持呼吸通畅；酒精或氨水刺激呼吸；针刺人中穴；氧气吸入和静脉注射高渗

葡萄糖。故116题选C。

110.答案：BE

解析:（114～115）.下颌阻生智齿冠周炎多发生于年轻人，尤以18～30岁最多见；炎症早期，一般无明显全身反应，患者自觉患区胀痛不适，咀嚼、吞咽、张口活动时疼痛加剧，检查可见阻生牙和磨牙后区肿胀、冠周袋内有脓性分泌物；炎症进一步发展，累及咬肌和翼内肌，出现下颌角区肿胀，伴有不同程度的张口受限甚至不能开口。该患者的症状符合急性冠周炎的特点。故114题选B。智齿冠周炎的局部治疗可每日用3%的过氧化氢溶液及生理盐水冲洗盲袋，然后点入3%碘甘油；如脓腔形成，可切开引流。该患者远中盲袋有少量脓液溢出，故应予以冲洗盲袋和引流，故115题选E。

111.答案：BE

解析:（116～117）.幼儿年龄小，无法独立完成刷牙。氟滴剂是一种含氟的溶液，适用于2岁以下的幼儿。每日睡前将氟滴剂滴于幼儿颊黏膜或舌部，不漱口、不饮水，可获得全身和局部的双重作用。

112.答案：CC

解析:（118～119）.中位数是指将一组观察值从小到大排序后居于中间位置的那个数值。是用来描述集中趋势的指标。标准差是用来说明一组观察值之间的变异程度，即离散度。

113.答案：CC

解析:（120～121）.该学校短时间内突然发生许多同类传染病病例的现象为传染病暴发。抑制甲肝疫情措施：早期发现患者并予以隔离，患者隔离后对其住室及活动地方进行终末消毒。加强水源、饮食、粪便管理。尤其要管理好甲型肝炎患者粪便，可控制甲型肝炎流行。对共用餐具、饮水器具均应消毒，实行分餐制。养成餐前便后洗手的良好习惯。开展甲型肝炎健康教育。对有与甲型肝炎密切接触的易感者，可用人血丙种球蛋白或人胎盘丙种球蛋白进行预防注射。

B1型题

114.答案：DBA

解析:（122～124）.下颌运动有四个制约因素：右侧颞下颌关节、左侧颞下颌关节、（牙合）、神经肌肉

结构。受到这些因素的影响，正常下颌较链开口度为18～25mm，下颌最大前伸范围是8～10mm，下颌功能性前伸范围是3mm。

115.答案：ABC

解析:（125～127）.以下口腔检查器械的用途：A牙周探针：用于探测牙周袋；故118题选A；B尖探针：辅助发现牙体缺损，探查龋洞、探测患区的感觉、发现敏感部位，探测牙石部位；136题选B；C洁治器：清除龈上牙石；D刮治器：清除龈下牙石；E骨锉：修整骨面，137题选C。

116.答案：BD

解析:（128～129）.膜性口炎又称球菌性口炎，病原体主要是金黄色葡萄球菌、草绿色链球菌、溶血性链球菌和肺炎双球菌等常驻细菌，故138题选B；鹅口疮又名雪口病，是白色念珠菌感染所引起，故139题选D。

117.答案：CAB

解析:（130～132）.腭大孔麻醉时，若注射点的位置

过于靠后，将使患者出现恶心、干呕等不适症状，故140题选C。暂时性面瘫常发生在下牙槽神经阻滞麻醉中，因注射麻药麻醉面神经引起，故141题选A。翼静脉丛血肿常出现在上颌结节麻醉之后，是注射器刺破翼静脉丛引起，故142题选B。

118.答案：BC

解析:（133～134）.唇裂患者应该早期进行手术，以便尽早恢复上唇的正常功能和外形，并减少瘢痕组织，单侧唇裂整复术最合适的年龄为3～6个月，体重达6～7kg以上，故143题选B；双侧唇裂整复术比单侧复杂，手术时间长、出血多，一般宜在6～12个月时施行手术，故144题选C。

119.答案：BC

解析:（135～136）.无牙颌共分为主承托区、副承托区、边缘封闭区和缓冲区。A属于主承托区；B属于副承托区，故145题选B；C属于边缘封闭区，故146题选C；D、E属于缓冲区。

120.答案：EB

解析:（137～138）.为了尽早预防龋病，2岁以下儿童最好用氟滴剂给幼儿补充氟化物，每日睡前将氟滴剂滴于幼儿颊黏膜或舌部，不漱口，不饮水，可获得全身和局部的双重作用。饮用水加氟是任何一项完善的龋病预防项目的基石，不仅因为它是减少龋病的最有效的措施，而且因为它不要求个体的依从性，成为最符合成本效益、经济、便捷地向大众提供氟化物防龋益处的可靠手段。

121.答案：BCB

解析:（139～141）.结核分枝杆菌主要通过空气-呼吸道传播，也可经食物传播、母婴垂直传播。卡波西肉瘤（KS）又称多发性出血性肉瘤，是一种少见的多中心性血管肿瘤。HIV感染可刺激卡波西肉瘤细胞生长，促使卡波西肉瘤的发生。结核杆菌有耐低温的特点，低温不能灭菌而能保存细菌，但菌悬液中的结核杆菌加温至60°C持续10～30分钟、加温至95°C持续5分钟均可杀死。

122.答案：BA

解析:（142～143）.上皮浅层破坏，未侵犯上皮全层叫糜烂，可由机械刺激引起，也可继发于水疱破溃之

后，如疱疹。糜烂面一般鲜红，表面平滑而湿润，可有疼痛。黏膜或皮肤内贮存液体而成疱。疱的内容物有浆液（水疱）、血液（血疱）及脓液（脓疱）。疱突出于黏膜，表面呈半圆形，周围有的有红晕。疱的大小不一，小的肉眼仅可看出，大的如豌豆般大或更大一些，也可相互融合在一起，一般直径超过5mm者称大疱。小的水疱直径在1～3mm左右，若聚集成簇，称为疱疹。

123.答案：EBD

解析:（144～146）.黏液表皮样癌是由黏液细胞、中间细胞和表皮样细胞构成的恶性唾液腺上皮性肿瘤。牙瘤是成牙组织的错构瘤或发育畸形，不是真性肿瘤。肿物内含有成熟的牙釉质、牙本质、牙骨质和牙髓组织。鳞状细胞癌表皮角化，肿瘤由鳞状上皮细胞团块所组成，不规则地向真皮内浸润，棘细胞呈瘤性增生、呈条索状或巢状细胞团，中心部有角化性癌珠，在癌细胞团内有很多分裂象，周围淋巴细胞和浆细胞浸润。

124.答案：AB

解析:（147～148）.鞍式桥体：桥体龈端骑跨在牙槽

嵴顶上，与牙槽嵴接触面积大，自洁作用差。悬空式桥体：桥体与黏膜不接触，留有至少3mm以上的间隙，此间隙便于食物通过而不积聚，有较好的自洁作用，又称为卫生桥。但悬空式桥体与天然牙的形态差异大，仅适用于后牙缺失且缺牙区牙槽嵴吸收明显的修复病例。

125.答案：BE

解析:（149～150）.地西泮治疗：焦虑症及各种功能性神经症。可与其他抗癫痫药合用，治疗癫痫大发作或小发作。控制癫痫持续状态时应静脉注。各种原因引起的惊厥。脑血管意外或脊髓损伤性中枢性肌强直或腰肌劳损、内镜检查等所致肌肉痉挛等。氯丙嗪临床应用：精神分裂、呕吐和顽固性呃逆、低温麻醉人工冬眠。

上一节解析
下一节解析