



微信搜一搜



金英杰口腔学院

2021年执业医师考试

绝密押题卷<sup>®</sup>

2021年

医师资格考试专用



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



1.恒牙列中，牙齿患龋率最高的是

A.上颌第一磨牙

B.上颌第二磨牙

C.上颌前磨牙

D.下颌第一磨牙

E.下颌第二磨牙

答案：D

解析：

2.牙面获得性膜形成后，最初附着于牙面的

细菌主要是

A.黏性放线菌

B.变异链球菌

C.唾液链球菌

D.血链球菌

E.轻链球菌

答案：D

解析：

3.有关龋病病因学说中最为公认的是

A.内源性理论

B.外源性学说

C.蛋白溶解学说

D.Miller 化学细菌学说

E.四联因素理论

答案：E

解析：

4.G.V.Black 窝洞分类考虑的充填材料是

A.复合体

B.银汞合金

C.复合树脂

D.磷酸锌粘固剂

E.玻璃离子粘固剂

答案：B

解析：

5.复合树脂充填洞形制备特点是

A.底平壁直，洞形必须达到一定的深度

B.点线角应圆滑，洞缘角应制备短斜面

C.应制备典型的箱状洞，并设计良好的固位

形

D.洞缘角应呈直角，不宜在洞缘角制备短斜

面，需去净无基釉



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



E.必须去净无基釉

B.10%-15%磷酸

答案：B

C.30%-50%磷酸

解析：复合树脂修复的牙体预备有以下特

D.30%-50%醋酸

点：①外形保守，较少扩展；②轴壁和髓壁的

E.10%~15%醋酸

深度根据病损深度而定，没有统一深度；③

答案：C

需要预备釉质斜面；④可使用金钢砂钻，预

解析：

备后的洞壁较粗糙。其余选项是银汞合金充

填洞形的制备特点，因为银汞合金是通过机

8.以下不是氟牙症临床表现的是

械固位，窝洞必须具有良好的固位形和抗力

A.常分为白垩型、着色型和缺损型 3 种类型

形。

B.同一时期萌出牙的牙釉质上有白垩色到

褐色的斑块，严重者还并发牙釉质的实质缺

6.关于牙根纵裂定义说法不正确的是

损

A.发生于牙根

C.多见于恒牙，发生在乳牙者甚少，程度也

B.平行于牙长轴

较轻

C.常发生于磨牙腭根

D.白垩色斑的边界比较明确，其纹线与牙釉

D.由根尖向冠方的纵向裂纹

质的生长发育线相平行吻合

E.多见于牙髓治疗后的牙齿

E.对摩擦的耐受性差，但对酸的抵抗力强

答案：C

答案：D

解析：

解析：

7.临床常用的酸蚀剂是

9.牙内陷最轻的一种类型为

A.10%-30%枸橼酸

A.畸形舌侧窝





B.畸形根面沟

答案：D

C.畸形舌侧沟

解析：

D.牙中牙

E.畸形中央尖

12.下列与牙咀嚼磨损程度壁的是

答案：A

A.牙齿的硬度

解析：

B.食物的硬度

10.牙内陷多见于

C.咀嚼习惯

A.上颌中切牙

D.咀嚼肌张力

B.下颌中切牙

E.唾液 pH

C.上颌尖牙

答案：E

D.下颌侧切牙

解析：

E.上颌侧切牙

13.有关牙根纵裂病因描述不正确的是

答案：E

A.无髓牙

解析：

B.过度根管预备

11.临床检查牙本质敏感症的主要方法是

C.根充压力大

A.冷刺激

D.牙根发育缺陷

B.热刺激

E.刷牙不当

C.酸、甜刺激

答案：E

D.尖锐探针探查

解析：

E.电活力测试

14.残髓炎的诊断要点是



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



A.有牙髓治疗史

C.创伤

B.长期牙周炎病史

D.充填材料

C.无自觉症状

E.激光

D.X线片显示髓腔内有局限性不规则的膨大

答案：D

区域

解析：充填材料不是引起牙髓病、根尖周病

E.X线片显示髓腔内有阻射的钙化物

的物理因素，而当窝洞充填物过高时引起的

答案：A

咬合创伤会引起牙髓病或根尖周病。

解析：

17.急性根尖周炎按其发展进程可分为

15.炎症牙髓中可以分离到的细菌不包括

A.化脓性根尖周炎和根尖周致密性骨炎

A.链球菌

B.浆液性根尖周炎和根尖周囊肿

B.放线菌

C.浆液性根尖周炎和化脓性根尖周炎

C.乳杆菌

D.根尖周脓肿和根尖周肉芽肿

D.G<sup>+</sup>杆菌

E.根尖周脓肿和根尖周囊肿

E.葡萄球菌

答案：C

答案：E

解析：

解析：

18.有关盖髓剂应具备的性质，不正确的是

16.下列不是牙髓病、根尖周病致病的物理

A.能促进牙髓组织再修复能力

因素的是

B.有较好的组织相容性

A.温度

C.对牙髓组织无毒性、无渗透性

B.电流刺激

D.有杀菌或抑菌作用



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



E.有消炎作用，药效持久稳定

解析：

答案：C

解析：

21.使用次氯酸钠作为根管冲洗剂，下列错

误的是

19.关于根尖周脓肿切开引流说法错误的是

A.有杀菌作用

A.局部应有明显波动感

B.可润滑根管器械

B.可用表面麻醉剂

C.可溶解坏死组织

C.脓肿位置深，可放置引流条

D.有螯合作用

D.患牙髓腔开放引流

E.浓度为 2%-5.25%

E.最佳切排时机是急性炎症的 2~3 天

答案：D

答案：E

解析：

解析：急性根尖周脓肿切排的时机是在急性

炎症的第 4~5 天，局部有较为明确的波动

22.下列溶液中不用于根管冲洗的是

感

A.3%过氧化氢溶液

B.5.25%次氯酸钠

20.根尖诱导成形术复查时间为治疗后

C.生理盐水

A.1 周

D.2%氯胺-T

B.2 周

E.10%葡萄糖酸钙

C.1 个月

答案：E

D.1.5~2 个月

解析：

E.3~6 个月

答案：E

23.根管扩大的标准是（年轻恒牙根管粗大



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



者除外)

A.至少比原来根管直径扩大 1 个器械号

B.至少比原来根管直径扩大 2 个器械号

C.至少比原来根管直径扩大 3 个器械号

D.按照医师个人习惯

E.只要牙胶尖能进入根管即可

答案：C

解析：

24.牙本质敏感症不是一种

A.常见的症状

B.独立的疾病

C.龋病的症状

D.磨损的症状

E.牙外伤症状

答案：B

解析：

25.牙龈炎最主要的致病菌是

A.变异链球菌

B.伴放线放线杆菌

C.黏性放线菌

D.牙龈卟啉单胞菌

E.金黄色葡萄球菌

答案：D

解析：

26.牙周炎发展至病损确立期时，其主要的

临床病理特征之一是

A.结合上皮开始增殖

B.出现明显的牙槽骨吸收

C.结缔组织中浸润的炎症细胞可见多数为

浆细胞

D.结合上皮冠方与根面分离

E.炎症浸润区的胶原纤维变性、溶解、大部

分丧失

答案：C

解析：在确立期病损中，大量的浆细胞主要

位于近冠方的结缔组织，围绕着血管。当炎

症不断向深部和根方延伸，组织深处也发生

胶原丧失和白细胞浸润。结合上皮增生开始

于早期病损，确立期结合上皮继续增生，钉

突向结缔组织深处延伸以维持上皮的完整

性和形成防细菌的屏障，但上皮附着的位置



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



不变。晚期病损时牙槽嵴顶开始吸收。

C.结合上皮是否从牙釉质牙骨质界向根方  
增殖和迁移形成牙周袋

27.Aa 是唯一能分泌某种毒性因子的细菌，  
这种毒性因子是

D.有无牙槽骨吸收  
E.患牙是否松动

A.胶原酶

答案：C

B.牙龈素

解析：牙周炎与牙龈炎相鉴别，最根本的标志是结合上皮根方迁移，形成附着丧失。

C.内毒素

D.白细胞毒素

E.肽酶

29.牙根纵裂的 X 线表现不正确的是

答案：D

A.围绕牙根一侧的牙周膜增宽

解析：许多细菌可产生相同的毒性因子，降低宿主抵抗力。但 Aa 是唯一能分泌白细胞毒素的细菌。白细胞毒素可损伤牙龈内和外

B.根管影像从根尖部到根管口长度不等的  
直线状均匀增宽

周血中的多形核白细胞、单核细胞和淋巴细

C.根管中段可见圆形低密度影像

胞的细胞膜，导致细胞死亡，释放溶酶体酶，  
进一步造成牙周组织的破坏。白细胞毒素被

D.晚期可见裂片从牙颈部折裂分离

认为是 Aa 毒性的一个最重要的决定因子，

E.患根周围牙槽骨垂直或水平吸收或局部  
性骨致密

它使 Aa 对抗宿主的防御功能增强。

答案：C

解析：

28.区别牙龈炎和牙周炎的重要标志是

30.下列不是慢性龈炎自觉症状的是

A.牙周探诊深度是否超过 3mm

A.刷牙或咬硬物时牙龈出血

B.有无探诊出血

B.牙龈局部发痒



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



C.牙龈经常出现自发性出血

解析：增生性龈炎的直接病因是牙菌斑。牙

D.牙龈肿胀感

石、不良修复体、不良卫生习惯及龋洞仅仅

E.口腔异味

属于局部促进因素。

答案：C

解析：

33.以下不是青春期龈炎特点的是

31.增生性龈炎多发生于

A.与内分泌改变有关

A.儿童及青少年

B.舌侧牙龈较少发生

B.婴幼儿

C.牙龈肥大发炎程度超过局部刺激的程度

C.老年人

D.青春期后，龈炎能完全自愈

D.中年人

E.女性较男性多见

E.新生儿

答案：D

答案：A

解析：

解析：

34.妊娠期龈瘤通常开始于

32.增生性龈炎的直接病因是

A.妊娠第 8 个月

A.牙石

B.妊娠第 4 个月

B.食物嵌塞

C.妊娠第 3 个月

C.不良卫生习惯

D.妊娠第 6 个月

D.牙菌斑

E.妊娠第 5 个月

E.不良修复体

答案：C

答案：D

解析：



更多医师考试资料



微信搜一搜

金英杰口腔学院



35.关于白血病牙龈病损的描述不正确的是

D.复合性牙周炎

A.可波及牙龈乳头、边缘龈和附着龈

E.成人性牙周炎

B.牙龈暗红发卽或苍白色

答案：A

C.自发性出血

解析：

D.牙龈坏死、疼痛

E.龈缘坏死如虫蚀状

答案：E

解析：

38.牙周病基础治疗的重点是

A.龈上洁治术

B.龈下刮治术

C.菌斑控制

D.根面平整

E.口腔卫生宣教

36.一般不会引起牙龈增生的药物是

A.苯妥英钠

B.硝苯地平

C.环孢素

D.维拉帕米

E.卡马西平

答案：C

解析：

答案：E

解析：

39.对牙周疾病预后影响较小的因素是

A.骨吸收程度

B.牙周袋深度

C.附着丧失程度

D.根分叉是否受累

E.治疗过程中使用的药物类型

37.与异常的宿主反应有关的牙周炎是

A.侵袭性牙周炎

B.顽固性牙周炎

C.慢性牙周炎

答案：E

解析：



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



40.一般在牙周基础治疗后一段时间根据牙周病变情况考虑牙周手术治疗,这段时间是

A.1 个月  
B.1.5 个月  
C.2~3 个月  
D.4 个月  
E.6 个月

答案: C

解析:

41.防止牙周疾病复发的关键在于患者

A.能否坚持在医院就诊  
B.能否坚持使用全身性药物  
C.能否坚持使用局部抗炎药物  
D.能否遵照医嘱,以正确的方法持之以恒;  
进行自我控制牙菌斑  
E.能否坚持做牙周病系统治疗

答案: D

解析:

42.侵袭性牙周炎的临床特征不包括

A.家族聚集性  
B.一般年龄较小  
C.牙周组织破坏程度与局部刺激物的量不成比例  
D.好发于前磨牙  
E.病程进展很快

答案: D

解析:

43.掌跖角化-牙周破坏综合征的牙周病损可最早始发于

A.青少年  
B.青春期  
C.成年后不久  
D.乳牙萌出后不久  
E.恒牙萌出后不久

答案: D

解析:

44.Linear gingival erythema 常与下列哪一疾病有关

A.Down 综合征

答案: D

解析:





B.掌跖角化-牙周破坏综合征

E.局部牙龈角化增生

C.白细胞功能异常

答案：A

D.艾滋病

解析：恒切牙萌出过迟与乳切牙过早脱落或

E.坏死性溃疡性牙周炎

滞留有关。上颌乳切牙过早脱落，儿童习惯

答案：D

用牙龈咀嚼，局部牙龈角化增生，变得坚韧

解析：

肥厚，使恒切牙萌出困难。

45.牙齿发育异常不包括

47.奶瓶龋主要发生于

A.牙齿数目异常

A.上颌乳切牙邻面

B.牙齿排列异常

B.上颌乳切牙唇面

C.牙齿结构异常

C.上颌乳磨牙(牙合)面

D.牙齿形态异常

D.下颌乳磨牙(牙合)面

E.牙齿萌出异常

E.上颌切牙舌面

答案：B

答案：B

解析：

解析：

46.个别恒切牙萌出过迟与下列情形无关的

48.下列不是金属成品冠修复法适应证的是

是

A.牙体缺损范围广

A.乳牙龋病

B.牙颈部龋蚀，可制备龈壁者

B.乳牙滞留

C.一个牙有多个牙面<sup>®</sup>者

C.乳牙早失

D.牙釉质发育不全牙

D.儿童习惯用牙龈咀嚼

E.间隙保持器中作固位体



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



答案：B

解析：金属成品冠修复法适用于牙体缺损范

围广、难以获得抗力形和固位形者；牙颈部

龋蚀致窝洞已无法制备龈壁者；一个牙有多

个牙面龋者；牙釉质发育不全牙或部分冠折

牙；龋病活跃性强，易发生继发龋者；以及

在间隙保持器中作固位体。

49.混合牙列期最容易患龋的恒牙是

A.切牙

B.尖牙

C.前磨牙

D.第一恒磨牙

E.第二恒磨牙

答案：D

解析：

50.有关窝沟封闭正确的观点是

A.乳磨牙不做窝沟封闭

B.只需对第一恒磨牙做窝沟封闭

C.只要有窝沟就可以做窝沟封闭

D.成年人不需要做窝沟封闭

E.有畸形舌尖的前牙不需做窝沟封闭

答案：C

解析：对乳磨牙、恒磨牙的(牙合)面窝沟和

颊舌面窝沟以及上切牙的舌侧窝等较容易

患龋的部位用封闭剂予以封闭，能起到较好

的防龋作用。

51.乳牙根管治疗术与恒牙根管治疗术最根

本的区别是

A.洞型制备不同

B.消毒药物不同

C.垫底材料不同

D.根充材料不同

E.充填材料不同

答案：D

解析：

52.以下关于单纯疱疹病毒感染，不正确的

是

A.全世界约 1/3 以上的人群曾被感染

B.主要通过飞沫、唾液传播

C.随着接受器官移植、肿瘤放化疗、受 HIV



更多医师考试资料



微信搜一搜

金英杰口腔学院



感染人群的增加 HSV-1 的患病率不断增高

D.单纯疱疹病毒为中等大小球形、有核衣壳

和脂蛋白包膜的 RNA 病毒

E.口腔、皮肤、眼、会阴、神经系统等是易

受侵犯的部位

答案：D

解析：单纯疱疹病毒是有包膜的 DNA 病毒。

53.下列属于疱疹病毒的是

A.HIV

B.柯萨奇病毒

C.肠道病毒

D.HPV

E.EB 病毒

答案：E

解析：目前发现的能感染人的疱疹病毒有 8

种，包括：单纯疱疹病毒 1 型(HSV-1)，单纯

疱疹病毒 2 型(HSV-2)，水痘-带状疱疹病毒

(VZV)，EB 病毒(EBV)，人类巨细胞病毒

(HCMV)，人类疱疹病毒 6 型(HHV-6)，人

类疱疹病毒 7 型(HHV-7)和卡波西肉瘤相关

病毒(KSHV)。：

54.血管神经性水肿一般不发生在

A.唇

B.舌

C.硬腭

D.眼睑

E.咽喉部

答案：C

解析：血管神经性水肿好发部位为头面部疏松结缔组织处，如唇、舌、颊眼睑、耳垂、咽喉等，外阴部、胃肠道黏膜也能被侵犯，有时也发生于手、足部的背、侧面。

55.以下关于重型阿弗他溃疡的临床表现，

描述不正确的是

A.溃疡边缘不整齐，似弹坑状

B.溃疡边缘不整齐，呈鼠啮状，底部有肉芽

组织

C.溃疡边缘不规则，红肿隆起

D.溃疡直径可达 10~30mm

E.溃疡深及黏膜下层直至肌层

答案：B



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



解析：

正确的是

A.60 岁以上的患者恶变率较高

56.重型复发性阿弗他溃疡可出现以下临床特征，除外

B.不吸烟的女性，特别是年轻女性患者恶变率较高

A.溃疡可呈鼠啮状

C.位于舌缘、舌腹、口底及口角区的病损恶

B.溃疡可呈弹坑状

变率较高

C.溃疡可发生于口腔后部

D.均质型易恶变

D.溃疡可造成组织缺损

E.伴有上皮异常增生的病损恶变率较高

E.溃疡基底部微硬

答案：D

答案：A

解析：口腔白斑病分为均质型与非均质型两

解析：

大类，前者如斑块状、皱纹纸状。非均质型则包括颗粒状、疣状及溃疡状，口腔白斑为疣状、颗粒型、溃疡或糜烂型及伴有念珠菌感染、HPV 感染者癌变倾向较大。

57.以下疾病中最常出现口腔损害的是

A.寻常型天疱疮

B.增殖型天疱疮

C.落叶型天疱疮

59.以下不属于口角炎常见病因的是

D.红斑型天疱疮

A.维生素 B2 缺乏

E.大疱性类天疱疮

B.白念珠菌感染

答案：A

C.过度日光照射

解析：

D.接触变应原

E.口腔治疗时牵拉时间过长

58.以下关于口腔白斑病恶变倾向，说法不

答案：C



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



解析：

携带有 RNA 反转录酶、核衣壳蛋白 P24，

是一种 RNA 病毒。

60.梅毒的病原体易存活于

A.有氧环境

B.潮湿环境

C.寒冷环境

D.体外环境

E.干燥环境

答案：B

解析：

62.艾滋病相关牙周疾病的临床表现不包菊

A.牙龈线形红斑

B.游离龈界限清楚火红色的充血带

C.附着龈可出现瘀斑

D.坏死性溃疡性牙龈炎

E.牙龈黑色素沉着

答案：E

解析：

61.获得性免疫缺陷综合征的病原体是

A.DNA 病毒

B.RNA 病毒

C.革兰氏阳性菌

D.革兰氏阴性菌

E.苍白螺旋体

答案：B

解析：获得性免疫缺陷综合征是由人类免疫

缺陷病毒感染引起，该病毒属于反转录病毒

科的慢病毒，病毒体圆柱状的核心为两条正

极性的单链 RNA 借氢键在夕端连接而成，

63.关于 Kaposi 肉瘤，描述不正确的是

A.是一种恶性肿瘤

B.男性患者少见

C.是 AIDS 最常见的口腔肿瘤

D.最好发于腭部和牙龈

E.呈褐色、红色、蓝色或紫色

答案：B

解析：

64.关于病毒性肝炎说法错误的是



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



A.是由各类肝炎病毒引起的，以肝脏损害为

主的传染病

B.HAV 为嗜肝脱氧核糖核酸病毒

C.HBV 有 3 个抗原抗体系统

D.完整的 HBV 颗粒又称为 Dane 颗粒

E.丁型肝炎病毒又称 delta 病毒

答案：B

解析：甲型肝炎病毒为小 RNA 病毒科嗜肝病毒属。

65.由血小板减少引起的紫癜是

A.系统性红斑狼疮

B.血小板无力症

C.血友病

D.维生素 K 缺乏

E.过敏性紫癜

答案：A

解析：

66.胆汁淤积性黄疸的临床特点不包括

A.尿胆红素强阳性

B.伴皮肤瘙痒

C.皮肤呈暗黄色

D.血清非结合胆红素明显增高

E.粪便呈浅灰色或陶土色

答案：D

解析：

67.预防阻塞性肺气肿的首要措施是

A.预防呼吸道感染

B.戒烟

C.控制大气污染

D.增强免疫能力

E.职业粉尘防护

答案：A

解析：

68.国内肝硬化的主要病因是

A.慢性酒精中毒

B.乙型病毒型肝炎

C.脂肪肝

D.胆汁淤积

E.循环障碍

答案：B



更多医师考试资料



微信搜一搜

金英杰口腔学院



解析：

A.原发免疫性血小板减少症

B.DIC

69.慢性肺源性心脏病形成肺动脉高压的主

C.脾功能亢进

要机制是

D.再生障碍性贫血

A.支气管感染

E.过敏性紫癜

B.红细胞增多

答案：D

C.血液黏稠度增加

解析：

D.肌小动脉痉挛

E.肺毛细血管床减少

72.急性肾盂肾炎一般不会出现

答案：D

A.肾区叩痛

解析：

B.贫血

C.尿路刺激症状

70.消化性溃疡最常见的并发症

D.畏寒、发热

A.穿孔

E.血尿

B.癌变

答案：B

C.出血

解析：

D.幽门梗阻

E.感染

73.鉴别慢性肾盂肾炎与慢性肾小球肾炎有

答案：C

效的是

解析：

A.血尿程度

B.蛋白尿程度

71.血小板生成减少的出血性疾病为

C.肾功能减退程度



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



D.影像检查示一侧肾缩小或表面凹凸不平

C.急性牙髓炎

E.高血压程度

D.慢性牙髓炎

答案：D

E.急性根尖周炎

解析：

答案：C

解析：

74.患者，男，30岁。右面部放射性疼痛3天。鉴别是否为牙源性疼痛最有价值的检查手段是

76.患者2个月前因上后牙弱坏去医院做复面洞充填。现自觉胀痛，咬物痛。查：该患牙充填体表面完好，叩诊(+)，充填体下方龈乳头探痛、出血。医师诊断为牙间乳头炎。其最可能的原因是

A.拍摄曲面体层片

A.充填未垫底

B.叩诊和牙髓电活力检查

B.充填体高点

C.选择性麻醉

C.充填体折断

D.问诊和探诊

D.充填时软髓未去尽

E.牙齿松动度检查

E.充填体悬突

答案：B

答案：E

解析：非牙源性疼痛的鉴别要点是病变所涉及的患牙牙髓活力多为正常。

解析：

75.患者，男，16岁。右下后牙夜间痛1天。

查见右下第一前磨牙咬合面畸形中央尖折断痕迹，冷测引起剧痛，叩诊(-)。诊断为

77.患者，女，25岁。因全口牙自幼呈黄色，逐渐加重为黄褐色要求治疗。查全口牙均为黄褐色，表面光滑无缺损。医师应做的重点

A.急性龋

B.可复性牙髓炎



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



询问是

E.备洞充填

A.牙病治疗史

答案：D

B.幼时患病史

解析：患牙疑似隐裂，冷热刺激迟缓痛，出

C.母亲妊娠期用药史

现不可复性牙髓炎，须行牙髓治疗后全冠修

D.幼时居住地

复。

E.幼时患病用药史

答案：E

79.患者，男，26岁。因左下后牙食物嵌塞

解析：四环素牙为牙的发育矿化期，服用四

2年多就诊。检查：左下第二前磨牙浦深达

环素类药物，药物结合到牙组织内，使牙着

髓腔，牙髓无活力，叩诊略异样感，X线片

色，初呈黄色，以后逐渐由黄色变成棕褐色

见根尖周透射区边界不清楚，形状不规则。

或深灰色。四环素对牙的影响主要是着色，

该主诉牙应明确诊断为

有时也合并釉质发育不全。

A.慢性根尖周炎

B.慢性根尖周脓肿

78.患者半年来右侧后牙咬合痛、冷热痛要

C.根尖周囊肿

求治疗。检查：无龋，近中可疑隐裂，冷热

D.慢性牙髓炎

测引起疼痛，刺激去除后，持续数秒，叩诊

E.有瘻型根尖周脓肿

(±)。右侧后牙不同程度磨损，探敏。该患

答案：A

者主诉牙的治疗原则为

解析：慢性根尖周炎中根尖周肉芽肿、慢性

A.不治疗

根尖周脓肿和根尖周囊肿这三种类型在临

B.调(牙合)

床上诊断可统称为“慢性根尖周炎”，临床

C.脱敏

上只通过X线检查区分根尖周肉芽肿或是

D.牙髓治疗后全冠修复

根尖周囊肿是不可靠的，只有通过组织病理



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



学检查才能确诊。

81.患者,男,67岁。患牙 $\overline{16}$ 因重度磨损

露髓,拟行根管治疗,常规根管治疗的步骤

80.患者,女,14岁。习畸形中央尖折断,

为

颊侧瘘管,叩诊(+),X线示可根尖孔呈喇叭

A.根管清理、预备和充填

叭口状。治疗方案应选择

B.根管封药和充填

A.根尖诱导成形术,每隔3~6个月复查1

C.根管清理和充填

次,至X线观察到根尖有明显硬组织形成后,

D.根管预备、消毒和充填

改做根管充填

E.根管清理、封药和充填

B.根尖诱导成形术,每隔12个月复查1次,

答案:D

至X线观察到根尖有明显硬组织形成后,改

解析:

做根管充填

C.盖髓术,每隔3~6个月复查1次,直至

82.患者,女,25岁。因右上后牙冷热刺激

钙桥形成

痛2日就诊。检查发现 $\overline{5}$ 远中邻面深龋,未

D.盖髓术,不需复查

穿髓,探痛(+),叩痛(-),冷诊(+),

E.直接行根管治疗术,每隔半年复查1次,

刺激去除后无延缓痛,X线示龋坏近髓。最

连续观察3年

先考虑的治疗方法是

答案:A

A.直接充填治疗

解析:对牙髓坏死或并发根尖周炎的年轻恒

B.盖髓术

牙行根尖诱导成形术,应定期随访,一般每

C.塑化治疗

3~6个月复查1次,直至根尖形成或根端闭合

D.根管治疗

后永久性根管充填。

E.根尖诱导成形术

答案:B





解析：患者深龋近髓，直接充填治疗去龋有穿髓风险。盖髓术保守治疗，适用于软化牙本质不能一次性去尽，牙髓-牙本质反应能力低下，无明显主观症状的深龋。

鳞屑。可初步诊断为

A.掌跖角化-牙周破坏综合征

B.Down 综合征

C.艾滋病

D.急性肾炎

E.糖尿病

83.患者，男，40岁。刷牙出血2年，冷热刺激酸痛，无自发痛，下前牙咬合无力半年。检查：CI-S为3，牙龈充血肿胀，下前牙松动I度，牙龈萎缩2mm，上、下磨牙牙周袋深4~5mm。初步诊断应为

答案：A

解析：

A.牙龈炎

B.慢性牙周炎

C.侵袭性牙周炎

D.牙髓炎

E.青少年后期牙周炎

答案：B

解析：

85.患者，男，25岁。左上后牙肿痛2天，口服消炎药治疗无效。检查：|7颊侧牙周脓肿形成，波动感(+)，水平叩痛(+)，冷诊(-)，牙周袋深6mm。应急处理应是

A.局麻下开髓

B.龈上洁治

C.龈下刮治

D.脓肿切排

E.药物治疗

84.患儿，女，5岁。牙龈出血，牙松动半年。

答案：D

检查：全口牙齿多数松动，左上第一乳磨牙、双侧下颌第二乳磨牙缺失，牙龈充血红肿，手掌、足底、膝部及肘部可见局限性过角化、

解析：急性牙周脓肿的治疗原则是止痛、防止感染扩散以及使脓液引流。当脓液形成，出现波动时，可根据脓肿部位及表面黏膜的





厚薄，选择从牙周袋内或牙龈表面引流。但

尚未出现波动感时，过早切开引流会造成伤口出血过多和疼痛。急性牙周脓肿只去除大块龈上牙石，不宜做彻底的龈上洁治，以免感染扩散。

86.患儿，女，12岁。牙龈出血2个月，无明显疼痛。检查：|3和|4间颊侧龈乳头见一椭圆形增生物，探易出血，未探及龈下牙石。X线片：|3和|4间骨密度减低。最可能的诊断为

- A.牙龈炎
- B.牙龈瘤
- C.牙龈增生
- D.龈乳头炎
- E.青春期龈炎

答案：B

解析：牙龈炎、牙龈增生、龈乳头炎及青春期龈炎均不会引起牙槽骨吸收，牙龈瘤患者长时间存在的大肿块可发生牙槽骨壁的破坏，X线可见骨质吸收，牙周膜间隙增宽现象。

87.患儿，男，12岁。检查发现前牙牙龈乳头呈球状突起，松软光亮。如果诊断为青春期龈炎，其病变程度一般不受下列哪一因素影响

- A.口呼吸习惯
- B.牙齿排列不齐
- C.乳恒牙更替
- D.磨牙症
- E.戴矫治器

答案：D

解析：青春期龈炎的主要病因是牙菌斑。青春少年经常由于口呼吸习惯、牙齿排列不齐、乳恒牙更替、戴矫治器等，造成牙齿不易清洁，导致菌斑滞留，引起牙龈炎。目前尚无磨牙症与青春期龈炎有关的相关结论。

88.患者，男，32岁。主诉：牙龈自动出血伴牙龈疼痛、腐败性口臭3周，未发热。有2年吸烟史。检查：CI-S为3，龈缘呈虫蚀状，表面覆盖坏死假膜。其最可能的诊断是

A.慢性牙周炎



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



B.急性坏死性溃疡性龈炎

答案：C

C.急性龈乳头炎

解析：

D.疱疹性龈口炎

E.侵袭性牙周炎

90.患儿，男，8岁。全口乳磨牙不同程度龋

答案：B

坏，考虑的治疗方案中不恰当的是

解析：患者牙龈自动出血伴牙龈疼痛、腐败性口臭3天，未发热。检查：龈缘呈虫蚀状，表面覆盖坏死假膜。最符合急性坏死性溃疡性龈炎的典型表现，疱疹性龈口炎一般有全身症状，且有疱疹的表现，没有典型的龈缘呈虫蚀状。

A.药物治疗

B.充填治疗

C.嵌体修复

D.金属成品冠修复

E.直接拔除所有龋坏牙

答案：E

解析：

89.患儿，男，8岁5个月。乳中切牙已脱

落，右上颌中切牙已萌出半年余，左上颌中

切牙未见萌出，X线检查显示有左上颌中切

牙牙胚。左上颌中切牙不萌出的原因不可能

A.乳牙病变

B.乳牙过早脱落

C.乳牙滞留

D.局部牙龈角化增生

E.遗传

91.患儿，男，9岁。两颗上颌中切牙受硬物

撞击，牙齿酸痛，上、下牙咬合时有不适感，

牙齿未见脱位，但牙釉质表面有裂纹。临床

及X线检查，牙根组织未见明显折断，牙周

间隙稍增宽。最恰当的诊断是

A.牙挫入

B.牙釉质折断

C.牙周组织损伤

D.牙髓出血



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



E.牙震荡

答案：E

解析：

日发现舌背中央出现一个大面积的水疱，破

裂后形成椭圆形的浅溃疡面。最可能的诊断

是

A.重型阿弗他溃疡

B.天疱疮

C.药敏性口炎

D.多形性红斑

E.大疱性类天疱疮

92.患者，男，28岁。5天来牙龈出血，晨

起发现枕头有血迹，口臭，牙龈红肿，呈火

山口状，龈缘如虫蚀状。最可能的诊断是

A.牙龈炎

B.慢性牙周炎

C.侵袭性牙周炎

D.天疱疮

E.坏死性龈口炎

答案：E

解析：坏死性龈口炎的主要病原体是奋森螺

旋体和梭形杆菌，其牙龈边缘及龈乳头顶端

出现坏死，表现为火山口状或虫蚀状，牙龈

充血水肿，触之易出血，并具有特异性腐败

恶臭。根据本例中特征性的临床表现，最可

能的诊断是坏死性龈口炎。

93.患者，女，35岁。昨日出现感冒症状，

自行服用复方新诺明、阿司匹林等药物，今

94.患者，女，26岁。口腔溃疡反复发作3

年多在月经前出现，数目每次1~3个不等，

主要位于下唇和舌等部位，疼痛明显。下列

治疗措施中最好的是

A.口腔局部对症治疗

B.全身使用抗生素

C.补充多种维生素

D.口服雌激素及对症治疗

E.注射转移因子

答案：D

解析：RAU的治疗原则，对于症状较重及



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



复发频繁的患者，采用局部和全身联合用药， A.腺性唇炎

患者溃疡多在月经前出现，口服雌激素对因 B.慢性唇炎

治疗。 C.盘状红斑狼疮

D.念珠菌性唇炎

95.患者，女，71岁。无烟酒嗜好，口腔内 E.斯-约综合征

未进行义齿修复，舌腹区域出现大面积白色 答案：D

损害，边界清楚，表面粗糙，但触之柔软， 解析：

无明显疼痛。最可能的诊断是

A.斑块状白斑

B.颗粒状白斑

C.皱纸状白斑

D.疣状白斑

E.溃疡状白斑

答案：C

解析：皱纹纸状口腔白斑多发生于口底和舌 应诊断为

腹。病损呈灰白色或白垩色，边界清楚，表 A.一期梅毒

面粗糙，但触之柔软，周围黏膜正。 B.二期梅毒

C.获得性梅毒

96.患者，女，50岁。下唇唇红覆盖有灰白 D.晚期胎传梅毒

色鳞屑，唇红及口角区皲裂、出血。脱落上 E.淋病

皮直接涂片 PAS 染色发现假菌丝和孢子。 答案：D

最可能的诊断是 解析：梅毒根据传染途径的不同可分为获得





性（后天）梅毒和胎传（先天）梅毒，又可

答案：C

根据病程的长短分为早期梅毒和晚期梅毒，

解析：

获得性梅毒还可以分为一期梅毒、二期梅毒

和三期梅毒（晚期获得性梅毒）。早期胎传

99.患者，男，24岁。发热、咳脓痰2周，

梅毒经过与获得性梅毒相似，但不发生硬下

体温波动于38-39℃。X线片示右肺下叶大

疳；晚期胎传梅毒多在2岁以后发病，到

片致密影，右胸膜腔积液。最常见的致病菌

13-14岁才有多种症状相继出现，标志性损

是

害有哈钦森牙和桑椹牙。哈钦森牙表现在切

A.厌氧菌

牙，这种切牙的切缘比牙颈部狭窄，切缘中

B.链球菌

央有半月形缺陷，切牙之间有较大空隙；桑

C.葡萄球菌

椹牙表现在第一恒磨牙，第一恒磨牙的牙尖

D.大肠埃希菌

皱缩，牙尖向中央偏斜，牙釉质呈多个不规

E.肺炎球菌

则的小结节和坑窝凹陷，散在于咬合面处。

答案：E

解析：发热咳浓痰，X线显示右肺下叶大片

98.患儿，女，7岁。持续发热1周，体温

致密影，右侧胸腔积液，提示右肺肺炎伴脓

可达39.6~40.2℃，每天最低温度为37.8℃

胸，肺炎最常见的致病菌为肺炎链球菌。

左右。此热型属于

A.波浪热

B.间歇热

C.稽留热

D.弛张热

E.不规则热

100.患者，女，29岁。贫血病史1年，浅

表淋巴结不肿大，肝、脾未触及，血象呈现

全血细胞减少。若诊断再障，意义最大的是

A.网织红细胞减少

B.骨髓增生低下，造血细胞减少



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



C.骨髓非造血细胞增多，NAP 增加

D.铁粒幼细胞消失

E.巨核细胞增多

答案：B

解析：

101.患者，男，38 岁，确诊为急性早幼粒细胞白血病（M3），化疗后牙龈出血，皮肤片状瘀斑。血小板  $30 \times 10^9/L$ ，血片破碎红细胞 2.2%，凝血酶原时间延长，纤维蛋白原含量减低，3P 试验阳性。该患者最可能

的是

A.原发免疫性血小板减少症

B.过敏性紫癜

C.播散性血管内凝血

D.缺铁性贫血

E.M3 合并弥散性血管内凝血

答案：E

解析：

102.患者，男，40 岁。发现颈部肿块 3 天

就诊，体检右颈部扪及 4cmx4cm 的肿块，

质硬不平，吞咽时活动性较低，声音嘶哑，

右侧胸锁乳突肌前缘扪及 2 个肿大的淋巴

结首先考虑的诊断

A.甲状腺癌

B.地方性甲状腺肿

C.碘甲亢

D.慢性淋巴细胞性甲状腺炎

E.甲状腺瘤

答案：A

解析：

103.患者，男，50 岁。无“三多一少”症

状，空腹血糖 6.5mmol/L，有糖尿病家族

史，疑糖尿病就诊。下列试验最具诊断意义

的是

A.尿糖定性

B.24 小时尿糖定量

C.餐后血糖

D.葡萄糖耐量+胰岛素释放试验

E.糖化血红蛋白

答案：D

解析：



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



A. 氟喹诺酮类药物

104. 患者，男，35岁。因发热，咳嗽、头

B. 庆大霉素

痛、腰痛4天，体温在39-40℃之间。查体：

C. 四环素

面部潮红，眼球结膜水肿，软腭有网状充血

D. 加大卡那霉素剂量

和出血点。实验室检查：血常规：WBC

E. 红霉素

$12 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞89%，血小板

答案：A

$50 \times 10^9/L$ ；尿常：规则蛋白(+++)外余无

解析：

异常。于1999年12月15日收入西安某医

院。医生首先考虑的诊断是

106. 患者，男，52岁，湖南人。因反复癫

A. 急性上呼吸道感染

痫小发作6个月就诊。体检：肝肋下2cm，

B. 流行性感冒

脾肋下4cm。血常规示嗜酸性粒细胞增多，

C. 急性肾炎

三系下降。肝脏B超提示肝纤维化。头颅

D. 肾病综合征出血热

CT：示顶叶和枕叶有结节状等密度灶。应当

E. 急性支气管炎

考虑的诊断是

答案：D

A. 脑囊虫病

解析：

B. 脑血吸虫病

C. 肝细胞肝癌伴颅内转移

105. 患者，男，16岁。2天前有进不洁水果

D. 乙肝肝硬化

史。现出现发热38.5℃，腹痛、腹泻，里急

E. 脑梗死

后重，每天大便次数逾10次，已用过氯霉

答案：B

素、卡那霉素未见效果，仍有脓血便。选用

解析：

的较有针对性的抗菌药物是



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



107.患者，男，50岁。在洗浴时昏倒，被人发现送来急诊。查体：昏迷状，血压170/100mmHg，口唇呈樱桃红色，两肺满布湿啰音，双侧巴氏征（+）。该患者最可能的诊断是

- A.脑出血
- B.心肌梗死
- C.糖尿病酮症酸中毒
- D.低血糖昏迷
- E.一氧化碳中毒

答案：E

解析：

- A.尿毒症
- B.脑血管意外
- C.乙型脑炎
- D.糖尿病酮症酸中毒
- E.肝性脑病

答案：E

解析：

109.充填后产生咀嚼时疼痛的最常见原因是

- A.意外露髓
- B.充填体脱落
- C.继发龋

108.患者，男，45岁。查体发现肝硬化5年。3天前与朋友聚餐时出现呕血，鲜红色，量约1000ml，患者出现头晕、心慌、出冷汗等，经输血、补液和应用止血药物治疗后病情好转，血压和心率恢复正常。1天前出

现睡眠障碍，并出现幻听和言语不清。化验检查示：血氨76.3 $\mu$ mol/L（130 $\mu$ g/dl），血糖5.6mmol/L，尿素氮7.2mmol/L。该患者最可能的诊断是

- D.乳牙内吸收
- E.充填体过高

答案：E

解析：

110.直接盖髓术的适应证是

- A.意外露髓
- B.充填体脱落
- C.继发龋



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



D.乳牙内吸收

解析：

E.充填体过高

答案：A

113.切角部分折断，牙本质暴露，牙根正常，

解析：

不松动

111.树脂充填修复失败的最主要原因是

A.调(牙合)观察

B.盖髓治疗

A.意外露髓

C.安抚后无症状时充填治疗

B.充填体脱落

D.活髓切断术治疗

C.继发龋

E.牙髓治疗

D.乳牙内吸收

答案：C

E.充填体过高

解析：

答案：C

解析：

114.慢性龈炎主要累及的病变区是

A.前牙区为主，尤其是下前牙区最为显著，

112.牙釉质部分折断，牙根正常，不松动，

也可波及全口牙的牙龈

应选择的治疗方式是

B.前牙区的唇侧牙龈

A.调(牙合)观察

C.可发生于少数牙或全口牙牙龈，以前牙区

B.盖髓治疗

为重

C.安抚后无症状时充填治疗

D.单个牙的牙龈乳头

D.活髓切断术治疗

E.全口牙龈，以前牙区较重，只发生于有牙

E.牙髓治疗

区

答案：A

答案：A



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



解析：慢性龈炎牙龈炎症以前牙区为主，尤 为重

其是下前牙区最为显著，也可波及全口牙的 D.单个牙的牙龈乳头

牙龈。 E.全口牙龈，以前牙区较重，只发生于有牙区

115.增生性龈炎主要累及的病变区是 答案：C

A.前牙区为主，尤其是下前牙区最为显著， 解析：妊娠期龈炎发生于少数牙或全口牙牙  
也可波及全口牙的牙龈 龈，以前牙区为重。

B.前牙区的唇侧牙龈

C.可发生于少数牙或全口牙牙龈，以前牙区 117.牙龈瘤主要累及的病变区是

为重 A.前牙区为主，尤其是下前牙区最为显著，

D.单个牙的牙龈乳头 也可波及全口牙的牙龈

E.全口牙龈，以前牙区较重，只发生于有牙 B.前牙区的唇侧牙龈

区 C.可发生于少数牙或全口牙牙龈，以前牙区

答案：B 为重

解析：增生性龈炎早期表现为炎性肿胀，多 D.单个牙的牙龈乳头

发生于上、下前牙的唇侧牙龈。 E.全口牙龈，以前牙区较重，只发生于有牙

区

116.妊娠期龈炎主要累及的病变区是 答案：D

A.前牙区为主，尤其是下前牙区最为显著， 解析：牙龈瘤主要表现为单个牙的牙龈乳头  
也可波及全口牙的牙龈 瘤状增生物。

B.前牙区的唇侧牙龈

C.可发生于少数牙或全口牙牙龈，以前牙区 118.药物性牙龈增生主要累及的病变区是



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



A.前牙区为主，尤其是下前牙区最为显著，

也可波及全口牙的牙龈

B.前牙区的唇侧牙龈

C.可发生于少数牙或全口牙牙龈，以前牙区

为重

D.单个牙的牙龈乳头

E.全口牙龈，以前牙区较重，只发生于有牙

区

答案：E

解析：药物性牙龈增生发生于全口牙龈，以

前牙区较重，只发生于有牙区。拔牙后，增

生的牙龈组织可自行消退。

120.牙龈、上腭等处的口腔黏膜出现成簇的

透明小水疱，应诊断为

A.疱疹性龈口炎

B.唇疱疹

C.手-足-口病

D.鹅口疮

E.复发性口疮

答案：A

解析：

121.婴儿口腔黏膜出现白色凝乳状的斑点

或斑块，可擦掉，其诊断为

A.疱疹性龈口炎

B.唇疱疹

C.手-足-口病

D.鹅口疮

E.复发性口疮

答案：D

解析：

119.唇、颊、舌等黏膜反复出现散在的圆形

或椭圆形溃疡，应诊断为

A.疱疹性龈口炎

B.唇疱疹

C.手-足-口病

D.鹅口疮

E.复发性口疮

答案：E

解析：

122.下唇及周围皮肤灼痛瘙痒，局部出现丛



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



集成簇的透明水疱，破溃后干瘪结痂，应诊

断为

A.疱疹性龈口炎

B.唇疱疹

C.手-足-口病

D.鹅口疮

E.复发性口疮

答案：B

解析：

123.有前驱症状，继而在口腔黏膜、手掌、

足底出现水疱、丘疹等病损，5~7 天愈合，

应诊断为

A.疱疹性龈口炎

B.唇疱疹

C.手-足-口病

D.鹅口疮

E.复发性口疮

答案：C

解析：

124.最可能为肝硬化腹水的是

A.腹水比重 < 1.016.蛋白 20g/L

B.腹水比重 > 1.018，李凡他（Rivalta）试

验阳性

C.乳糜样腹水

D.腹水细胞总数 >  $1000 \times 10^6/L$ ，分类以中

性粒细胞为主

E.腹水细胞总数为  $100 \times 10^6/L$ ，分类以间皮

细胞为主

答案：A

解析：

125.最可能为结核性腹膜炎腹水的是

A.腹水比重 < 1.016.蛋白 20g/L

B.腹水比重 > 1.018，李凡他（Rivalta）试

验阳性

C.乳糜样腹水

D.腹水细胞总数 >  $1000 \times 10^6/L$ ，分类以中

性粒细胞为主

E.腹水细胞总数为  $100 \times 10^6/L$ ，分类以间皮

细胞为主

答案：B

解析：





答案：B

126. ( 126-128 题共用题干 ) 患者，女，20 岁。昨日起右下后牙自发性阵发性疼痛，夜间疼痛加重，手持冷水瓶就诊。检查：右下第一磨牙远中见树脂充填物。其他牙齿未见明显异常。为了进一步确诊，还需进行的检查是

- A. 麻醉测验
- B. 热测验
- C. 冷测验
- D. 染色法测验
- E. 咬诊法测验

答案：B

解析：急性牙髓炎可借由温度测验出患牙是否在炎症阶段。

127. 右下第一磨牙的诊断是

- A. 慢性根尖脓肿
- B. 急性牙髓炎
- C. 龈乳头炎
- D. 三叉神经痛
- E. 牙龈炎

解析：急性牙髓炎的诊断要点是剧烈的自发性疼痛，阵发性发作，遇冷、热刺激及夜间疼痛加重，疼痛为放散性，不能明确指出患牙，患牙有深龋洞或有近髓、穿髓的非龋性磨耗或缺损或有深牙周袋，温度测试可引起疼痛或疼痛加重，晚期化脓时有搏动性跳痛，热使疼痛加剧，冷使疼痛缓解。

128. 主诉牙的温度测验结果为

- A. 无反应
- B. 酸痛不适
- C. 出现疼痛，刺激去除后持续一段时间
- D. 出现疼痛，但刺激去除后即刻消失
- E. 短暂的轻度不适

答案：C

解析：温度测验可测验出早期炎症反应性增强；晚期炎症则表现为迟钝。急性牙髓炎温度测验的结果则为疼痛刺激去除后持续一段时间才会消失。

129. ( 129-132 题共用题干 ) 患者，男，



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



38岁。自觉右下第一磨牙咀嚼时咬到某一

处有明显酸痛，不咬合时无疼痛，今晨咬硬

物时又出现同样症状，进冷热食时，无明显

痛感。检查的重点是

A.叩诊

B.探诊

C.视诊

D.牙齿松动度

E.冷热诊

答案：B

解析：右下第一磨牙咬合有明显的酸痛感无

自发痛，可以探诊有无龋坏或敏感点。

130.对鉴别诊断最有帮助的辅助检查是

A.  $\overline{6}$ 根尖片

B.下颌骨侧位片

C.曲面体层片

D.电活力测验

E.神经系统检查

答案：A

解析：根据患者的临床表现可利用影像学辅

助检查根尖片得到更准确的诊断。

131.若确诊为 $\overline{6}$ 牙齿敏感症，最先采用的治

疗方案是

A.备洞，银汞合金充填

B.备洞，光敏树脂充填

C.窝沟封闭

D.脱敏

E.全冠修复

答案：D

解析：牙齿敏感的患者可通过脱敏治疗、激

光治疗、修复治疗等方法进行对症治疗以缓

解症状。同时还应排查病因，积极治疗原发

疾病，去除导致牙齿敏感的诱发因素。

132.若经上述检查不能确定为 $\overline{6}$ 牙齿敏感

症诊断时还需考虑

A.  $\overline{6}$ 慢性牙髓炎

B.  $\overline{6}$ 急性牙髓炎

C.  $\overline{6}$ 牙隐裂

D.  $\overline{6}$ 四环素牙

E.  $\overline{6}$ 邻面龋

答案：C



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



解析：

E.慢性根尖周炎

答案：D

133. ( 133-135 题共用题干 ) 患者，女，

解析：

21 岁。曾有正畸治疗史，数月来自觉右下

前牙变色，遂就诊。口腔内科检查：11 牙冠

135.该患牙最佳治疗方式应为

呈灰黄色，无光泽，无明显龋坏及缺损，叩

A.牙周系统治疗

诊不适，冷热诊无反应。X 线片示根尖周影

B.全冠修复

像无明显异常。为明确患牙诊断进行的一项

C.贴面修复

检查是

D.根管治疗

A.咬诊

E.拔除患牙

B.牙周袋探诊

答案：D

C.牙髓活力测试

解析：

D.松动度检查

E.扪诊

136. ( 136-138 题共用题干 ) 患者，男，

答案：C

22 岁。刷牙时牙龈出血 2 周，可以自行止

解析：

住。如果诊断为慢性龈炎，其主要的直接病

因是

134.主诉牙的诊断最可能是

A.牙石

A.牙周牙髓联合病变

B.龋洞

B.急性牙髓炎

C.不良卫生习惯

C.慢性牙髓炎

D.牙菌斑

D.牙髓坏死

E.不良修复体



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



答案：D

菌斑滞留和局部刺激牙龈的因素。对于牙龈

解析：

炎症较重的患者，可配合局部药物治疗。

137.该患者临床上不会有的临床表现是

A.探诊出血

B.龈缘肥厚

C.多发生于前牙

D.可形成假性牙周袋

E.X线检查可发现牙槽骨垂直型吸收

答案：E

解析：慢性龈炎与早期牙周炎鉴别主要为附

着丧失和牙槽骨的吸收。

139. (139-142 题共用题干) 患者，男，

22岁。因刷牙出血，牙松动半年就诊。无

全身疾病。牙周龈上、龈下洁治后，口腔检

查：左下颌第一磨牙颊侧中央仍有 7mm 深

牙周袋，探诊出血。最可能的诊断是

A.青少年后期牙周炎

B.慢性牙周炎

C.侵袭性牙周炎

D.快速进展型牙周炎

E.成人牙周炎

138.下面关于该患者的治疗，说法错误的是

A.牙周洁治去除菌斑和牙石

B.可配合局部药物治疗

C.必须口服抗生素

D.治疗完成后定期复查

E.自我口腔卫生维护很重要

答案：C

解析：慢性龈炎的治疗原则为：去除病因，可

通过洁治术彻底清除菌斑、牙石，消除造成

答案：C

解析：侵袭性牙周炎的临床特点为快速的牙

周附着丧失和骨吸收，本病患者一般年龄较

小，发病可开始于青春期前后，局限型侵袭

性牙周炎的特征是“局限于第一恒磨牙或切

牙的邻面有附着丧失，至少波及两个恒牙，

其中一个为第一磨牙。其他患牙不超过两

个”。



更多医师考试资料



微信搜一搜

金英杰口腔学院



140.请分析牙周龈上、龈下洁治后，深牙周袋存在的原因不包括

- A.牙周洁治不彻底
- B.自我牙菌斑控制不良
- C.不良修复体
- D.釉突
- E.咬合创伤

答案：E

解析：本题主要提示并不是所有患者牙周龈上洁治、龈下洁治后，深牙周袋仍存在，都需要采取牙周手术治疗。应仔细分析其原因，如可能是：①牙周洁治不彻底，残留牙石，未完全控制牙周组织炎症；②患者菌斑控制差，牙周组织炎症复发；③存在釉突，牙周膜无法附着在牙釉质表面，仅有结合上皮，故在牙龈有炎症时，牙龈和牙体组织之间易形成盲袋，菌斑易滞留，刺激牙周组织，致使炎症难以控制；④存在充填体悬突、不良修复体等，易滞留牙菌斑，刺激牙周组织，致使炎症难以控制。因此应选 E。然后根据不同的原因，采取不同的治疗方法。

141.相应治疗方案不包括

- A.牙周翻瓣术
- B.GTR
- C.半牙切除术
- D.调(牙合)
- E.拔除所有松动牙

答案：E

解析：根据牙周龈上、龈下洁治后，深牙周袋仍存在的原因，采取不同的治疗方法。如牙周洁治不彻底，则再次进行彻底的牙周洁治；患者菌斑控制差，则加强口腔卫生宣教；釉突，则修改外形，考虑牙龈切除手术；不良修复体，则纠正不良修复体边缘；根分叉病变，则查找根分叉病变产生原因并纠正，根据需要考虑牙周手术，如 GTR、半牙切除术、调𪙅等。

142.如果右下后牙咬合不适半个月。检查：

探针可进入Ⅱ°可根分叉区，且探诊后出血。

诊断为根分叉病变。该病变程度的判断，主要依据是

- A.牙松动度



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



B.叩诊

C.探诊和 X 线片

D.扪诊

E.视诊

答案：C

解析：

143. ( 143-144 题共用题干 ) 患儿，男，  
25 天。出生后几天即发现下颌萌出一颗牙  
齿。最准确的诊断是

A.诞生牙

B.新生牙

C.乳牙结构异常

D.乳牙异位萌出

E.畸形牙

答案：B

解析：新生牙是指出生后不久萌出的牙齿，  
而诞生牙是指婴儿出生时口腔内已有的牙  
齿。

144.临床表现不可熊的是

A.多生牙

B.正常牙

C.牙根尚未发育

D.极度松动

E.上皮珠

答案：E

解析：早萌的乳牙牙根尚未发育或发育很少，  
松动或极度松动。上皮珠是牙板上皮剩余所  
形成的角化物，并非真正的牙齿。

145. ( 145-148 题共用题干 ) 患者，男，  
14 岁。舌部溃疡 1 个月余。患者近来无发  
热、咳嗽症状，以前无溃疡复发史。检查：  
舌右侧缘可见一处溃疡，形状不规则，大小  
约 2cmx1.5cm，表面有假膜覆盖，基底部  
触之稍硬。该患者最可能患的疾病是

A.恶性溃疡

B.创伤性溃疡

C.梅毒

D.结核性溃疡

E.重型阿弗他溃疡

答案：B

解析：



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



146.为了明确诊断，还应进行

A.血常规检查

B.X 线胸透或胸片

C.结核菌素试验

D.组织活检

E.排除咬舌不良习惯

答案：E

解析：

147.引起该病可能的原因还有

A.锐利的牙尖

B.细菌感染

C.病毒感染

D.维生素缺乏

E.内分泌失调

答案：A

解析：

148.该病最佳的治疗方法是

A.口服肾上腺皮质激素

B.手术切除

C.链霉素 0.5g 局部注射，隔日 1 次

D.去除刺激因素及局部对症处理

E.局部涂敷冰硼散

答案：D

解析：

149. ( 149-150 题共用题干 ) 患者，男，27 岁。发现室间隔缺损 20 年。1 个月来出现不规则发热，体温 37.5℃ 左右，入院前已经不规则使用抗生素 2 周。查体：皮肤、结膜下有瘀点，胸骨左缘 3、4 肋间 4/6 级收缩期杂音，脾大，杵状指。实验室检查：血红蛋白 75g/L。初步诊断为

A.慢性白血病

B.贫血性心脏病

C.系统性红斑狼疮

D.室间隔缺损，心力衰竭

E.亚急性感染性心内膜炎

答案：E

解析：

150.该患者可能的致病菌是



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



微信搜一搜



金英杰口腔学院

A.真菌

B.肠球菌

C.肺炎双球菌

D.草绿色链球菌

E.金黄色葡萄球菌

答案：D

解析：



# 金英杰口腔学院



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院