



微信搜一搜



金英杰口腔学院

2021 执业医师考试

绝密押题卷



2021 年

医师资格考试专用



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



1. 上颌磨牙的主要功能尖是

- A. 近中颊尖
- B. 近中舌尖
- C. 远中颊尖
- D. 远中舌尖
- E. 第五牙尖

答案：B

解析：

2. 防治恒牙早萌的重要环节是

- A. 佩戴阻萌器
- B. 控制乳牙根尖周围炎症
- C. 若对颌牙缺失，应防止早萌牙过长
- D. 局部涂氟，预防龋齿
- E. 固定松动的早萌恒牙

答案：B

解析：

3. 远中错(牙合)是

- A. 上颌第一恒磨牙的近中颊尖咬合在下颌第一恒磨牙颊沟的远中

B. 上颌第一恒磨牙的近中颊尖正

对着下颌第一恒磨牙的颊沟

C. 上颌第一恒磨牙的近中颊尖咬

合在下颌第一恒磨牙颊沟的近中

D. 下颌第一恒磨牙的近中颊尖正

对着上颌第一恒磨牙的颊沟

E. 下颌第一恒磨牙的近中颊尖咬

合在上颌第一恒磨牙颊沟的远中

答案：C

解析：

4. 正中(牙合)平衡是指下颌在正中(牙合)位时

- A. 上、下颌后牙间存在着广泛均匀的接触，前牙轻接触或不接触
- B. 上、下颌后牙间存在着广泛均匀的接触，前牙间存在同样的接触
- C. 上、下颌前牙间存在着广泛均匀的接触，后牙轻接触
- D. 前后牙(牙合)力相等
- E. 后牙(牙合)力小于前牙(牙合)





力

答案：E

答案：A

解析：

解析：

7. 眶下孔通入眶下管的方向是

5. 后牙(牙合)运循环中，作为支点的的是

A. 后、下、外

B. 后、上、外

A. 工作侧股突

C. 后、下、内

B. 工作侧磨牙

D. 后、上、内

C. 非工作侧髁突

E. 前、上、内

D. 非工作侧磨牙

答案：B

E. 工作侧尖牙

解析：

答案：C

解析：

8. 在下颌骨内侧面，位于二腹肌

窝后上方的腺窝是

6. 下列髓腔解剖的描述中，错误的是

A. 卵圆窝

B. 舌下腺窝

A. 青少年恒牙的髓腔比老年人大

C. 下颌下腺窝

B. 青少年恒牙的髓角高

D. 二腹肌窝

C. 青少年恒牙的根管粗

E. 腮腺窝

D. 老年人有时发生髓腔部分或全部钙化堵塞

答案：C

E. 乳牙的髓腔绝对比恒牙大

解析：内斜线上方，颞棘两侧有

舌下腺窝与舌下腺相邻；内斜线





下方，中线两侧近下颌体下缘处有不明显的卵圆形凹陷称二腹肌窝。二腹肌窝后上方为下颌下腺窝，与下颌下腺、下颌下淋巴结相邻。

最小

D. 咬肌最大，翼内肌次之，颞肌

最小

E. 翼内肌最大，咬肌次之，颞肌

最小

答案：A

解析：

9. 乳突是下列哪一骨的结构部分

A. 颞骨

B. 颧骨

C. 蝶骨

D. 枕骨

E. 舌骨

答案：A

解析：

11. 炎症牙髓中可以分离到的细

菌不包括

A. 链球菌

B. 放线菌

C. 乳杆菌

D. G⁻杆菌

E. 葡萄球菌

10. 咀嚼肌（颞肌、咬肌、翼内肌）

的肌力大小排列是

A. 颞肌最大，咬肌次之，翼内肌

最小

B. 颞肌最大，翼内肌次之，咬肌

最小

C. 咬肌最大，颞肌次之，翼内肌

答案：E

解析：

12. 根尖周炎的病因不包括

A. 感染

B. 电流刺激

C. 创伤





D. 化学刺激

E. 免疫因素

答案: B

解析: 本题考的知识点是根尖周炎的病因。注意题干提的是否定问题。按操作规程进行的牙髓电活力测验不会引起牙髓和根尖周病。因此, C 是正确答案, 而其他选项都是可能引起根尖周病的物理和化学因素, 均为干扰选项。

13. 根管扩大的标准是

A. 为 25 号锉

B. 至少比初尖锉扩大 1~2 号

C. 至少比初尖锉扩大 2~3 号

D. 按照医师个人习惯

E. 只要牙胶尖能进入根管即可

答案: C

解析: 根管疏通应从细小根管锉(08 号, 10 号, 15 号, 20 号)开始尝试, 能深入根管达到工作长度并与根管壁有摩擦感的第一根

锉, 称为初尖锉。临床上根管扩大的标准一般应比初尖锉至少大 2~3 号, 至少为 25 号。

14. 增生性龈炎的直接病因是

A. 牙石

B. 龋洞

C. 不良卫生习惯

D. 牙菌斑

E. 不良修复体

答案: D

解析: 增生性龈炎的直接病因是牙菌斑。牙石、不良修复体、不良卫生习惯及龋洞属于局部促进因素。

15. 造成牙龈炎的最主要因素是

A. 遗传

B. 全身性疾病

C. 病毒感染

D. 龈上菌斑

E. 龈下菌斑+龈下牙石





答案：D

解析：

16. 关于妊娠期龈炎的治疗原则，说法不正确的是

- A. 去除局部刺激因素是关键
- B. 需口服抗生素，控制炎症
- C. 对于过度增生的牙龈可以择期手术切除
- D. 治疗完成后定期复查
- E. 自我口腔卫生维护很重要

答案：B

解析：

17. 下列与 ANUG 无关的是

- A. 慢性龈炎
- B. 吸烟
- C. 心身因素
- D. 全身消耗性疾病
- E. 精神病

答案：E

解析：

18. 下列关于急性龈乳头炎的说法，错误的是

- A. 局限于个别牙龈乳头的急性非特异性炎症
- B. 不恰当地使用牙签剔牙过尖食物刺伤可引起
- C. 牙菌斑是其直接病因
- D. 牙龈乳头发红肿胀
- E. 有明显探痛，易出血

答案：C

解析：

19. 牙周洁治时，应以哪一手指为支点

- A. 示指
- B. 中指和小指联合支点
- C. 中指和环指联合支点
- D. 环指
- E. 小指

答案：C

解析：





20. 牙周病复查的时间一般为

- A. 1~2 个月复查一次
- B. 3~6 个月复查一次
- C. 9 个月复查一次
- D. 10 个月复查一次
- E. 12 个月复查一次

答案: B

解析: 慢性牙周炎一般第一个疗程结束后, 3~6 个月复诊一次。

21. 重度牙周炎患牙附着丧失达

- A. $\geq 6\text{mm}$
- B. $\leq 5\text{mm}$
- C. $\leq 6\text{mm}$
- D. $< 5\text{mm}$
- E. $\geq 5\text{mm}$

答案: E

解析: 轻中重牙周附着丧失水平分类——轻度: 牙龈有红肿出血, 牙周袋深度 $< 4\text{mm}$, 附着丧失 1~2mm, X 线显示牙槽骨吸收不超

过根长的 1/3 中度: 牙周袋 $< 6\text{mm}$, 附着丧失 3~4mm, X 线显示牙槽骨超过根长 1/3, 但不到根长的 1/2, 牙齿可能出现轻度松动, 牙龈有炎症和探诊出血。重度: 牙周袋深度 $> 6\text{mm}$, 附着丧失 $> 5\text{mm}$, X 线显示牙槽骨吸收大于 1/3, 多数牙有根分叉病变。

22. 口腔科医师应对下列哪一全身免疫缺陷性疾病提高必要的警惕, 对可疑的病例进行恰当和必要的实验室检查以及转诊

- A. Down 综合征 (先天愚型)
- B. 掌跖角化-牙周破坏综合征
- C. 白细胞功能异常
- D. 艾滋病
- E. 急性肾炎

答案: D

解析:

23. 牙周袋加深时, 牙髓受影响的





机会大大增加. 是因为

- A. 细菌的毒力增加
- B. 牙松动度增加
- C. 暴露的侧支根管数量增加
- D. 根面龋引起
- E. 暴露的牙本质小管数量增加

答案: C

解析:

24. 在牙菌斑成熟过程中, 首先吸附到牙面的是

- A. 唾液链球菌
- B. 变形链球菌
- C. 革兰氏阳性球菌
- D. 革兰氏阴性杆菌
- E. 革兰氏阴性厌氧菌

答案: C

解析: 获得性薄膜一旦形成, 口腔内的细菌便陆续地定植于薄膜, 细菌表面与宿主组织表面间存在着高度选择性, 仅少数细菌具有直接附于薄膜的能力。最初附着

的主要是一些革兰氏阳性球菌, 附着机制十分复杂, 这些早期菌的定植又为后期菌的附着提供表面。

25. 融合牙临床表现不正确的是

- A. 冠根完全融合
- B. 冠部融合, 根部分离
- C. 冠部分离, 根部融合
- D. 乳牙列融合多发生在双侧
- E. 乳牙列融合牙比恒牙列多

答案: D

解析:

26. 乳牙龋病对儿童口腔局部影响不正确的是

- A. 咀嚼功能明显降低
- B. 继承恒牙的窝沟龋
- C. 特纳牙的发生
- D. 损伤局部口腔黏膜组织
- E. 继承恒牙萌出过早或过迟

答案: B





解析：局部影响包括：①乳牙龋坏严重时会造成咀嚼功能丧失；②乳牙龋齿发展成根尖周炎后，可影响继承恒牙牙胚，造成其釉质发育障碍，影响恒牙的正常萌出；③乳牙龋坏破损的牙冠易损伤局部口腔黏膜组织；④乳牙因龋病形成龋洞，造成口腔卫生恶化，不良的口腔卫生容易影响新萌出的恒牙发生龋坏。

27. 活髓切断术不适用于

- A. 前牙深龋
- B. 后牙深龋
- C. 部分冠髓牙髓炎
- D. 牙髓坏死
- E. 前牙外伤性冠折露髓

答案：D

解析：年轻恒牙的穿髓孔直径大于 0.5mm，或炎症组织局限在冠髓组织者均适合做活髓切断术。

①深制治疗过程中意外穿髓或冠

髓已感染；②机械性或外伤性露髓或冠髓已感染；③可疑慢性局限性牙髓炎，但无临床症状。

28. 口腔单纯疱疹病毒感染常用的辅助诊断方法不包括

- A. 基因诊断
- B. 涂片查找包涵体
- C. 电镜检查受损细胞
- D. 免疫学检查
- E. 组织活检

答案：E

解析：

29. 以下不属于复发性口疮类型的是

- A. 疱疹样阿弗他溃疡
- B. 重型阿弗他溃疡
- C. 复发性坏死性黏膜腺周围炎
- D. 轻型阿弗他溃疡
- E. Bednar 溃疡

答案：E





解析：复发性口疮常分为轻型、重型和疱疹样阿弗他溃疡，其中重型阿弗他溃疡又称复发性坏死性黏膜腺周围炎或腺周口疮。Bednar 溃疡是婴儿吮吸拇指或过硬的橡皮奶头引起，固定发生于硬腭、双侧翼钩处黏膜表面，呈双侧对称分布，是一种创伤性溃疡，而不属于复发性口疮的类型之一。

30. 口腔白斑病的病理改变不包括

- A. 过度角化或过度不全角化
- B. 颗粒层明显，棘细胞层松解
- C. 上皮钉突增大
- D. 结缔组织中有炎细胞浸润
- E. 可伴有上皮异常增生

答案：B

解析：

31. 慢性非特异性唇炎与以下因

素无关的是

- A. 气候干燥
- B. 超敏反应
- C. 烟酒刺激
- D. 嗜好烫食
- E. 舔唇不良习惯

答案：B

解析：病因不明，多与各种慢性持续性刺激有关，如气候干燥、寒冷、风吹、烟酒或其他机械、化学物质、化妆品、温度、药物等因素。有些患者有舔唇、咬唇等不良习惯，舔唇后，唾液中的水分蒸发，而无机盐、蛋白质等物质停留于唇上，刺激唇黏膜发生炎症反应。有人观察由舔唇、咬唇等不良习惯引起的“人工性唇炎”，可能与患者心理障碍有关，一些人有精神创伤或神经症。艾滋患者的慢性唇炎症状与白念珠菌感染关系密切。





32. 用肥皂液刷洗手和臂时, 浸泡范围应在肘部以上

- A. 5cm
- B. 6cm
- C. 7cm
- D. 8cm
- E. 10cm

答案: E

解析:

33. 对于腮腺区肿物不宜进行的检查是

- A. 细针吸取细胞学检查
- B. CT 或 MRI
- C. 唾液腺造影
- D. 切取活检术
- E. B 超

答案: D

解析: 腮腺和下颌下腺肿瘤禁忌做活检, 因为无论良恶性肿瘤, 均有瘤细胞种植危险。

34. 血压高于多少时应先治疗后拔牙

- A. 120/80mmHg
- B. 130/85mmHg
- C. 140/85mmHg
- D. 160/90mmHg
- E. 180/100mmHg

答案: E

解析: 根据 WHO 的血压界定, 血压低于 120/80mmHg 为正常血压; 高于 140/90mmHg 为异常血压。当收缩压高于 160~180mmHg, 或舒张压高于 100~110mmHg, 应先行治疗高血压。

35. 下列不属于拔牙禁忌证的是

- A. 频发心绞痛
- B. 充血性心力衰竭
- C. 双束支传导阻滞者
- D. 未控制的心律失常
- E. 8 个月前发生过心肌梗死

答案: E





解析:

E. 下颌切牙牙根较细易折断, 故摇动力和旋转力都不能使用

36. 普鲁卡因安全剂量每小时不宜超过

答案: B

A. 1g

B. 1.5g

C. 2g

D. 2.5g

E. 3g

答案: A

解析:

解析: 下颌切牙唇侧及颊侧骨板均较薄, 牙根较短、较细、易折断; 拔牙时必须在充分摇松后使用牵引力量, 不可使用旋转力。

37. 关于下颌切牙拔除描述正确的是

38. 用于智齿冠周炎冲洗的过氧化氢溶液浓度是

A. 1%~3%

B. 0.1%~0.3%

C. 0.3%~0.5%

D. 0.25%~0.5%

A. 下颌切牙与上颌切牙牙根外形类似, 可使用旋转力

E. 5%~10%

B. 下颌切牙牙根较细易折断, 不可使用旋转力

答案: A

解析:

C. 下颌切牙牙根较细易折断, 可稍加旋转力

39. 环甲膜切开术后插管时间最长为

D. 下颌切牙牙根较细但不易折断, 故摇动力和旋转力可同时使用

A. 8 小时

B. 10 小时





C. 12 小时

D. 24 小时

E. 48 小时

答案: E

解析: 环甲膜切开术后的插管时间, 一般不应超过 48 小时。

40. 颌面部损伤患者, 处理不及时
会立即造成生命危险的主要原因
是

A. 出血

B. 感染

C. 休克

D. 窒息

E. 弥散性血管内凝血

答案: D

解析:

41. 额颞部软组织出血的止血方
法是

A. 压迫面动脉

B. 压迫颞浅动脉

C. 压迫上颌动脉

D. 压迫耳后动脉

E. 压迫颞深动脉

答案: B

解析:

42. 口腔颌面部感染的主要途径
是

A. 牙源性感染

B. 腺源性感染

C. 损伤性感染

D. 血源性感染

E. 医源性感染

答案: A

解析: 病原菌通过病变牙或牙周组织进入体内发生感染者, 称牙源性感染。牙齿与颌骨直接相连, 牙体及牙周感染可向根尖、牙槽骨、颌骨以及颌面部蜂窝组织间隙扩散。由于龋病、牙周病、智齿冠周炎均为临床常见病, 故牙源性途径是口腔颌面部感染的主





要途径。

43. 下列咬肌间隙感染的临床表现不包母〔

- A. 常因下颌智牙冠周炎引起
- B. 常伴明显开口受限
- C. 脓肿形成后有明显的压痛点区域骨质暴露
- D. 脓肿形成后，常在咬肌前缘触及波动感
- E. 可向相邻间隙扩散

答案：D

解析：由于咬肌肥厚坚实，脓肿难以自行溃破，也不易触到波动感。

44. 下列颧骨骨折中，复位后不需固定的是

- A. 颧骨体骨折向后下内移位，不伴有转位
- B. 内转位颧骨体骨折
- C. 颧弓骨折

D. 复杂性骨折

E. 颧、上颌骨骨折

答案：C

解析：颧骨和颧弓骨折的治疗主要是手术复位。颧骨和颧弓骨折后，凡有功能障碍者，都应进行复位治疗。如无移位或移位不明显，又无功能障碍，也可不作特殊处理。颧骨和颧弓骨折复位后，为防止骨折段再移位，应适当限制张口运动，避免碰撞，睡眠时应采用健侧卧位。

45. 临床创口分类中包括

- A. 无菌创口、污染创口、感染创口
- B. 污染创口、感染创口、化脓创口
- C. 感染创口、无菌创口、化脓创口
- D. 化脓创口、无菌创口、污染创口





答案：A

解析：临床上无可疑创口之说，
化脓创口是感染创口的一个阶段。

46. 关于舌癌描述错误的是

- A. 多数为鳞癌
- B. 是最常见的口腔癌
- C. 舌后 1/3 癌肿属口咽癌范畴
- D. 生长快，浸润比较强
- E. 主要以血道转移为主

答案：E

解析：

47. 恶性黑色素瘤多来源于

- A. 皮内痣
- B. 交界痣
- C. 复合痣
- D. 毛痣
- E. 雀斑

答案：B

解析：

48. 对放射线不敏感的肿瘤是

- A. 未分化癌
- B. 恶性淋巴瘤
- C. 鳞状细胞癌
- D. 恶性淋巴上皮瘤
- E. 骨肉瘤

答案：E

解析：对放射不敏感的肿瘤应以手术治疗为主，手术前后可给以化学药物作为辅助治疗，这类肿瘤如骨肉瘤、纤维肉瘤、恶性黑色素瘤等。

49. 正颌手术引起牙及骨坏死的原因不包括

- A. 软组织张力过大或覆盖不全引起的小
- B. 切开牙槽骨时损伤两侧牙周或牙根，引
- C. 牙-骨复合体软组织蒂部撕伤或断裂，造成严重供血障碍
- D. 创部感染





E. 患者是乙肝病毒携带者

答案：E

解析：

C. 局部理疗

D. 口服镇静剂

E. 不做特殊处理

答案：E

50. 在面部轴型皮瓣的长宽比例可为

A. 2:1

B. 3:1

C. 4:1

D. 5:1

E. 在血管长轴内不受长宽比例的限制

答案：E

解析：轴型皮瓣又称为动脉皮瓣，特点是有一对知名血管供应和回流，因只要在血管的长轴内设计皮瓣，一般可不受长宽的限制。

解析：出现面瘫是由于麻药麻醉了面神经所导致的，药效过了就可恢复正常。故选 E，不做特殊处理。

52. 三叉神经第三支属于

A. 运动神经

B. 交感神经

C. 感觉神经

D. 混合神经

E. 分泌神经

答案：D

解析：

51. 下牙槽神经阻滞麻醉时出现面瘫的一般处理方法是

A. 注射维生素 B₁、维生素 B₁₂

B. 局部热敷

53. 投照上颌后牙的注意事项是

A. 听眶线与地面平行

B. 听口线与地面平行

C. 听鼻线与地面平行





D. 咬合平面与地面平行

E. 喙突

E. 前牙的唇侧面与地面垂直

答案：E

答案：C

解析：

解析：

54. X 线片表现为根尖周界限清楚的大致圆形透射区，周围无致密线条环绕的是

A. 急性根尖周炎

B. 慢性根尖周脓肿

C. 根尖周肉芽肿

D. 根尖周囊肿

E. 牙瘤

答案：C

解析：

55. 下列不是下颌骨骨折的好发部位的是

A. 正中联合部

B. 颏孔区

C. 下颌角区

D. 髁突颈部

56. X 线表现为唾液腺导管扩张不整，如同“腊肠”状影像的病变是

A. 慢性复发性唾液腺炎

B. 慢性阻塞性唾液腺炎

C. 舍格伦综合征

D. 唾液腺良性肿瘤

E. 唾液腺恶性肿瘤

答案：B

解析：

57. 颞下颌关节紊乱病不包括

A. 咀嚼肌紊乱病

B. 关节结构紊乱病

C. 炎性疾病

D. 关节强直

E. 骨关节病

答案：D





解析：

E. 黏液表皮样癌

答案：B

58. 颞下颌关节紊乱病关节间隙

解析：

改变最常见的，X线表现是

A. 前间隙变窄，后间隙增宽，髁突位置前移

B. 前间隙增宽，后间隙变窄，髁突位置后移

C. 整个关节间隙变窄，髁突位置上移

D. 整个关节间隙增宽，髁突位置下移

E. 以上均为常见表现

答案：B

解析：

59. 唾液腺肿瘤中几乎仅发生于腮腺的是

A. 腺泡细胞癌

B. 沃辛瘤

C. 腺样囊性癌

D. 多形性腺瘤

60. 黏液囊肿好发于

A. 腭部

B. 颊部

C. 下唇及舌尖腹侧

D. 上唇及舌尖腹侧

E. 下唇及舌根腹侧

答案：C

解析：

61. 腮腺“临界瘤”中最常见的是

A. 圆柱瘤

B. 多形性腺瘤

C. 腺淋巴瘤

D. 腺瘤

E. 神经纤维瘤

答案：B

解析：



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



62. 投照下颌下腺导管结石的 X

D. 9 天

线片检查首选

E. 10-14 天

A. 下颌下腺造影

答案: E

B. 下颌体腔片

解析:

C. 下颌曲面体层片

D. 下颌下腺侧位片加下颌横断牙
合片

64. 进行单侧唇裂整复术最适合
的年龄为

E. 下颌骨侧位片加下颌横断牙
合片

A. 出生后即刻

B. 1~2 个月

答案: D

C. 3~6 个月

解析: 确诊应做 X 线检查, 下颌
下腺涎石应投照下颌横断牙合片

D. 6~12 个月

E. 1~2 岁

及下颌下腺侧位片, 前者适用于

答案: C

下颌下腺导管结石的 X 线照射技
术, 后者适用于下颌下腺导管结

解析:

石的造影技术。

65. 预防医学是研究环境因素与

63. 牙槽突裂植骨术后拆线时间
是

A. 人体内环境的关系

B. 人体外环境的关系

C. 人体健康的关系

A. 5 天

D. 人体状况的关系

B. 7 天

E. 人体功能的关系

C. 8 天

答案: C





解析：预防医学以个体和确定的群体为对象，目的是保护、促进和维护健康，预防疾病、失能和早逝。强调环境与人群的相互依赖、相互作用和协调发展，研究的是各种环境因素对人群健康和疾病的作用规律。

答案：A

解析：环境有害因素危险度评价的组成包括：①危害鉴定；②暴露评价；③剂量-反应关系评价；④危险度特征分析。危险度检测不属于环境对人类健康影响危险度的评价。

66. 环境对人类健康影响的危险度评价包括

A. 危害鉴定、暴露评定、剂量-反应关系评定、危险度特征分析
B. 危害鉴定、暴露评定、暴露因素评定、危险度特征分析

C. 最高容许浓度评定、暴露评定、剂量-反应关系评定、危险度特征分析
D. 危害鉴定、间接效应评定、剂

量-反应关系评定、危险度特征分析
E. 危害鉴定、暴露评定、相关性

评定、危险度特征分析

67. 膳食纤维素的营养作用不包括

A. 供给机体热能
B. 降低血胆固醇
C. 刺激肠蠕动
D. 预防大肠病、直肠癌

E. 增加粪便体积

答案：A

解析：

68. 小白菜在烹调过程中最易损失的营养素为

A. 维生素 A
B. 维生素 E





C. 维生素 D

D. 维生素 B

E. 维生素 C

答案: E

解析:

69. 计算样本率的抽样误差适用

公式为

A. $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$

B. $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n-1}}$

C. $\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}$

D. $\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n-1}}$

E. $\sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}$

答案: A

解析:

70. 发生以下重大医疗过失行为时, 医疗机构应向所在地卫生行政部门报告

A. 可能是二级医疗事故的

B. 可能是三级医疗事故的

C. 患者因病死亡的

D. 导致 1 人人身损害后果的

E. 导致 2 人人身损害后果的

答案: A

解析:

71. 根据母婴保健法, 婚前医学检查的主要内容是指

A. 进行性卫生知识、生育知识的教育

B. 进行遗传病知识的教育

C. 对有关婚配问题提供医学意见

D. 对有关生育保健问题提供医学意见

E. 对严重遗传疾病、指定传染病等的检查

答案: E

解析:

72. 医疗机构发现甲类传染病时应当采取下列措施, 除外



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



A. 对患者予以隔离治疗

批准

B. 对疑似患者，确诊前在指定场所隔离治疗

E. 由主治医师申请并经患儿家属签同意

C. 拒绝隔离治疗的由公安机关协助采取强制隔离治疗措施

答案：B

D. 对病原携带者予以隔离治疗

解析：

E. 对医疗机构内疑似患者的密切接触者，在指定场所进行医学观察

答案：B

解析：《中华人民共和国传染病防治法》中特别指出是在指定场所单独隔离治疗。

74. 何某因意外事故受伤被同事送到医院抢救，何某被送到医院时已昏迷，此时何某急需输血治疗，但其家人还未赶到医院，对何某输血时采取的以下措施符合临床输血技术规范的是

A. 报何某所在单位同意、备案，并记入病历

73. 新生儿溶血病如需要换血疗法的

B. 在何某家人赶到同意后再输血

A. 由患儿家属申请并签字同意

C. 报医院主管领导同意、备案，并记入病历

B. 由经治医师申请并经患儿家属签与同意

D. 报经治医师所在科室主任同意、备案，. 并记入病历

C. 由主治医师申请并经患儿监护人同意

E. 由何某同事同意并签字、备案，并记入病历

D. 由经治医师申请并经主治医师

答案：C





解析：无家属签字的无自主意识患者的紧急输血，应报医院职能部门或主管领导同意、备案，并记入病历。

B. 可复性牙髓炎

C. 急性牙髓炎

D. 慢性牙髓炎

E. 急性根尖周炎

答案：C

解析：

75. 患者，男，30岁。主诉右面部放射性疼2天。对于鉴别是否为牙源性疼痛最有值的检查手段是

A. 照曲面体层片

B. 叩诊和牙髓电活力检查

C. 选择性麻醉

D. 问诊和探诊

E. 牙齿松动度检查

答案：B

解析：

77. 患者因弱坏充填治疗后1年，牙齿折裂，要求治疗。检查(6)银汞充填体，近远中牙冠纵向劈裂达根部，下面不是造成牙冠劈裂原因的是

A. 洞壁有悬釉

B. 剩余牙体组织过少

C. 咬合创伤

D. 充填体过大

E. 充填材料选择不当

答案：E

解析：

76. 患者，14岁，右下后牙夜间痛1天。检查右下第一前磨牙咬合面畸形，中央尖折断痕迹，冷测引起剧痛，叩痛(-)。诊断为

A. 急性龋

78. 患者半年来因右侧后牙咬合痛、冷热痛要求治疗。检查6|无





龋，近中可疑隐裂，冷热测引起疼痛，刺激去除后，持续数秒，叩诊(±)。右侧后牙不同程度磨损，探诊敏感。该患者主诉牙治疗原则为

- A. 不治疗
- B. 调牙合
- C. 脱敏
- D. 牙髓治疗后全冠修复
- E. 备洞充填

答案：D

解析：

79. 患者，男，35 岁。因左下后牙食物嵌塞 2 年多就诊。检查左下第二前磨牙龋深达髓腔，牙髓无活力，叩诊略异样感，X 线片见根尖周透射区 3mmx5mm. 边界较清楚。该主诉牙应明确诊断为

- A. 慢性根尖周炎
- B. 慢性根尖周脓肿
- C. 根尖周囊肿

- D. 慢性牙髓炎
- E. 有瘘型根尖周脓肿

答案：A

解析：

80. 患者，男，67 岁。左下第一磨牙因重度磨耗露髓，拟行根管治疗。常规根管治疗的步骤为

- A. 根管清创、预备和充填
- B. 根管封药和充填
- C. 根管清创和充填
- D. 根管预备、消毒和充填
- E. 根管清创、封药和充填

答案：D

解析：

81. 患者，女，22 岁。主诉近 3 年来，咀嚼硬物或刷牙时牙龈出血。若诊断为慢性龈炎，牙龈炎症不具有的临床表现是

- A. 牙龈炎症一般局限于游离龈和龈乳头





B. 牙龈炎症以上前牙区最为显著

C. 炎症以前牙区为主，也可波及全口牙

D. 牙龈松软光亮

E. 严重时波及附着龈

答案：B

解析：慢性龈炎牙龈炎症一般局限于游离龈和龈乳头，严重时波及附着龈，炎症以前牙区为主，也可波及全口牙，牙龈松软光亮。但是牙龈炎症以下前牙区最为显著。因此本题的正确答案为B。

E. 逆行性牙髓炎

答案：B

解析：

83. 患者，男，54岁。刷牙出血2年，冷热刺激酸痛，无自发痛，下前牙咬合无力半年。检查 C-S 3. 牙龈充血肿胀，牙龈退缩 3mm，上、下磨牙牙周袋深 5~6mm. 下前牙松动度。初步诊断应为

A. 龈炎

B. 慢性牙周炎

C. 侵袭性牙周炎

D. 牙髓炎

E. 青少年后期牙周炎

答案：B

解析：

82. 患者，男，22岁。左下后牙

突然自发性疼痛1天，否认咬硬物史。临床检查局部牙龈乳头充血水肿，牙间有食物嵌塞，探痛明显。其最可能的诊断是

A. 妊娠期龈炎

B. 急性牙龈乳头炎

C. 牙根折裂

D. 急性坏死性溃疡性龈炎

84. 患者，男，47岁。数月来右上后牙进食时疼痛，刷牙后缓解。检查口腔卫生差 CI-S 3，牙龈轻度充血水肿，18颊向错位、伸长





无对颌牙，17 和 18 间有较多食物嵌塞，龈乳头中度充血水肿，压痛，未探及牙周袋。导致该症状出现的局部促进因素是

- A. 牙石
- B. 食物嵌塞
- C. 咬合创伤
- D. 错牙合畸形
- E. 牙菌斑

答案：B

解析：

E. 不宜单侧咀嚼

答案：B

解析：

86. 患儿，1 岁。近来哭闹拒食，嘴角流涎，伴有发热，舌腹、硬腭及牙龈均可见簇集的针头大小透明水疱，拟诊断为

- A. 白念珠菌病
- B. 急性坏死性龈口炎
- C. 原发性疱疹性口炎
- D. 复发性疱疹性口炎
- E. 球菌性口炎

答案：C

解析：

85. 患儿，男，7 岁。喜食巧克力，右下颌第一恒磨牙刚萌出，已见窝沟浅龋。医生向家长宣传饮食管理的概念，不正确的是

- A. 提示家长不过多地让儿童摄取蔗糖
- B. 饮料是流动性的液体，不易引起龋齿
- C. 控制点心和零食的次数与量
- D. 不宜偏食

87. 患者，女，48 岁。牙龈充血糜烂，呈剥脱状损害，刷牙出血，舌背可见左右对称性分布椭圆形珠光白色斑块，表面舌乳头萎缩，触之柔软，双侧颊黏膜也有类似斑纹改变，最可能的诊断是





A. 坏死性龈口炎

B. 白色角化病

C. 白斑病

D. 口腔扁平苔藓

E. 盘状红斑狼疮

答案：D

解析：

88. 患者，男，55 岁。吸烟 25 年，每日至少 1 包，近来舌背左侧发现一处白色斑块，大小约 1.5cmx

2.0cm，界限清楚，无明显自觉症状，口腔内其余黏膜未见类似病变，首先应该做的是

A. 根治手术

B. 维 A 酸乳膏局部涂擦

C. 口服肾上腺皮质激素

D. 口服绞股蓝

E. 戒烟

答案：E

解析：根据本例中的临床表现以及长期吸烟史，最可能的诊断为

斑块状白斑，口腔白斑病属于癌前病变，一部分口腔白斑病可转化为癌，但是对于该病首先应该做的是卫生宣教及去除刺激因素，如戒烟襟酒，少吃烫、辣食物，去除残根、残冠、不良修复体等；对于有癌变倾向的病损类型、部位，应定期严密复查，如有增生、硬结、溃疡等改变时才应手术切除活检。

89. 患者，男，30 岁。因上颌第三恒磨牙拔除上牙槽后神经阻滞麻醉后，出现患侧面肿胀，可能的原因是

A. 感染

B. 炎症

C. 麻醉药敏感

D. 翼静脉丛损伤

E. 注射过量

答案：D

解析：





D. 创伤性

90. 患者右上后牙拔牙后 3 天，麻

E. 医源性

药注射区局部红肿，触痛明显，

答案：A

皮肤发热，有轻度张口受限，引

解析：

起疼痛的原因是

A. 注射针头弯曲损伤组织

B. 损伤血管引起血肿

C. 消毒不严格引起深部组织感染

D. 损伤神经

E. 麻药注入翼内肌内

92. 患者，男，40 岁。口底多间

隙感染，肿胀明显，可触及捻发

音及波动感，主诉呼吸困难下列

处理正确的是

A. 加大抗生素剂量

B. 局部热敷

C. 穿刺抽脓

D. 广泛切开引流

答案：C

解析：

91. 患儿，女，7 岁。根尖脓肿伴

E. 局限性切开引流后加压包扎

左下颌下淋巴结肿大，根尖周脓

答案：D

肿切开引流后好转但下颌下区肿

解析：

痛加重，局部皮肤发红并出现波

动感，此下颌下区感染来源最可

93. 患者，男，32 岁。颌面部跌

能为

伤 4 小时。口腔检查下颌偏向左

A. 牙源性

侧，不能向左侧做侧牙合运动。

B. 腺源性

前牙及左侧后牙开牙合，上、下

C. 血源性

牙列未见明显骨折段移位。初步





诊断为

- A. 双侧髁突骨折
- B. 颏部正中骨折
- C. 颏孔区骨折
- D. 下颌角部骨折
- E. 单侧髁突骨折

答案：E

解析：

94. 患者，男，30岁。颌面部受击打伤3小时。口腔检查下颌颏部软组织红肿，口腔内外未见创口，咬合关系无异常。下颌正位片示下颌颏部正中有骨折线影像。

正确的固定方法是

- A. 手术切开骨间固定
- B. 牙弓夹板固定
- C. 骨钉加金属支架固定
- D. 克氏针内固定
- E. 皮质骨螺钉固定

答案：B

解析：

95. 某患者一侧下颌骨磨牙区、下颌角及升支部渐进性膨大，X线片示透明囊性阴影，呈多房性，房室大小极不一致，阴影边缘呈切迹状。最可能的诊断是

- A. 牙源性角化囊肿
- B. 成釉细胞瘤
- C. 牙源性黏液瘤
- D. 牙源性钙化囊肿
- E. 牙源性纤维瘤

答案：B

解析：

96. 患者，男，9岁。舌体外伤出现部分组织缺损，下列处理原则正确的是

- A. 细针细线缝合
- B. 缝合不宜过深过宽
- C. 保持舌体长度
- D. 保持舌体宽度
- E. 保持舌体厚度





答案：C

解析：

E. 受检者回忆有偏差

答案：C

解析：

97. 一患者以颞下颌关节开口末、

闭口初单音弹响就诊。X 线片显

示髁突开口位时超过关节结节，

你认为该患者所患疾病是

A. 翼外肌痉挛

B. 翼外肌功能亢进

C. 颞肌痉挛

D. 咬肌痉挛

E. 关节盘移位

答案：B

解析：

99. 患儿，男，2 岁。由父母亲陪

同去口腔科就诊，母亲要求医生

为小孩作乳牙窝沟封闭。医生认

为该小孩目前不需做窝沟封闭，

其主要原因是

A. 乳牙不需做窝沟封闭

B. 现阶段儿童不易患龋

C. 封闭剂的氟释放，儿童易误吞

造成氟中毒

D. 乳牙窝沟封闭年龄一般应为

3~4 岁

E. 乳牙有机质多，封闭剂易脱落

98. 口腔健康调查前的准备阶段，

技术组专家告诫调查人员，出现

信息偏性的重要原因是

A. 漏查了一些受检者

B. 检查对象代表性差

C. 检查器械不统一

D. 标准掌握不一致

答案：D

解析：

100. 患者，女，担心使用牙签会

使牙缝增宽，医生告诉她正确使

用牙签的方法是





A. 轻轻置入龈沟底部，向龈方运 解析：

动清洁

B. 轻轻置入龈沟底部，向冠方运 102. 预防口腔医学教学中，教师

动清洁 强调临床控制，交叉感染的重点

C. 置入牙间隙，轻轻上下运动清 是

洁

A. 手部的消毒

D. 置入牙间隙，轻轻左右运动清 B. 空气的消毒

洁

C. 地表的消毒

E. 视需要向各个方向运动清洁 D. 机头的消毒

答案：B E. 废物的处理

解析： 答案：D

解析：

101. 某同学准备去幼儿园对儿童

进行口腔健康教育，在准备口腔

健康教育材料时教授提醒他应特

别注意以下内容，除外

A. 准确性

B. 知识性

C. 创新性

D. 趣味性

E. 艺术性

答案：C

103. 关于在小学为期两年的含氟

牙膏防弱临床试验中用何种龋病

指数，课题组认为最佳指数是

A. dmft

B. dmfs

C. DMFT

D. DMFS

E. Def t

答案：D





解析：该题为简单应用题，要求熟悉各种胡病指数和氟化物的局部应用。6 岁以后，恒牙逐渐萌出，此时用含氟牙膏对预防制病的效果较好，因此用 DMFS 能较敏感地反映出含氟牙膏的效果。

104. 充填后咀嚼时疼痛

- A. 意外露髓
- B. 充填体脱落
- C. 继发龋
- D. 乳牙内吸收
- E. 充填体过高

答案：E

解析：

105. 直接盖髓术的适应证是

- A. 意外露髓
- B. 充填体脱落
- C. 继发龋
- D. 乳牙内吸收
- E. 充填体过高

答案：A

解析：

106. 制备洞形时，感染的软化牙本质未去净，预防性扩展不够，易导致

- A. 意外露髓
- B. 充填体脱落
- C. 继发龋
- D. 乳牙内吸收
- E. 充填体过高

答案：C

解析：

107. 属于病毒感染性疾病的是

- A. 侵袭性牙周炎
- B. 艾滋病
- C. 慢性牙周炎
- D. 牙周-牙髓联合病变
- E. 牙龈炎

答案：B

解析：





108. 逆行性牙髓炎属于

A. 侵袭性牙周炎

B. 艾滋病

C. 慢性牙周炎

D. 牙周-牙髓联合病变

E. 牙龈炎

答案：D

解析：

109. 与异常的宿主反应有关的牙周炎是

A. 侵袭性牙周炎

B. 艾滋病

C. 慢性牙周炎

D. 牙周-牙髓联合病变

E. 牙龈炎

答案：A

解析：

110. 牙齿受外力完全脱出牙槽骨

A. 牙齿震荡

B. 牙冠折断

C. 牙体损伤

D. 牙周损伤

E. 牙齿移位

答案：E

解析：

111. 牙齿外伤后，没有牙齿硬组织缺损和牙齿移位，主要影响牙周和牙髓组织

A. 牙齿震荡

B. 牙冠折断

C. 牙体损伤

D. 牙周损伤

E. 牙齿移位

答案：A

解析：

112. 血管神经性水肿的临床表现是

A. 唇肿胀、糜烂、干燥、脱屑、

结痂，疣状或颗粒状增生，可出





现白色条纹

B. 有日光照射史，唇红部以糜烂
为主要特征

C. 唇肿胀，触之有散在、粟粒状
小结节有透明黏液溢出于唇表面，
呈水珠状

D. 唇弥漫性肿胀，柔软而有弹性

E. 唇突然肿胀，触之韧而有弹性。

肿胀消退较快

答案：E

解析：

113. 光化性唇炎的临床表现是

A. 唇肿胀、糜烂、干燥、脱屑、
结痂，疣状或颗粒状增生，可出
现白色条纹

B. 有日光照射史，唇红部以糜烂
为主要特征

C. 唇肿胀，触之有散在、粟粒状
小结节有透明黏液溢出于唇表面，
呈水珠状

D. 唇弥漫性肿胀，柔软而有弹性

E. 唇突然肿胀，触之韧而有弹性。

肿胀消退较快

答案：B

解析：

114. 腺性唇炎的临床表现是

A. 唇肿胀、糜烂、干燥、脱屑、
结痂，疣状或颗粒状增生，可出
现白色条纹

B. 有日光照射史，唇红部以糜烂
为主要特征

C. 唇肿胀，触之有散在、粟粒状
小结节有透明黏液溢出于唇表面，
呈水珠状

D. 唇弥漫性肿胀，柔软而有弹性

E. 唇突然肿胀，触之韧而有弹性。

肿胀消退较快

答案：C

解析：

115. 肉芽肿性唇炎的临床表现是

A. 唇肿胀、糜烂、干燥、脱屑、





结痂，疣状或颗粒状增生，可出现白色条纹

B. 有日光照射史，唇红部以糜烂为主要特征

C. 唇肿胀，触之有散在、粟粒状小结节有透明黏液溢出于唇表面，呈水珠状

D. 唇弥漫性肿胀，柔软而有弹性

E. 唇突然肿胀，触之韧而有弹性。肿胀消退较快

答案：D

解析：

116. 面神经颊支损伤表现为

A. 眼睑闭合不全

B. 额部皱纹消失

C. 鼻唇沟变浅

D. 伸舌偏向患侧

E. 下唇歪斜

答案：C

解析：

117. 面神经颞支损伤表现为

A. 眼睑闭合不全

B. 额部皱纹消失

C. 鼻唇沟变浅

D. 伸舌偏向患侧

E. 下唇歪斜

答案：A

解析：

118. 移位明显的骨折，不能手法

复位的，需要

A. 暂时制动

B. 牙间结扎

C. 颌间结扎

D. 切开复位内固定术

E. 暂不处理，随访

答案：D

解析：

119. 没有移位的骨折，需要

A. 暂时制动

B. 牙间结扎





C. 颌间结扎

解析:

D. 切开复位内固定术

E. 暂不处理, 随访

答案: E

解析:

120. 单侧唇裂修复术的时间是

A. 3~6 个月

B. 12~15 个月

C. 4~6 岁

D. 9~11 岁

E. 16 岁以后

答案: A

解析:

121. 腭裂修复术的时间是

A. 3~6 个月

B. 12~15 个月

C. 4~6 岁

D. 9~11 岁

E. 16 岁以后

答案: B

122. 语音评价及语音训练治疗时间是

A. 3~6 个月

B. 12~15 个月

C. 4~6 岁

D. 9~11 岁

E. 16 岁以后

答案: C

解析:

123. 氟化物的吸收率与胃内 pH 的关系

A. 正比关系

B. 反比关系

C. 无关系

D. 无线性关系

E. 有正比, 也有反比关系

答案: B

解析:



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



124. 骨氟含量实际沉淀率与年龄的关系

- A. 正比关系
- B. 反比关系
- C. 无关系
- D. 无线性关系
- E. 有正比，也有反比关系

答案：B

解析：

125. 肾的氟清除率与尿 pH 的关系

- A. 正比关系
- B. 反比关系
- C. 无关系
- D. 无线性关系
- E. 有正比，也有反比关系

答案：A

解析：该题考查考生对人体氟代谢的掌握。氟在机体内的吸收受到多种因素的影响。胃内 pH 影响氟的吸收速率，两者呈负相关关

系。骨氟含量随摄入氟的量和年龄而增长，但是骨氟含量实际沉淀率与年龄呈负相关关系。肾脏是体内氟的主要排泄途径，肾脏的氟清除率与尿 pH 和流速呈正比关系。

126. 牙釉质发育不全的临床特征是

- A. 牙釉质表面发生白垩色改变，部分牙釉质缺损
- B. 牙釉质有缺损，其他部位牙釉质正常
- C. 牙釉质表面有可被去除的色素附着
- D. 牙釉质表面有光泽，牙冠色暗黄
- E. 牙釉质表面有白垩色斑，边界清楚

答案：E

解析：





127. 氟牙症的临床特征是

黄

A. 牙釉质表面发生白垩色改变，
部分牙釉质缺损

E. 牙釉质表面有白垩色斑，边界
清楚

B. 牙釉质有缺损，其他部位牙釉
质正常

答案：D

C. 牙釉质表面有可被去除的色素
附着

解析：

D. 牙釉质表面有光泽，牙冠色暗
黄

E. 牙釉质表面有白垩色斑，边界
清楚

答案：A

解析：

129. 医疗机构违反法律规定，给
药品使用者造成损害的

A. 由卫生行政部门给予处分，没
收违法所得

B. 由工商行政管理部门处 1 万元
以上 20 万元以下的罚款

C. 由卫生行政部门吊销其执业证
书

128. 四环素牙的临床特征是

D. 依法追究刑事责任

A. 牙釉质表面发生白垩色改变，
部分牙釉质缺损

E. 依法承担赔偿责任

B. 牙釉质有缺损，其他部位牙釉
质正常

答案：E

解析：

C. 牙釉质表面有可被去除的色素
附着

D. 牙釉质表面有光泽，牙冠色暗

130. 医疗机构负责人收受药品生
产企业给予的财物的

A. 由卫生行政部门给予处分，没





收违法所得

B. 由工商行政管理部门处 1 万元以上 20 万元以下的罚款

C. 由卫生行政部门吊销其执业证书

D. 依法追究刑事责任

E. 依法承担赔偿责任

答案：A

解析：

131. 医疗机构在药品购销中暗中给予、收受回扣或者其他利益的

A. 由卫生行政部门给予处分，没收违法所得

B. 由工商行政管理部门处 1 万元以上 20 万元以下的罚款

C. 由卫生行政部门吊销其执业证书

D. 依法追究刑事责任

E. 依法承担赔偿责任

答案：B

解析：

132. 患儿，女，7 岁。右上颌中切牙外伤冠折、切角缺损，即刻来院就诊。口腔检查发现穿髓孔大，探痛明显，可疑叩痛。治疗首选

A. 直接盖髓术

B. 活髓切断术

C. 拔髓术

D. 根管治疗术

E. 塑化疗法

答案：B

解析：

133. 患儿，女，7 岁。右上颌中切牙外伤冠折、切角缺损，即刻来院就诊。口腔检查发现穿髓孔大，探痛明显，可疑叩痛。进行这种治疗成功的关键是

A. 保证患者无痛

B. 保持操作无菌

C. 止血彻底

D. 盖髓剂的选择





E. 拔髓彻底

确答案为 C。

答案：B

解析：

135. 患者，男，45 岁。患慢性牙周炎多年，昨日起右下后牙自发性阵发性疼痛液间加重，手持冷水瓶就诊。检查右下第一磨牙度松动，叩痛(+)。颊侧牙周袋 6mm。为了进一步确诊，还需要进行的检查是

134. 患儿，女，7 岁。右上颌中切牙外伤冠折、切角缺损，即刻来院就诊。口腔检查发现穿髓孔大，探痛明显，可疑叩痛。若治疗成功，家长要求修复缺损的牙冠应

A. 局麻备牙，全冠修复

A. 麻醉测验

B. 桩冠修复

B. 冷测验

C. 复合树脂修复

C. 热测验

D. 切角嵌体

D. 染色法测验

E. 解释病情，待患儿成年后再作修复

E. 咬诊法测验

答案：C

答案：C

解析：

解析：儿童前牙冠折行活髓切断术后，由于颌面部正处于生长发育期且外伤牙疗效仍需定期观察，不宜采用永久性修复方法，可用复合树脂暂时修复，待成年后改用其他的永久性修复方法，故正

136. 患者，男，45 岁。患慢性牙周炎多年，昨日起右下后牙自发性阵发性疼痛液间加重，手持冷水瓶就诊。检查右下第一磨牙度松动，叩痛(+)。颊侧牙周袋 6mm。





右下第一磨牙的诊断应该为

答案：D

A. 慢性根尖周脓肿

解析：

B. 慢性根尖周囊肿

C. 慢性根尖周肉芽肿

D. 逆行性牙髓炎

E. 急性牙髓炎

答案：D

解析：

137. 患者，男，45岁。患慢性牙周炎多年，昨日起右下后牙自发性阵发性疼痛夜间加重，手持冷水瓶就诊。检查右下第一磨牙度松动，叩痛(+)。颊侧牙周袋6mm。

138. 患者，男，21岁，诉牙松动1年余。口腔检查 C-S 2，上前牙呈扇形排列，4颗第一恒磨牙；牙周袋深约6mm，松动度。拟初步诊断为

A. 青少年后期牙周炎

B. 慢性牙周炎

C. 侵袭性牙周炎

D. 快速进展型牙周炎

E. 成人牙周炎

答案：C

主诉进行温度测验的结果为

解析：

A. 无反应

B. 短暂的轻度或中度不适

C. 出现疼痛，但刺激去除后即刻消失

D. 出现疼痛，刺激去除后持续一段时间

E. 出现剧烈疼痛

139. 患者，男，21岁，诉牙松动1年余。口腔检查 C-S 2，上前牙呈扇形排列，4颗第一恒磨牙；牙周袋深约6mm，松动度。该病的主要致病菌为

A. 牙龈卟啉单胞菌





B. 中间普氏菌

C. 伴放线放线杆菌（伴放线聚集杆菌）

D. 福赛类杆菌

E. 核梭形杆菌

答案：C

解析：

140. 患者，男，21 岁，诉牙松动

1 年余。口腔检查 C-S 2，上前牙

呈扇形排列，4 颗第一恒磨牙；牙

周袋深约 6mm，松动度。如该患

者患有糖尿病，治疗牙周炎时，

就诊时间应尽量安排在

A. 下午 2~3 点

B. 早餐前

C. 午餐前

D. 早餐及服药后 1.5 小时

E. 午餐及服药后 1.5 小时

答案：D

解析：现代人体力劳动少，摄取

脂肪与糖类的量较多，肥胖者增

多，造成糖尿病发生的概率就相

应增加。处理上述患有糖尿病的

牙周炎患者时，就诊时间应尽量

安排在早餐及服药后 1.5 小时，

治疗过程中还应观察有无低血糖

出现。治疗时还应减轻其疼痛和

紧张心情，因为内源性肾上腺素

的分泌可能增加对胰岛素的需求。

141. 患者，男，36 岁。外伤术后，

目前正在接受抗生素治疗。发现

近几天味觉减退，口腔黏膜干燥

并有灼痛，舌背黏膜充血发红，

舌乳头萎缩明显。结合病史，最

可能的诊断是

A. 萎缩性舌炎

B. 口干综合征

C. 烟酸缺乏症

D. 白念珠菌（白假丝酵母菌）感

染

E. 扁平苔藓

答案：D





解析：

的方法是

142. 患者，男，36岁。外伤术后，目前正在接受抗生素治疗，发现近几天味觉减退，口腔黏膜干燥并有灼痛，舌背黏膜充血发红，舌乳头萎缩明显。为了明确诊断，首先应该进行

- A. 肝功能检查
- B. 出凝血时间测定
- C. 泪液分泌功能测定
- D. 唾液培养
- E. 直接免疫荧光检查

答案：D

解析：

- A. 组织病理检查
- B. 血常规检查
- C. 腮腺造影检查
- D. 免疫功能检测
- E. 直接涂片检查

答案：E

解析：

144. 患者，男，36岁。外伤术后，目前正在接受抗生素治疗，发现近几天味觉减退，口腔黏膜干燥并有灼痛，舌背黏膜充血发红，舌乳头萎缩明显。本病可以采用

的药物治疗是

143. 患者，男，36岁。外伤术后，目前正在接受抗生素治疗，发现近几天味觉减退，口腔黏膜干燥并有灼痛，舌背黏膜充血发红，舌乳头萎缩明显。初步获得检查结果后，还可以考虑进一步检查

- A. 1.0%~1.5%过氧化氢溶液局部治疗
- B. 2.0%~4.0%碳酸氢钠溶液局部治疗
- C. 补充维生素
- D. 补充烟酸
- E. 口服磷酸氯喹片



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



答案：B

解析：

145. 患者，男，47 岁。右下颌后牙反复肿痛 3 个月。口腔检查右下第三磨牙萌出不全，远中有盲袋，冠周无明显炎症。X 线片示右下第三磨牙横向生长，牙冠朝向右下第二磨牙远中根，牙根距离下颌管 2mm。无明显龋坏。拟拔除右下第三磨牙，所需麻醉的神经是

- A. 下牙槽神经+舌神经
- B. 下牙槽神经+颊神经
- C. 下牙槽神经+颊神经+舌神经
- D. 下牙槽神经+舌神经+颊神经
- E. 下牙槽神经+舌神经+颊神经+咬肌神经

答案：C

解析：

146. 患者，男，47 岁。右下颌后

牙反复肿痛 3 个月。口腔检查右下第三磨牙萌出不全，远中有盲袋，冠周无明显炎症。X 线片示右下第三磨牙横向生长，牙冠朝向右下第二磨牙远中根，牙根距离下颌管 2mm。无明显龋坏。右下第三磨牙经切开去骨后艰难拔除，拔除 1 周复诊，出现右下唇麻木，创口无感染。为明确诊断需

- A. X 线片检查
- B. 麻醉下搔刮牙槽窝
- C. 麻醉下探查牙槽窝
- D. 口服抗生素
- E. 服用神经营养药

答案：A

解析：

147. 一患者左颞下颌关节在开口、咀嚼时疼痛，无自发痛，检查发现开口中度受限、开口型偏向左侧，左髁突后方明显压痛，未见红肿。其诊断应该是





- A. 左翼外肌痉挛
- B. 左关节盘后区损伤
- C. 左关节囊附丽松弛
- D. 左髁突破坏
- E. 左关节盘穿孔

答案：B

解析：

148. 一患者左颞下颌关节在开口、咀嚼时疼痛，无自发痛，检查发现开口中度受限、开口型偏向左侧，左髁突后方明显压痛，未见红肿。其治疗应选用

- A. 0.5%或 1%普鲁卡因封闭
- B. 2%普鲁卡因 2~3ml 封闭
- C. 泼尼松龙 0.5~0.8ml 局部封闭
- D. 复位错牙合治疗
- E. 髁突高位切除加关节盘摘除

答案：C

解析：

149. 患者，男，18 岁。先天性完

全性腭裂 4 岁时行腭裂修复术，现腭前部牙槽突仍有裂隙与鼻腔相通，下前牙反牙合，上颌牙拥挤，面中部凹陷，面下部前突。

腭裂修复术后，语音功能恢复正常

的必要

条件是

- A. 软腭有长度
- B. 患儿牙列完整，排列整齐
- C. 悬雍垂外形良好
- D. 发音时能形成良好的腭咽闭合
- E. 患儿咽后壁上派氏嵴明显

答案：D

解析：

150. 患者，男，18 岁。先天性完全性腭裂 4 岁时行腭裂修复术，现腭前部牙槽突仍有裂隙与鼻腔相通，下前牙反牙合，上颌牙拥挤，面中部凹陷，面下部前突。

腭裂修复术后，因咽腔过宽需行缩小咽腔手术。下列属于缩小咽





微信搜一搜



金英杰口腔学院

腔的手术术式的是

- A. 三瓣法
- B. 四瓣法
- C. 兰氏法
- D. 改良兰氏法
- E. 腭咽肌瓣成形术

答案：E

解析：



金英杰口腔学院



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院