



2020 口腔 执业 (助理) 医师考试

王牌直播

核心考点精学笔记

- ◆ 核心考点
- ◆ 习题跟踪
- ◆ 名师精讲
- ◆ 重难剖析



金英杰独家资料 (电子版)



金英杰直播学院

JINYINGJIE.COM



金英杰医学

JINYINGJIE.COM

月度考试

- 1、（A1 型题）上、下中切牙切缘间距在 1 cm 以内称为
 - A.轻度张口受限
 - B.中度张口受限
 - C.中重度张口受限
 - D.重度张口受限
 - E.完全性张口受限

- 2、（A1 型题）皮肤创口缝合后过度外翻是因为
 - A.进针点距创缘过远
 - B.两侧进针深度不一致
 - C.皮肤切口两侧进针间距大于皮下间距
 - D.皮肤切口两侧进针间距小于皮下间距
 - E.打结过紧

- 3、（A1 型题）冰冻活检的标本切取后应
 - A.立即放入 10% 甲醛固定液中
 - B.立即放入 3% 戊二醛固定液中
 - C.立即放入 75% 酒精中脱水
 - D.立即放入 0.9% 生理盐水中
 - E.不作任何处理，尽快送病理科

- 4、（A1 型题）用 2% 碱性戊二醛杀灭手术器械上的乙型肝炎病毒，至少应浸泡
 - A.20 分钟以上
 - B.15 分钟
 - C.10 分钟
 - D.2 分钟
 - E.1 分钟

- 5、（A1 型题）哪一类物品不适用干热灭菌法
 - A.棉织品和橡胶制品
 - B.明胶海绵和各种粉制品
 - C.凡士林和油脂
 - D.玻璃和陶瓷
 - E.液体石蜡

- 6、（A1 型题）对肿瘤进行穿刺细胞学检查时通常使用
 - A.5 号针头

- B.6 号针头
C.12 号针头
D.8 号针头
E.9 号针头
- 7、（A1 型题）不宜行组织活检术的肿瘤为
A.舌癌
B.骨肉瘤
C.黏液瘤
D.颈动脉体瘤
E.恶性淋巴瘤
- 8、（A1 型题）对于腮腺区肿物不宜进行的检查是
A.细针吸取细胞学检查
B.CT 或 MRI
C.涎腺造影
D.切取活检术
E.B 超
- 9、（A1 型题）颌面部较大的污染创口的局部处理原则是
A.每日更换敷料
B.创口湿敷
C.创口每日冲洗
D.创口一般可一期缝合，并适当引流
E.创口应行严密缝合，不必放引流物
- 10、（A1 型题）脓肿或死腔的引流物的去除应根据
A.放置 24~48 小时后
B.引流物放置的深浅
C.24 小时内引流量未超过 20~30 mL
D.脓液及渗出液完全消除
E.引流物为异物，应尽早拔除
- 11、（A1 型题）关于绷带包扎的注意事项，哪一项是不正确的
A.包扎颌下区及颈部时，应注意保持呼吸道畅通
B.腮腺区包扎不应有压力，以免发生面神经损伤
C.所施压力适度，防止组织受压发生坏死
D.脓肿切开引流后，首先应加压包扎
E.骨折复位后，包扎时应注意防止错位
- 12、（A1 型题）对整复手术缝合的边距和针距的要求范围是
A.边距 2~3 mm，针距 3~5 mm
B.边距 2~3 mm，针距 4~6 mm
C.边距 4~5 mm，针距 4~6 mm

- D.边距 4~5 mm, 针距 6~7 mm
E.边距 5~6 mm, 针距 6~7 mm
- 13、(A1 型题) 骨髓腔或骨孔内的出血可用
- A.温热盐水纱布压迫止血
 - B.荷包缝扎止血
 - C.骨蜡填充止血
 - D.碘仿纱条填塞压迫止血
 - E.手指压迫知名动脉的近心端
- 14、(A1 型题) 成人慢性复发性腮腺炎的主要病因是
- A.急性化脓性腮腺炎转化而来
 - B.腮腺导管结石
 - C.儿童复发性腮腺炎迁延未愈而来
 - D.腮腺区外伤继发感染而来
 - E.化脓性中耳炎波及而来
- 15、(A1 型题) 颌面外科病房中有很多需要换药的病人, 作为值班医生, 你应遵循的换药顺序是
- A.先感染, 后污染, 再无菌
 - B.先感染, 后无菌, 再污染
 - C.先污染, 后感染, 再无菌
 - D.先无菌, 后感染, 再污染
 - E.先无菌, 后污染, 再感染
- 16、(A1 型题) 慢性阻塞性腮腺炎腮腺造影的 X 线表现特点是
- A.腮腺腺体有破坏而出现碘油池
 - B.导管系统无明显变化
 - C.分支导管呈抱球状表现
 - D.主导管扩张呈腊肠样变
 - E.末梢导管呈点状、球状扩张
- 17、(A1 型题) 下列关于普鲁卡因局麻药物的描述哪个是错误的
- A.偶能产生过敏反应
 - B.应用时常加入少量肾上腺素
 - C.可做皮内试验检查其过敏反应
 - D.穿透性和弥散性较强, 可用作表面麻醉和浸润麻醉
 - E.麻醉效果确切, 毒性和副作用小
- 18、(A1 型题) 舍格伦综合征伴发的结缔组织病中最常见的是
- A.硬皮病
 - B.多发性肌炎
 - C.红斑狼疮
 - D.类风湿性关节炎

E.结节性动脉炎

19、(A1 型题)若麻醉中发生麻药中毒,其兴奋型表现中不包括

- A.烦躁、多话
- B.恶心、呕吐
- C.颤抖、气急
- D.血压下降
- E.多汗

20、(A1 型题)唾液腺造影的禁忌证是

- A.肿瘤
- B.慢性炎症
- C.涎瘘
- D.急性化脓性腮腺炎
- E.唾液腺结石

21、(A1 型题)为防止注射时针头折断不能取出,注射时针头保留在体外的长度为

- A.0.5 cm
- B.1.0 cm
- C.1.5 cm
- D.2.0 cm
- E.3.0 cm

22、(A1 型题)颞下颌关节紊乱病的患病率最高的年龄组是

- A.10~19 岁
- B.20~30 岁
- C.31~40 岁
- D.41~50 岁
- E.51~60 岁

23、(A1 型题)下牙槽神经阻滞麻醉时出现面瘫,一般的处理方法为

- A.注射维生素 B1、B12
- B.局部热敷
- C.局部理疗
- D.口服镇静剂
- E.不作特殊处理

24、(A1 型题)下列不属于颞下颌关节紊乱病下颌运动异常的是

- A.开口度过大或过小
- B.开闭运动出现关节绞锁
- C.开口困难或牙关紧闭,暗示疗法可减轻
- D.开口型偏斜
- E.开口型歪曲

25、（A1 型题）牙周膜注射浸润麻醉适用于血友病患者的原因

- A.注射时不痛
- B.注射所致的损伤很小
- C.注射用药量较大故止血好
- D.麻醉效能强度高
- E.麻醉作用时间长

26、（A1 型题）手术病人术前 12 h 禁食，4 h 禁水是为了

- A.减少术后感染
- B.防止术后腹胀
- C.防止吻合口瘘
- D.防止术后伤口裂开
- E.防止麻醉或手术中呕吐

27、（A1 型题）环甲膜切开术后插管时间最长不宜超过

- A.8 小时
- B.10 小时
- C.12 小时
- D.24 小时
- E.48 小时

28、（A1 型题）腭前神经阻滞麻醉时出现恶心或呕吐，可能是由于

- A.注射点过高
- B.针尖刺入过深
- C.针尖刺入过前
- D.针尖刺入过后
- E.麻药注射入血管内

29、（A1 型题）对偶三角瓣主要适应于

- A.整复邻近组织缺损
- B.松解条索状瘢痕挛缩
- C.覆盖感染创面
- D.毛发移植
- E.器官再造

30、（A1 型题）上牙槽神经阻滞麻醉后，允许拔牙的时机是

- A.腭侧牙龈感觉丧失后
- B.颊侧牙龈感觉丧失后
- C.颊黏膜感觉丧失后
- D.上唇感觉丧失后
- E.软腭感觉丧失后

31、（A1 型题）颞下颌关节脱位病例中最常见的类型是

- A.单侧后脱位

- B.双侧上脱位
C.急性前脱位
D.复发性脱位
E.陈旧性脱位
- 32、(A1型题)行牙齿拔除术时,对患者体位描述错误的是
A.多采用坐位
B.头后仰,使张口时上颌牙的平面与地平面成 45° 角
C.拔除上颌牙时,手术椅的高度大约为上颌牙的平面与术者的肩部在同一水平
D.拔除下颌牙时,应使患者在张口时,上颌牙的平面与地平面平行,下颌与术者的肘关节在同一高度或更低
E.术者一般应位于患者的右前方,拔下前牙时应立于患者的右后方
- 33、(A1型题)单纯性高血压无其他合并症,血压高于多少时应先进行治疗后再拔牙
A.21.3~12.7 KPa(160~95 mmHg)
B.22.7~12.7 KPa(170~95 mmHg)
C.24~13.3 KPa(180~100 mmHg)
D.25.3~13.3 KPa(190~100 mmHg)
E.25.3~14 KPa(190~105 mmHg)
- 34、(A1型题)关于颞下颌关节复发性脱位的病因,哪一项说法是错误的
A.急性前脱位治疗不当
B.长期翼外肌痉挛
C.老年人
D.慢性长期消耗性疾病
E.韧带及关节囊松弛
- 35、(A1型题)粒细胞缺乏症易引起感染,其粒细胞绝对计数低于多少时属拔牙禁忌证
A. $6 \times 10^9 / L$
B. $1 \times 10^9 / L$
C. $5 \times 10^9 / L$
D. $3 \times 10^9 / L$
E. $2 \times 10^9 / L$
- 36、(A1型题)鉴别中枢性面瘫和周围性面瘫的主要依据是
A.患侧口角下垂,健侧向上歪斜
B.口周肌肉瘫痪
C.额纹消失,不能蹙眉
D.不能鼓腮
E.眼睑不能闭合
- 37、(A1型题)血友病患者必须拔牙时。首要的处理原则是
A.拔牙创内填塞止血材料
B.注射止血药

- C.麻药中多量副肾素
D.操作轻柔，减少创伤，缝合拔牙创
E.术前、术后多次输新鲜血
- 38、（A1 型题）拔牙术引发亚急性细菌性心内膜炎的致病菌是
A.金黄色葡萄球菌
B.大肠杆菌
C.甲型溶血性链球菌
D.乙型溶血性链球菌
E.肺炎球菌
- 39、（A1 型题）关于原发性三叉神经痛的描述，哪项是错误的
A.神经系统检查常有阳性体征
B.有“扳机点”存在
C.疼痛多自发
D.间歇期无症状
E.可有痛性抽搐
- 40、（A1 型题）关于牙根拔除术的说法。错误的是
A.根钳拔除法为牙根拔除术时首选的方法
B.根钳和牙挺均不能拔除的牙根，可考虑用翻瓣去骨法拔除
C.拔除牙根时要有良好的照明
D.应用牙挺拔除牙根时，要注意选择挺刃大小、宽度，应与牙根相适应
E.利用牙挺的楔力挺牙根时，应从牙根断面的最低点楔入
- 41、（A1 型题）对三叉神经痛“扳机点”的检查方法不包括
A.拂诊
B.压诊
C.叩诊
D.揉诊
E.触诊
- 42、（A1 型题）常用的牙种植体种类为
A.骨内种植体
B.骨膜下种植体
C.黏膜下种植体
D.牙内种植体
E.牙内骨内种植体
- 43、（A1 型题）目前最佳的牙种植材料是
A.陶瓷
B.钛
C.玻璃碳
D.树脂

E.不锈钢

44、（A1 型题）治疗三叉神经痛的首选药物是

- A.氯硝西洋
- B.地塞米松
- C.苯妥英钠
- D.维生素 B1
- E.酰胺咪嗪

45、（A1 型题）下列描述不属于种植术的并发症的是

- A.上颌窦或鼻腔损伤
- B.种植体植入位置不佳
- C.邻牙损伤
- D.创口裂开及黏膜穿孔
- E.神经损伤

46、（A1 型题）三叉神经痛的患者的疼痛部位在左上腭区和左眶下区，如果采取手术治疗，应撕脱三叉神经的

- A.第 I 支
- B.第 II 支
- C.第 III 支
- D.第 I、II 支
- E.第 II、III 支

47、（A1 型题）颌面部间隙感染最常见的原因是

- A.血源性
- B.腺源性
- C.外伤性
- D.牙源性
- E.继发于其他感染

48、（A1 型题）颌面部化脓性感染的局部表现一般为

- A.局部红、肿、热、痛、功能障碍
- B.局部软组织广泛性水肿
- C.局部产生皮下气肿，有捻发音
- D.局部剧烈疼痛，有脓肿形成
- E.张口受限，影响语言、咀嚼

49、（A1 型题）确定面瘫病人是否有膝状神经节受损。应做

- A.定分支检查
- B.听觉检查
- C.味觉检查
- D.泪液检查
- E.唾液检查

- 50、（A1 型题）因智齿冠周炎导致的左侧升支外侧慢性边缘性骨髓炎，经消炎治疗后局部仍有肿胀，此时可行
- A. 高压氧
 - B. 死骨刮治术
 - C. 热敷
 - D. 使用大剂量抗生素
 - E. 切开引流
- 51、（A1 型题）面部危险三角区内的感染处理不当可以引起
- A. 急性根尖周炎
 - B. 鼻前庭炎
 - C. 尖牙凹感染
 - D. 角膜炎、结膜炎、眼睑炎
 - E. 海绵窦血栓性静脉炎
- 52、（A1 型题）不符合隐性唇裂表现的是
- A. 唇峰分离
 - B. 黏膜亦出现裂隙
 - C. 皮肤完好无裂开
 - D. 裂侧皮肤浅沟状凹陷
 - E. 皮肤下方的肌层未能联合
- 53、（A1 型题）通常不会引起张口受限的间隙感染是
- A. 咬肌间隙感染
 - B. 翼下颌间隙感染
 - C. 颞下间隙感染
 - D. 眶下间隙感染
 - E. 下颌骨急性化脓性骨髓炎
- 54、（A1 型题）牙颌面畸形的临床分类中不包括
- A. 颌骨发育过度
 - B. 颌骨发育不足
 - C. 长面畸形
 - D. 不对称畸形
 - E. 后天性畸形
- 55、（A1 型题）新生儿颌骨骨髓炎的感染来源多为
- A. 腺源性
 - B. 血源性
 - C. 损伤性
 - D. 牙源性
 - E. 医源性

- 56、（A1 型题）哪个间隙感染容易引起严重的张口受限
- A.舌下间隙
 - B.咬肌间隙
 - C.下颌下间隙
 - D.眶下间隙
 - E.颊下间隙
- 57、（A1 型题）颌面部创伤后组织水肿反应快而重的原因是颌面部
- A.血运丰富
 - B.较早发生感染
 - C.皮下脂肪丰富
 - D.神经丰富且敏感
 - E.处于暴露部位
- 58、（A1 型题）唇腭裂的发生与遗传因素有关，属于
- A.常染色体显性遗传
 - B.常染色体隐性遗传
 - C.性染色体隐性遗传
 - D.多基因遗传
 - E.单基因遗传
- 59、（A1 型题）在有感染的肉芽创面上植皮，宜选用
- A.表层皮片
 - B.薄中厚皮片
 - C.厚中厚皮片
 - D.全厚皮片
 - E.保存真皮下血管网全厚皮片
- 60、（A1 型题）一外伤昏迷病员准备运送，不应采用的措施是
- A.采取俯卧位
 - B.采取侧卧位
 - C.额部垫高
 - D.随时观察伤情变化，防止窒息和休克发生
 - E.疑有颈椎损伤的伤员，颈下应放置小枕，头部左右两侧用小枕固定
- 61、（A1 型题）瘻孔中长期排脓，有时可排出死骨片的颌骨骨髓炎是
- A.新生儿颌骨骨髓炎
 - B.中央性颌骨骨髓炎急性期
 - C.中央性颌骨骨髓炎慢性期
 - D.边缘性颌骨骨髓炎增生型
 - E.边缘性颌骨骨髓炎溶解破坏型
- 62、（A1 型题）软腭的形成约在
- A.胚胎第 5 周

- B.胚胎第 6 周
C.胚胎第 8 周
D.胚胎第 12 周
E.胚胎第 4 个月
- 63、(A1 型题) 对于上颌骨骨折下垂移位引起的呼吸困难的首要抢救措施是
A.牵舌向口外
B.头低侧卧位
C.上提并固定上颌骨
D.气管切开
E.环甲膜切开
- 64、(A1 型题) 上颌骨横断骨折时出现呼吸困难, 应当立即采用筷子、压舌板等横放于下列何种部位, 将上颌骨向上提吊
A.切牙
B.尖牙
C.前磨牙
D.第一磨牙
E.第二磨牙
- 65、(A1 型题) 先天性单侧唇裂手术修复的时间最好是
A.生后即刻
B.1~2 个月
C.3~6 个月
D.6~12 个月
E.1~2 岁
- 66、(A1 型题) 口腔颌面部挫伤形成较大血肿时, 应进行以下哪一项处理
A.尽早进行热敷, 促进血肿吸收或消散
B.尽早进行理疗, 促进血肿吸收或消散
C.早期切开, 建立引流, 应用抗菌药物控制感染
D.无菌条件下, 用粗针头将血液抽出, 然后加压包扎, 应用抗菌药物
E.直接加压包扎, 然后应用抗菌药物控制感染
- 67、(A1 型题) 细菌进入创口在几小时内尚未大量繁殖而易于清除
A.2~6 小时
B.4~10 小时
C.6~12 小时
D.12~24 小时
E.10~16 小时
- 68、(A1 型题) 与前臂皮瓣桡动脉相吻合的最常用的血管是
A.颈外动脉
B.面动脉

- C. 上颌动脉
D. 舌动脉
E. 甲状腺动脉
- 69、（A1 型题）补钾速度一般每小时不宜超过
- A. 10 mmol
B. 20 mmol
C. 30 mmol
D. 40 mmol
E. 50 mmol
- 70、（A1 型题）等渗性缺水的临床表现是
- A. 短期内体液的丧失达体重 3% 时有休克
B. 休克常伴有代谢性酸中毒
C. 明显口渴
D. 化验检查见血清 Na^+ 减低
E. 化验检查见尿比重在 1.010 以下
- 71、（A1 型题）低钾血症一般不表现为
- A. 碱中毒
B. 碱性尿
C. 心电图出现 U 波
D. 恶心、呕吐
E. 腱反射减弱
- 72、（A1 型题）对于急腹症合并腹膜炎患者，如出现呼吸深而快，神志恍惚，血压下降，测定血浆碳酸氢为 7 mmol/L，应首先考虑的诊断是
- A. 呼吸性碱中毒
B. 呼吸性酸中毒
C. 中度代谢性酸中毒
D. 重度代谢性碱中毒
E. 重度代谢性酸中毒
- 73、（A1 型题）外科病人最易发生的缺水种类是
- A. 水过多
B. 高渗性缺水
C. 低渗性缺水
D. 等渗性缺水
E. 中度缺水
- 74、（A1 型题）严重水中毒或稀释性低血钠的患者可用
- A. 生理盐水
B. 5% 葡萄糖水
C. 强心剂

- D.利尿剂
- E.以上都不是

75、(A1 型题) 治疗等渗性脱水理想的液体是

- A.5%碳酸氢钠
- B.等渗盐水
- C.平衡盐溶液
- D.5%葡萄糖
- E.小分子右旋糖酐

76、(A1 型题) 大出血后出现休克症状, 表明至少已丢失全身总血量的

- A.10%
- B.15%
- C.20%
- D.25%
- E.30%

77、(A1 型题) 女性卵巢功能成熟, 生育能力旺盛的时期是

- A.幼年期
- B.青春期
- C.性成熟期
- D.更年期
- E.老年期

78、(A1 型题) 世界卫生组织将卵巢功能开始衰退直至绝经后 1 年内的时期称为

- A.绝经过渡期
- B.性成熟期
- C.绝经后期
- D.老年期
- E.围绝经期

79、(A1 型题) 妇女一生各个阶段中, 哪个阶段历时最长

- A.新生儿期
- B.儿童期
- C.青春期
- D.性成熟期
- E.绝经后期

80、(A1 型题) 月经周期第 15~19 日, 为月经周期哪期

- A.分泌期
- B.分泌期早期
- C.分泌期中期
- D.分泌期晚期
- E.月经期中期

- 81、（A1 型题）婴儿期指的是
- A.从 1 岁至 2 周岁之前
 - B.从出生后 28 天至满 1 周岁之前
 - C.从出生后 1 个月至 1 周岁之前
 - D.从出生后至满 1 周岁之前
 - E.从 1 岁至 3 周岁之前
- 82、（A1 型题）小儿生命中，死亡率最高的时期是
- A.围生期
 - B.幼儿期
 - C.胎儿期
 - D.学龄前期
 - E.学龄期
- 83、（A1 型题）关于小儿前囟检查的意义，错误的是
- A.前囟过小见于小头畸形
 - B.前囟过大见于佝偻病
 - C.前囟饱满见于颅内压增高
 - D.前囟凹陷见于脱水
 - E.前囟早闭见于克汀病
- 84、（A1 型题）在我国，1 岁内小儿需完成的基础计划免疫中,不包括
- A.卡介苗
 - B.乙型脑炎疫苗
 - C.麻疹疫苗
 - D.百日咳-白喉-破伤风混合疫苗
 - E.脊髓灰质炎疫苗
- 85、（A1 型题）情感对于情绪来说具有的特点是
- A.强烈而冲动
 - B.伴有明显的行为变化
 - C.伴有明显的生理变化
 - D.稳定而深刻
 - E.带有明显的情境性
- 86、（A1 型题）情绪形成的三要素是
- A.心境、环境、生理变化
 - B.情景、心境、条件反射
 - C.情景、认知、生理变化
 - D.认知、反应、环境刺激
 - E.情景、刺激、生理过程
- 87、（A1 型题）与情绪相联系的需要是

- A.生理需要
B.安全需要
C.交际需要
D.认知需要
E.尊重需要
- 88、（A1 型题）知觉是人脑对客观事物
- A.个别属性的反映
B.整体属性的反映
C.本质属性的反映
D.特殊属性的反映
E.发展属性的反映
- 89、（A1 型题）“入芝兰之室，久闻而不知其香”说明的是
- A.感觉过敏
B.感觉适应
C.感觉相互作用
D.感觉减退
E.感受性补偿
- 90、（A1 型题）一种比较持久微弱、具有渲染性的情绪状态是
- A.心境
B.激情
C.心情
D.热情
E.应激
- 91、（A1 型题）某冠心病患者想接受冠状动脉旁路移植术治疗，但又担心术中出现意外，这属于
- A.双趋冲突
B.双避冲突
C.趋避冲突
D.双重趋避冲突
E.多重趋避冲突
- 92、（A1 型题）心理社会因素在发病过程中起重要作用的躯体疾病称为
- A.心理障碍
B.精神疾病
C.躯体障碍
D.心身疾病
E.人格障碍
- 93、（A1 型题）按照心身医学的观点，下列中属于心身疾病的是
- A.精神分裂症

- B.抑郁症
C.消化性溃疡
D.大叶性肺炎
E.精神发育迟滞
- 94、（A1 型题）心身疾病的诊断标准不包括
- A.根据临床症状、体征和特殊检查明确器质性改变
B.疾病的发生有相平行的心理社会因素
C.排除神经症和精神疾病
D.单纯的生物医学疗法收效甚微
E.由某种躯体疾病引发心理障碍
- 95、（A1 型题）医学伦理学的研究对象，以下除外
- A.医际之间的关系
B.医务人员和社会的关系
C.政府行政部门之间的关系
D.医务人员和医学科学发展之间的关系
E.医务人员和患者的关系
- 96、（A1 型题）治疗要获得患者的知情同意，其道德价值应除外
- A.维持社会公正
B.保护患者自主权
C.解脱医生责任
D.协调医患关系
E.保证医疗质量
- 97、（A1 型题）在卫生资源分配上，形式公正是根据每个人
- A.都享有公平分配的权利
B.实际的需要
C.能力的大小
D.社会贡献的多少
E.在家庭中的角色地位
- 98、（A1 型题）为了切实做到尊重患者自主性或决定，医生向患者提供信息时要避免
- A.理解
B.诱导
C.适量
D.适度
E.开导
- 99、（A1 型题）最能反映医患关系性质的是医务人员与患者之间的
- A.信托关系
B.陌生人之间的关系
C.主动-被动关系

- D.类似父(母)子间的关系
- E.商品关系

100、(A1型题)构成医患信任关系的根本前提是

- A.患者求医行为中包含对医师的信任
- B.患者在医患交往中处于被动地位
- C.医师是“仁者”
- D.现代医学服务是完全可以信赖的
- E.医患交往中加入一些特殊因素

101、(A1型题)男性,46岁,右侧腮腺区无痛性肿大4年,近半年起左侧腮腺也显肿大,两侧面部不对称,并伴口干不适,在行腮腺扪诊检查时,正确的方法是

- A.拇指、示指夹住作提拉式扪诊
- B.食指、中指、环指作平触扪诊
- C.拇指、示指相对触诊扪诊
- D.拇指扪诊
- E.双合诊

102、(A1型题)男性,25岁,因口腔颌面部创伤致舌体裂伤,出血明显,口底肿胀,来院就诊,最佳的止血方法是

- A.注射止血针
- B.指压患侧的颈总动脉
- C.用纱布块填塞止血
- D.创口缝合止血
- E.做颈外动脉结扎术

103、(A1型题)男性,50岁,拔除下颌第一磨牙后,新鲜血液充盈牙槽窝,但不能淹没牙根间隔,正确的处理是

- A.缝合拔牙创口
- B.咬除根间隔
- C.碘仿纱布覆盖
- D.明胶海绵覆盖
- E.任其吸收

104、(A2型题)男性,29岁,3天前因“右上唇痛”入院治疗,今晨起体温急剧上升达 39.5°C ,相继出现头痛伴恶心,右眼球结膜淤血,右眼球前突及眼球运动受限,应考虑并发了

- A.脑膜炎
- B.脑脓肿
- C.败血症
- D.脓毒血症
- E.海绵窦血栓性静脉炎

105、(A2型题)患者注射局麻药后出现头晕、胸闷,面色苍白,全身冷汗,四肢厥冷无力,脉快而弱,恶心、呼吸困难,甚至意识丧失,多为

- A.过敏反应
- B.晕厥
- C.中毒
- D.休克
- E.全脊髓麻醉

106、（A2 型题）一位左侧颞下间隙脓肿引发多间隙感染的患者，已行经颞部及颌下区切口的上、下贯式切开引流术，流出大量脓性分泌物。此时应选择的引流是

- A.片状引流
- B.细纱条引流
- C.管状引流
- D.负压引流
- E.碘纺纱条引流

107、（A2 型题）青年男性，右下后牙颊侧牙龈溃疡 3 个月，经两周抗炎治疗不愈。为明确诊断，应选用的检查为

- A.牙片
- B.CT
- C.B 超
- D.切取活检
- E.细针吸活检

108、（A1 型题）关于牙龈瘤的叙述，哪项是错误的

- A.女性多见，与内分泌有关
- B.可以破坏牙槽骨壁
- C.一般应将病变波及的牙齿拔除
- D.病变波及的骨膜及邻近骨组织需要去除
- E.因非真性肿瘤，切除后不易复发

109、（A2 型题）患者男性，40 岁，左颌下区肿物两月余，触诊为极柔软的囊性肿物，大小 5 cm×3 cm，透光试验阴性，无压痛，应进行的辅助检查是

- A.末梢血象化验
- B.肿物穿刺，必要时行穿刺物涂片
- C.肿物的 B 型超声波
- D.左颌下腺造影，必要时行 CT
- E.左颌下区手术探查及活体组织检查

110、（A2 型题）一患者因舌受外伤致比较严重的出血，急诊止血的方法应选择

- A.注射止血药物
- B.纱布填塞
- C.颈外动脉结扎
- D.指压患侧总动脉
- E.缝合止血

- 111、(A2型题)某患儿,6岁,先天性唇腭裂术后,伴牙槽突裂,什么时间修复牙槽裂最适宜
- A.6岁
 - B.7~8岁
 - C.9~11岁
 - D.12~14岁
 - E.16岁以后
- 112、(A2型题)男性,35岁,矿工,体重60公斤,被困井下8日,获救后口渴、躁狂,体重降至55公斤,血清钠155 mmol/L,应初步诊断为
- A.等渗性缺水
 - B.轻度缺水
 - C.中度缺水
 - D.重度缺水
 - E.低渗性缺水
- 113、(A2型题)患者,女,50岁,因反复呕吐5天入院。血清钠118 mmol/L,脉搏120次/分,血压70/50 mmHg。应诊断为
- A.轻度缺钠
 - B.中度缺钠
 - C.重度缺钠
 - D.中度缺水
 - E.重度缺水
- 114、(A2型题)男,40岁,体重60 kg,因食管癌进食困难1月余,主诉:乏力、极度口渴、尿少而色深。检查:血压、体温均正常,眼窝凹陷、唇、舌干燥、皮肤弹性差。该病人的水、电解质失衡诊断为
- A.中度高渗性脱水
 - B.轻度高渗性脱水
 - C.重度高渗性脱水
 - D.等渗性脱水
 - E.低渗性脱水
- 115、(A2型题)女,26岁。月经规则,周期为28天,末次月经为4月1日,下列哪项是错误的
- A.排卵期约在4月15日
 - B.若受孕,孕卵着床时间约在4月18日
 - C.B超下可能发现妊娠环的最早日期约在5月15日后
 - D.B超开始能观察到原始胎心搏动的时间在5月20日后
 - E.预产期应在1月8日
- 116、(A2型题)患儿,4个月,生后牛乳喂养。突发四肢抽搐,面肌颤动,两眼上翻,持续数秒至数分钟后自然缓解。一天可发作4~5次,每次缓解后一切活动正常,急诊处理应给予
- A.止惊剂+钙剂
 - B.止惊剂+脱水剂

- C.止惊剂+抗生素
- D.止惊剂+维生素 D
- E.脱水剂+钙剂

117、(A2 型题) 1 岁女孩, 急起高热、流涎、厌食。查体: 可见咽部充血, 咽腭弓、悬雍垂、软腭等处可见 2~4 mm 大小的疱疹。最可能的诊断是配套名师课程

- A.疱疹性口炎
- B.鹅口疮
- C.咽-结合膜热
- D.猩红热
- E.疱疹性咽峡炎

118、(A3/A4 型题) 男性, 45 岁。主诉左下颌后牙出现不适 6 个月求治。口腔检查: 56 残冠, 叩诊(±), 松动(-), 已做过牙髓治疗, 牙龈稍红, 无法再修复, 拟拔除。口内其他牙未见明显异常。X 线片示: 6 远中根尖有阴影, 距离下颌神经管较近 56 拔除不需麻醉的神经是

- A.下牙槽神经
- B.舌神经
- C.咬肌神经
- D.颊神经
- E.以上神经均需麻醉

119、(A3/A4 型题) 男性, 45 岁。主诉左下颌后牙出现不适 6 个月求治。口腔检查: 56 残冠, 叩诊(±), 松动(-), 已做过牙髓治疗, 牙龈稍红, 无法再修复, 拟拔除。口内其他牙未见明显异常。X 线片示: 6 远中根尖有阴影, 距离下颌神经管较近 56 拔除时断根, 颊侧切开去骨后取出, 2 天后出现激烈疼痛, 并向耳颞部、下颌下区放散。口内检查: 56 牙槽窝有腐败变性的残留血凝块, 有恶臭。引起疼痛的原因是

- A.下颌神经损伤
- B.干槽症
- C.邻牙损伤
- D.邻牙牙髓炎
- E.牙龈撕裂

120、(A3/A4 型题) 男性, 45 岁。主诉左下颌后牙出现不适 6 个月求治。口腔检查: 56 残冠, 叩诊(±), 松动(-), 已做过牙髓治疗, 牙龈稍红, 无法再修复, 拟拔除。口内其他牙未见明显异常。X 线片示: 6 远中根尖有阴影, 距离下颌神经管较近最佳应急处理方法是

- A.局麻下彻底去除牙槽窝内腐败物, 冲洗后填入碘仿纱条
- B.服用大量抗生素
- C.消炎漱口液含漱
- D.局部封闭止痛
- E.服用止痛药

121、(A3/A4 型题) 男性, 45 岁。主诉左下颌后牙出现不适 6 个月求治。口腔检查: 56 残冠, 叩诊(±), 松动(-), 已做过牙髓治疗, 牙龈稍红, 无法再修复, 拟拔除。口内其他牙未见明显异常

常。X线片示：6远中根尖有阴影，距离下颌神经管较近假如处理7天后疼痛消失，但左侧口唇及颊部有麻木感，为确定诊断应做

- A. 牙槽窝探查
- B. 拍摄X线片
- C. 邻牙探诊
- D. 局麻定位检查
- E. 以上均需做

122、（A3/A4型题）患者，女性，24岁，拟拔除下颌第三磨牙，注射局麻药后患者出现烦躁不安、谵妄、呼吸急促，抽搐、发绀，随即出现意识不清，脉细而弱，血压下降。上述症状可能诊断为

- A. 癔症
- B. 晕厥
- C. 过敏
- D. 中毒反应
- E. 肾上腺素反应

123、（A3/A4型题）患者，女性，24岁，拟拔除下颌第三磨牙，注射局麻药后患者出现烦躁不安、谵妄、呼吸急促，抽搐、发绀，随即出现意识不清，脉细而弱，血压下降。针对上述情况，下列哪项是错误的

- A. 吸氧
- B. 补液
- C. 输血
- D. 抗惊厥
- E. 应用激素

124、（A3/A4型题）患者，男，45岁，36小时前施工时右下肢被石板砸伤，X线摄片，未见骨折，行清创缝合。现突然出现烦躁不安，伴恐惧感，大汗淋漓，自述右下肢伤处疼痛加重，胀裂感。体温38.5℃，脉搏128次/分，血压146/92 mmHg，右小腿肿胀明显，大量浆液血性渗出物自切口渗出，皮肤表面呈大理石样花纹，渗出物有恶臭味。本病可诊断为

- A. 芽胞菌性蜂窝织炎
- B. 厌氧性链球菌性蜂窝织炎
- C. 大肠杆菌性蜂窝织炎
- D. 芽胞杆菌感染
- E. 变形杆菌感染

125、（A3/A4型题）患者，男，45岁，36小时前施工时右下肢被石板砸伤，X线摄片，未见骨折，行清创缝合。现突然出现烦躁不安，伴恐惧感，大汗淋漓，自述右下肢伤处疼痛加重，胀裂感。体温38.5℃，脉搏128次/分，血压146/92 mmHg，右小腿肿胀明显，大量浆液血性渗出物自切口渗出，皮肤表面呈大理石样花纹，渗出物有恶臭味。治疗上不恰当的是

- A. 右下肢广泛、多处切开
- B. 800万U青霉素静脉注射
- C. 输200 mL同型新鲜血
- D. 右下肢截肢

E.高压氧疗法

126、（A3/A4 型题）患者，男，45 岁，36 小时前施工时右下肢被石板砸伤，X 线摄片，未见骨折，行清创缝合。现突然出现烦躁不安，伴恐惧感，大汗淋漓，自述右下肢伤处疼痛加重，胀裂感。体温 38.5℃，脉搏 128 次/分，血压 146/92 mmHg，右小腿肿胀明显，大量浆液血性渗出物自切口渗出，皮肤表面呈大理石样花纹，渗出物有恶臭味。出现本病的可能原因为

- A.清创不彻底
- B.患者有复合创伤
- C.未注射 TAT
- D.患者低蛋白血症
- E.切口包扎过紧

127、（B1 型题）外伤致上颌骨骨折，鼻腔发生明显出血

- A.钳夹、结扎止血法
- B.区域阻断止血法
- C.填塞止血法
- D.低温、降压止血法
- E.电灼止血法下列出血情况应选用的正确止血方法是

128、（B1 型题）颌面部挫裂伤而出现活动性出血

- A.钳夹、结扎止血法
- B.区域阻断止血法
- C.填塞止血法
- D.低温、降压止血法
- E.电灼止血法下列出血情况应选用的正确止血方法是

129、（B1 型题）拔牙创血块开始机化的时间

- A.15 分钟
- B.1 小时
- C.24 小时
- D.2 天
- E.3~4 天

130、（B1 型题）拔牙后血块形成的时间

- A.15 分钟
- B.1 小时
- C.24 小时
- D.2 天
- E.3~4 天

131、（B1 型题）拔牙后牙龈上皮向血块表面生长的时间

- A.15 分钟
- B.1 小时
- C.24 小时

- D.2 天
- E.3~4 天

132、(B1 型题) 脓液有甜腥臭味的是

- A.大肠杆菌
- B.拟杆菌
- C.绿脓杆菌
- D.溶血性链球菌
- E.金黄色葡萄球菌

133、(B1 型题) 脓液量多, 淡红色, 稀薄的是

- A.大肠杆菌
- B.拟杆菌
- C.绿脓杆菌
- D.溶血性链球菌
- E.金黄色葡萄球菌

134、(B1 型题) 脓液恶臭, 普通细菌培养阴性的是

- A.大肠杆菌
- B.拟杆菌
- C.绿脓杆菌
- D.溶血性链球菌
- E.金黄色葡萄球菌

135、(B1 型题) 中心静脉压低, 血压低

- A.适当补液
- B.使用强心药物
- C.用扩血管药
- D.补液试验
- E.充分补液

136、(B1 型题) 中心静脉压高, 血压低

- A.适当补液
- B.使用强心药物
- C.用扩血管药
- D.补液试验
- E.充分补液

137、(B1 型题) 休克患者中心静脉压为 5 cmH₂O, 血压 80/65 mmHg, 处理原则为

- A.适当补液
- B.使用强心药物
- C.用扩血管药
- D.补液试验
- E.充分补液

- 138、（B1 型题）从月经初潮到生殖器官发育成熟的时期，称为
- A. 幼年期
 - B. 青春期
 - C. 性成熟期
 - D. 绝经后期
 - E. 绝经过渡期
- 139、（B1 型题）卵巢功能进一步衰退，生殖器官逐渐萎缩的时期称为
- A. 幼年期
 - B. 青春期
 - C. 性成熟期
 - D. 绝经后期
 - E. 绝经过渡期
- 140、（B1 型题）有周期性排卵和行经，具有生殖功能的时期称为
- A. 幼年期
 - B. 青春期
 - C. 性成熟期
 - D. 绝经后期
 - E. 绝经过渡期
- 141、（B1 型题）两次月经第一天相隔的时间
- A. 月经期
 - B. 增殖期
 - C. 分泌期
 - D. 分泌晚期
 - E. 月经周期
- 142、（B1 型题）月经的第 24~28 天，称为
- A. 月经期
 - B. 增殖期
 - C. 分泌期
 - D. 分泌晚期
 - E. 月经周期
- 143、（B1 型题）月经的第 5~14 天，称为
- A. 月经期
 - B. 增殖期
 - C. 分泌期
 - D. 分泌晚期
 - E. 月经周期
- 144、（B1 型题）月经的第 15~28 天，称为

- A. 月经期
- B. 增殖期
- C. 分泌期
- D. 分泌晚期
- E. 月经周期

145、（B1 型题）月经的第 1~4 天，称为

- A. 月经期
- B. 增殖期
- C. 分泌期
- D. 分泌晚期
- E. 月经周期

146、（B1 型题）成釉细胞瘤 X 线表现为

- A. 下颌骨内有单房阴影，周围有致密骨白线包绕
- B. 下颌角骨质疏松脱钙，并有骨增生
- C. 下颌骨伴有骨质破坏，有死骨形成，离病原牙越近密度越低
- D. 下颌骨内有大小不等的多房阴影，各房大小相差悬殊
- E. 颌骨内虫蚀状骨质破坏区，牙槽骨有破坏，无死骨及新骨增生

147、（B1 型题）牙源性角化囊肿 X 线表现为

- A. 下颌骨内有单房阴影，周围有致密骨白线包绕
- B. 下颌角骨质疏松脱钙，并有骨增生
- C. 下颌骨伴有骨质破坏，有死骨形成，离病原牙越近密度越低
- D. 下颌骨内有大小不等的多房阴影，各房大小相差悬殊
- E. 颌骨内虫蚀状骨质破坏区，牙槽骨有破坏，无死骨及新骨增生

148、（B1 型题）原发性骨内癌 X 线表现为

- A. 下颌骨内有单房阴影，周围有致密骨白线包绕
- B. 下颌角骨质疏松脱钙，并有骨增生
- C. 下颌骨伴有骨质破坏，有死骨形成，离病原牙越近密度越低
- D. 下颌骨内有大小不等的多房阴影，各房大小相差悬殊
- E. 颌骨内虫蚀状骨质破坏区，牙槽骨有破坏，无死骨及新骨增生

149、（B1 型题）属植物类抗癌药物是

- A. 氮芥
- B. 平阳霉素
- C. 甲氨蝶呤
- D. 长春新碱
- E. 顺铂

150、（B1 型题）属抗代谢类抗癌药物是

- A. 氮芥
- B. 平阳霉素

- C.甲氨蝶呤
- D.长春新碱
- E.顺铂



答案

1、正确答案：D

答案解析：张口度分4度：轻度张口受限：上下切牙切缘间仅两横指，约2~2.5 cm。中度张口受限：上下切牙切缘间仅一横指，约1~2.0 cm。重度张口受限：上下切牙切缘间不足一横指，约1 cm以内。完全性张口受限：完全不能张口。

2、正确答案：D

答案解析：缝合时如皮肤切口两侧进针间距大于皮下间距会出现皮肤内卷，如果小于皮下间距会出现皮肤外翻，故D正确。

3、正确答案：E

答案解析：普通活检立即放入10%甲醛固定液中，冰冻活检需要新鲜标本，不进行固定，与手术同时完成。

4、正确答案：B

答案解析：戊二醛杀菌作用较缓慢，以2%碱性戊二醛浸泡医疗器材进行灭菌，10 min可杀灭真菌、结核杆菌；4~10 h杀灭芽胞；对于乙型肝炎病毒污染物品的消毒，需作用15~30 min。

5、正确答案：A

答案解析：干热灭菌的160~170℃温度能使纤维制品变焦，所以不能使用干热灭菌，而其他选项的物品可以耐高温。

6、正确答案：B

答案解析：脓肿穿刺多选用8号、9号粗针，血管性病变选用7号针，对唾液腺肿瘤和某些深部肿瘤用6号针头行穿刺细胞学检查。

7、正确答案：D

答案解析：血管性肿瘤或血管畸形、恶性黑色素瘤因其易随血液发生转移，一般不作活检。

8、正确答案：D

答案解析：腮腺和下颌下腺肿瘤禁忌活检。

9、正确答案：D

答案解析：颌面部创口较大，首先应进行初期缝合，而且是污染创口容易感染，所以进行引流。

10、正确答案：D

答案解析：脓肿或死腔的引流物应放置至脓液完全消除为止。

11、正确答案：B

答案解析：腮腺区创口的包扎应施以一定压力并应赋予弹性，以免发生涎痿。

12、正确答案：A

答案解析：一般整复手术缝合边距 2~3 mm，针距 3~5 mm，颈部手术缝合边距 3 mm，针距 5 mm 为宜。而组织极易撕裂的舌组织缝合时，边距和针距均应增至 5 mm 以上。

13、正确答案：C

答案解析：骨蜡填充止血用于骨髓腔或骨孔内的出血。

14、正确答案：C

答案解析：成人慢性复发性腮腺炎多由儿童复发性腮腺炎迁延未愈而来。

15、正确答案：E

答案解析：换药的顺序为先无菌，后污染，再感染，防止交叉感染。

16、正确答案：D

答案解析：慢性复发性腮腺炎和慢性阻塞性腮腺炎造影的 X 线表现区分是前者主要表现为末梢导管的点球状扩张及排空迟缓，而后者主要表现为主导管的扩张呈腊肠样变。

17、正确答案：D

答案解析：普鲁卡因主要用于浸润麻醉，不用于表面麻醉。

18、正确答案：D

答案解析：约占 50% 的患者伴有类风湿关节炎，约占 10% 的患者伴系统性红斑狼疮。此外，还可能有硬皮病、多发性肌炎等。

19、正确答案：D

答案解析：轻度兴奋型的临床表现为精神紧张、多语好动，亦可伴有轻度心率增速。程度较重者可主诉气促甚至窒息感，病人烦躁不安，缺氧症状明显，出现恶心呕吐，血压升高等，所以 A、B、C、E 正确，兴奋的情况下是血压升高，而非血压下降。

20、正确答案：D

答案解析：急性化脓性腮腺炎不宜作腮腺造影，因造影剂可通过薄弱的导管壁，进入导管周围组织，使炎症扩散。

21、正确答案：B

答案解析：注射时针头在体外应保留 1 cm，以防止注射时针头折断。

22、正确答案：B

答案解析：颞下颌关节紊乱病好发于 20~30 岁的青、中年。

23、正确答案：E

答案解析：暂时性面瘫多由于麻药注入腮腺内麻醉面神经而致，带麻醉作用消失后即可恢复。

24、正确答案：C

答案解析：无

25、正确答案：B

答案解析：血友病患者有凝血障碍，牙周膜注射浸润麻醉创伤小，出血少，适用于血友病患者。

26、正确答案：E

答案解析：术前 12 h 禁食，4 h 禁水为防术中呕吐误吸。

27、正确答案：E

答案解析：环甲膜切开术后插管时间最长不宜超过 48 小时。手术时应避免损伤环状软骨，以免术后引起喉狭窄。

28、正确答案：D

答案解析：腭前神经阻滞麻醉时，注射麻药不可过多，注射点不可偏后，以免同时麻醉腭中、腭后神经，引起软腭、悬雍垂麻痹而致恶心或呕吐。

29、正确答案：B

答案解析：在两个三角形组织瓣交叉转移换位后可达到松解挛缩、恢复功能的目的。

30、正确答案：B

答案解析：上牙槽神经阻滞麻醉的区域是上颌牙、牙周膜、牙槽骨、唇颊侧牙龈，而腭侧牙龈、颊黏膜、上唇以及软腭都不是上牙槽神经的支配范围，不能通过上牙槽神经阻滞麻醉的方法来进行麻醉。对上牙槽神经阻滞麻醉的效果可通过颊侧牙龈感觉丧失来判断，此时可进行拔牙的操作。故选 B。

31、正确答案：C

答案解析：急性前脱位是颞下颌关节脱位病例中最常见的类型。

32、正确答案：D

答案解析：拔除下颌牙时，应使患者在张口时，下颌的平面与地平面平行，下颌与术者的肘关节在同一高度或更低。

33、正确答案：C

答案解析：血压高于 180/100 mmHg 应先控制血压后再拔牙。

34、正确答案：B

答案解析：长期翼外肌痉挛的表现疼痛和开口受限，不会引起关节脱位。

35、正确答案：B

答案解析：中性粒细胞低于 $1 \times 10^9 / L$ 易引发严重感染和影响创口愈合。

36、正确答案：C

答案解析：中枢性（核上性）面神经麻痹：病损位于面神经核以上至大脑皮层中枢之间。周围性（核性或核下性）面神经麻痹：面神经运动纤维发生病变所造成的面瘫称为周围性面神经麻痹。前额皱纹消失与不能蹙眉是周围性面瘫的重要临床表现，也是与中枢性面瘫鉴别的主要依据。

37、正确答案：E

答案解析：血友病患者如必须拔牙需要通过输血补充凝血因子Ⅷ。

38、正确答案：C

答案解析：拔牙术引发细菌性心内膜炎的致病菌是甲型溶血性链球菌(绿色链球菌)，此菌对青霉素高度敏感。

39、正确答案：A

答案解析：原发性三叉神经痛神经系统检查常无阳性体征发现，继发性三叉神经痛神经系统呈阳性体征。

40、正确答案：E

答案解析：应从牙根断面的最高点楔入。

41、正确答案：C

答案解析：三叉神经痛“扳机点”的检查方法有：拂诊、触诊、压诊、揉诊。

42、正确答案：A

答案解析：常用的牙种植体种类为骨内种植体。

43、正确答案：B

答案解析：纯钛是目前最佳的牙种植材料。

44、正确答案：E

答案解析：三叉神经痛的首选药物为卡马西平，又名酰胺咪嗪。

45、正确答案：C

答案解析：正常情况下，种植术不会损伤邻牙。

46、正确答案：B

答案解析：左上腭区为腭前神经分布区，左眶下区为面段睑支分布区，均分属第Ⅱ支。

47、正确答案：D

答案解析：牙源性感染是颌面部间隙感染最常见的原因。

48、正确答案：A

答案解析：红、肿、热、痛、功能障碍是颌面部化脓性感染的常见表现。

49、正确答案：D

答案解析：(1)茎乳孔以外：面瘫。(2)鼓索与镫骨肌神经节之间：面瘫+味觉丧失+唾液腺分泌障碍。(3)镫骨肌与膝状神经节之间：面瘫+味觉丧失+唾液腺分泌障碍+听觉改变。(4)膝状神经节：面瘫+味觉丧失+唾液腺、泪腺分泌障碍+听觉改变。

50、正确答案：B

答案解析：边缘性骨髓炎用死骨刮治术，中央性骨髓炎使用死骨摘除术。

51、正确答案：E

答案解析：危险三角区静脉常无瓣膜，感染进入面静脉，经面前静脉逆行引起海绵窦血栓性静脉炎。

52、正确答案：B

答案解析：黏膜亦出现裂隙显然能在表面看到，已经不属于隐形唇裂的范围了。

53、正确答案：D

答案解析：眶下间隙感染不涉及开闭口肌群，一般不会引起张口受限。

54、正确答案：E

答案解析：牙颌面畸形的临床分类：颌骨发育过度，颌骨发育不足，牙源性错畸形，双颌畸形，不对称颌面畸形，继发性颌面畸形。

55、正确答案：B

答案解析：血源性感染为新生儿颌骨骨髓炎的常见来源。

56、正确答案：B

答案解析：舌下间隙感染，只有当感染向口底后方扩散时可出现一定程度的张口受限与呼吸不畅，其程度不及咬肌间隙感染，故A排除。下颌下间隙感染表现为下颌下三角区肿胀，下颌骨下缘轮廓消失，皮肤紧张、压痛，按压有凹陷性水肿，故排除C。眶下间隙感染主要表现为眶下区肿胀，故排除D。颞下间隙感染亦仅表现为颞下三角区肿胀，故排除E。咬肌间隙感染的典型症状是以下颌支及下颌角为中心的咬肌区肿胀、变硬、压痛伴严重张口受限，故选B。

57、正确答案：A

答案解析：口腔颌面部血循环丰富所以易形成血肿。

58、正确答案：D

答案解析：唇腭裂属于多基因遗传。故本题答案是D。

59、正确答案：A

答案解析：表层皮片生存能力强，抗感染能力强。

60、正确答案：B

答案解析：昏迷患者应采用俯卧位，额部垫高，使口鼻悬空，有利于唾液外流和防止舌后坠。

61、正确答案：C

答案解析：新生儿颌骨骨髓炎主要表现为面部眶下内眦皮肤红肿，眼睑肿胀，睑裂狭窄，完全闭合，结膜外翻或眼球突出，上颌牙龈硬腭黏膜红肿等，故排除 A。中央性颌骨骨髓炎急性期死骨尚未形成，故排除 B。边缘性颌骨骨髓炎增生型表现为患侧下颌支及腮腺咬肌区肿硬，皮肤无急性炎症，局部压迫有不适感或轻微疼痛，故排除 D。边缘性颌骨骨髓炎溶解破坏型骨膜、骨密质已被溶解破坏，但不会排出骨片，故 E 排除。慢性中央性颌骨骨髓炎的临床特点主要是口腔内及颌面部皮肤形成多数瘘孔，大量炎性肉芽组织增生，触之易出血，长期排脓；有时从瘘孔排出死骨片，故本题选 C。

62、正确答案：D

答案解析：胚胎第 5 周嗅窝形成，外侧缘高起，称为内外侧鼻突。第 7 周嗅窝底破裂形成鼻孔。胚胎发育到第 8 周，胎儿的面部初步完成。同时，左右上颌突的内面生出一对板状突起称为继发腭突。腭的形成使口腔与鼻腔分开。在已融合的组织内，其前端与鼻中隔相连部分形成硬腭；其后端不与鼻中隔相连部分无骨质发生，即为软腭，其中的中胚叶组织及发育成为软腭的肌肉组织。胚胎第 12 周胎儿的口和鼻，即具备成人的形态结构。故选 D。

63、正确答案：C

答案解析：上颌骨横断骨折时，骨块向后下方移位，可堵塞咽腔，压迫舌根而引起窒息。

64、正确答案：C

答案解析：横放口中能起到上吊上颌骨的只有前磨牙，前牙支不住，后牙放不进去。

65、正确答案：C

答案解析：单侧唇裂手术修复的时间为 3~6 个月，双侧唇裂手术修复的时间为 6~12 个月。

66、正确答案：D

答案解析：挫伤的治疗主要是止血、止痛、预防感染、促进血肿吸收和恢复功能。

67、正确答案：C

答案解析：细菌在创口 6~12 小时以内，多停留在损伤组织的表浅部位，且尚未大量繁殖。

68、正确答案：C

答案解析：前臂皮瓣是动脉干网状血管皮瓣。皮瓣的动脉多为体表浅的动脉主干，口径较粗，易于吻合成功。

69、正确答案：B

答案解析：补钾速度一般每小时不宜超过 20 mmol。不宜超过 40 mmol/L，不宜超过 80 mmol/天。补钾浓度

70、正确答案：B

答案解析：由于休克时血容量减少，细胞缺氧，代谢产生的酸性物质增多，不能及时排除，产生代谢性酸中毒。

71、正确答案：B

答案解析：低钾血症一般不表现为碱性尿。发生低钾血症时，远曲肾小管 Na^+-K^+ 交换减少， Na^+-H^+ 交换增多，排 H^+ 增多，所以尿呈酸性。高钾血症可引起反常性碱性尿。

72、正确答案：E

答案解析：①是一个严重感染病人；②血浆 HCO_3^- 减少；③重症酸中毒表现。在代谢性酸中毒时，由于 HCO_3^- 减少， H_2CO_3 相对增多， PCO_2 增高，刺激呼吸中枢，使呼吸加深加快，以加速呼出 CO_2 。病人同时出现精神症状和血压低，说明酸中毒程度比较重。

73、正确答案：D

答案解析：等渗性缺水：失水与失钠常同时发生。等渗性缺水又称急性缺水或混合性缺水，是外科病人最易发生的。水和钠成比例的丧失，血清钠仍在正常的范围，细胞外液渗透压也保持正常。常见的病因：①消化液的急性丧失如大量呕吐和肠痿等；②体液丧失在感染区或软组织内如腹腔内或腹膜后感染、肠梗阻和烧伤等。低渗性缺水又称慢性缺水或继发性缺水。缺钠多于缺水，血清钠低于正常。细胞外液处于低渗状态。常见的病因：①胃肠道消化液持续丧失，如反复呕吐、胃肠道长期吸引或慢性肠梗阻；②大创面慢性渗液；③肾排钠过多。高渗性缺水又称原发性缺水。缺水多于缺

74、正确答案：D

答案解析：水中毒，说明体内水过多。稀释性低血钠，原因是水过多。可通过肾来维持体液平衡，因此通过利尿，排除多余的水即可达到治疗目的。

75、正确答案：C

答案解析：治疗等渗性脱水理想的液体是平衡盐溶液。

76、正确答案：C

答案解析：失血量 40%，1 600 mL 以上为重度休克。

77、正确答案：C

答案解析：性成熟期是卵巢生殖功能与内分泌功能最旺盛时期。18 岁开始，历时约 30 年，此期卵巢功能成熟，出现周期性排卵。生殖器官各部及乳房，在卵巢分泌的性激素作用下发生周期性变化。

78、正确答案：E

答案解析：世界卫生组织将卵巢功能开始衰退直至绝经后 1 年内的时期称为围绝经期。

79、正确答案：D

答案解析：性成熟期是卵巢生殖功能与内分泌功能最旺盛时期。18 岁开始，历时约 30 年，此期卵巢功能成熟，出现周期性排卵。

80、正确答案：B

答案解析：分泌期早期：月经周期第 15~19 日。此期内膜腺体更长，屈曲更明显；腺上皮细胞核下开始出现含糖原小泡，称为核下空泡，为分泌期早期的组织学特征，螺旋小动脉继续增生、弯曲。

81、正确答案：D

答案解析：婴儿期：出生后至满1周岁之前；是第一个体格生长高峰。

82、正确答案：A

答案解析：围生期死亡率高，尤其生后第一周新生儿早期死亡率最高故选A。

83、正确答案：E

答案解析：克汀病：见于前囟关闭延迟或前囟过大；小头畸形：见于前囟早闭或过小。

84、正确答案：B

答案解析：无

85、正确答案：D

答案解析：考核情绪和情感的区别。情绪和情感是彼此依存的、相互交融的，稳定的情感是在情绪的基础上发展起来的，同时又经过情绪反应加以表达；情绪的变化往往反映情感的深度。情绪指感情过程，具有较大的情景性、激动性和暂时性。情感指具有稳定的、深刻的社会意义的感情，具有较大的稳定性、深刻性和持久性。故正确答案为D。

86、正确答案：C

答案解析：考核情绪形成的三要素。美国心理学家沙赫特提出情绪的产生是受认知过程、环境刺激、生理反应三因素所制约，其中认知因素在情绪的产生中起关键作用。情景即环境刺激。故正确答案为C。

87、正确答案：A

答案解析：考核需要的分级。生理的需要是个体生存必不可少的需要，具有自我和种族保存的意义。生理的需要是人类各种需要中占有最强的优势，当一个人被生理需要所控制时，其他的需要都被推到次要的位置。情绪是当时所处情况对自己需要的满足情况，首先考虑的就是生理需要。故正确答案为A。

88、正确答案：B

答案解析：感觉和知觉都是客观事物作用于感觉器官而被认知的初级阶段，前者为人脑对客观事物个别属性的反映，知觉则是人脑对客观事物整体属性的反映。两者常合称为感觉。本题选B。

89、正确答案：B

答案解析：考核感受变化规律。感觉过敏，即感觉增强，感觉阈值降低或强烈的情绪因素造成。感觉适应是指对持续的同一刺激所产生的应激性形态，特别是感受器的适应。感觉相互作用，是指在一定条件下，各种不同的感觉都可能发生相互作用，从而使感受性发生变化的现象。感觉减退是对事物个别属性的感受减退，即大刺激引起小感受，严重时不引起任何感受。感觉补偿是指人的某种感觉能力丧失后，为适应生活的需要，使其他感觉的能力获得突出的发展，以资补偿。故正确答案为B。

90、正确答案：A

答案解析：考核情绪状态。激情是一种猛烈、迅疾和短暂的情绪。心情项是心神，情绪，兴致，情趣或精神状态。热情是一种强而有力、稳定、持久和深刻的情绪状态。应激是在出乎意料的紧

迫与危险情况下引起的高速而高度紧张的情绪状态。心境是一种微弱、平静而持久的情绪状态。故本题答案为 A。

91、正确答案：C

答案解析：考核动机冲突的类型。趋避冲突为一个人对同一个事物产生两种动机，既向往得到它，同时又想拒绝和避开它。患者既想接受冠状动脉旁路移植术，又担心术中意外，为趋避冲突。故正确答案为 C。

92、正确答案：D

答案解析：本题考核心身疾病的定义。心身疾病是指心理社会因素在疾病的发生、发展过程中起重要作用的躯体性疾病和躯体功能性障碍。故正确答案为 D。

93、正确答案：C

答案解析：本题考核心身疾病的诊断。消化性溃疡是身心疾病，因为应激会导致消化性溃疡的发生，而精神分裂症、抑郁症、精神发育迟滞仅为心理疾病而无躯体障碍，大叶性肺炎仅有躯体障碍。故正确答案为 C。

94、正确答案：E

答案解析：考核心身疾病的诊断。诊断标准为：①有明确的临床症状、体征和病理学改变。②有明显的心理社会因素，与上述改变构成因果关系，且疾病的发生、发展与心理社会因素相平行。③排除神经症、精神病和理化、生物学因素引起的疾病。④用单纯的生物医学的治疗措施收效甚微。故正确答案为 E。

95、正确答案：C

答案解析：医学伦理学的研究对象有：①医患关系；②医务人员相互之间的关系；③医务人员和社会的关系；④医务人员与医学科学发展的关系。故正确答案为 C。

96、正确答案：C

答案解析：本题考核医学伦理学的基本原则。治疗获得患者知情同意是为了维护社会公正，保护患者自主权，协调医患关系，保证医患关系，绝对不是解脱医生责任的做法。故正确答案为 C。

97、正确答案：A

答案解析：考核卫生资源分配。在卫生资源分配上，形式公正是有相关个案以同样的准则加以处理，是根据每个人都享有公平分配的权利。其他是内容公正的根据。故正确答案为 A。

98、正确答案：B

答案解析：本题考核医学伦理学的基本规范的理解。要维护患者的自主权，应避免出现诱导性的词语。故正确答案为 B。

99、正确答案：A

答案解析：考核医患关系。医患关系实质是一种信托关系，即在医疗活动中，医患双方都因为和必须遵守一定的道德原则和规范。故正确答案为 A。

100、正确答案：A

答案解析：医患关系的本质是一种信托关系。信任在先，托付在后。患者看病求医，本身就隐含着对医生的信任，相信医生会把患者的利益放在优先地位。在此前提下，患者才敢放心地把生命托付给医生。故正确答案为 A。

101、正确答案：B

答案解析：双手合诊适用于唇、颊、舌部检查。双手合诊适用于口底、下颌下的检查，按“由后向前”的顺序。腮腺和下颌下腺及其导管主要是采用扪诊检查。腮腺的扪诊一般以食、中、无名指三指平触为宜。

102、正确答案：D

答案解析：舌体是血液循环十分丰富的器官，裂伤后出血明显而且容易致口底肿胀或血肿造成上呼吸道梗阻，因此最佳处理是创口缝合止血，其余方法如注射止血针、用纱布块填塞止血、指压患侧颈总动脉、颈外动脉结扎术均不是最有效方法。

103、正确答案：B

答案解析：牙拔除术中如果牙槽间隔过高，则应用骨钳咬除，否则会影响拔牙创的愈合过程。

104、正确答案：E

答案解析：海绵窦血栓性静脉炎是上唇痛常见的并发症，也是最严重的并发症之一，其特点就是眼球突出及运动受限，伴高血压及结膜淤血等表现。脑膜炎和脓毒血症表现的应是比较泛发的症状，不应有比较定位的表现。

105、正确答案：B

答案解析：头晕，脉快而弱是晕厥的主要特征。

106、正确答案：C

答案解析：管状引流：由普通细橡皮管或导尿管剪成引流管，具有引流作用强、便于冲洗及可注药的特点，多用于颌面颈部较大创口和脓腔的引流。现临床上亦常应用半管引流，引流物系剖开的橡皮管，既保持了引流作用强的特点，又减少了对创口的刺激。

107、正确答案：D

答案解析：切取活检适用于表浅或有溃疡的肿瘤

108、正确答案：E

答案解析：无

109、正确答案：B

答案解析：穿刺检查主要是针对含有内容物的肿块而言，尤其是用于囊性肿块。通过穿刺抽吸肿块的内容物，了解内容物的颜色、透明度、黏稠度、性质等，可以进一步协助诊断。由于穿刺检查简便、易行、直观，有时甚至在临床上可起到一针确诊的效果，因此是一种常用的辅助检查手段。

110、正确答案：E

答案解析：舌外伤，严重出血，缝合止血为最可靠的止血方法。

111、正确答案：C

答案解析：9~11岁上颌骨发育已基本完成，此时手术可以避免对上颌骨生长发育的不利影响。在此期尖牙未萌出，但其牙根已经形成1/2到2/3，在修复牙槽突裂后，可使尖牙能够通过移植骨区萌出，刺激新骨的形成，增加发育不良的牙槽突裂区域的高度。如果牙一旦萌出后再植骨，则移植骨不可能改善牙的牙周支持组织，同时移植骨还因没有良好的刺激导致吸收，从而使牙槽突的高度恢复到术前的水平。

112、正确答案：D

答案解析：口渴、躁狂提示重度缺水。

113、正确答案：C

答案解析：①轻度缺钠：患者有疲乏感，头晕、手足麻木、口渴不明显，血清钠在135 mmol/L以下，尿中钠减少。②中度缺钠：除上述症状，有恶心，呕吐，脉搏细速，血压不稳定，视力模糊，尿量少，血清钠在130 mmol/L以下。③重度缺钠：患者神志不清、肌腱反射减弱或消失，出现木僵，甚至昏迷；常发生休克；血清钠在120 mmol/L以下。

114、正确答案：A

答案解析：根据题干描述，患者极度口渴、尿少而色深，眼窝凹陷、唇、舌干燥、皮肤弹性差。判断患者为中度高渗性脱水。

115、正确答案：B

答案解析：排卵期为4月15日，受精发生在排卵后12小时内，受精后第6~7日，晚期胚泡透明带消失后逐渐埋入并被子宫内膜覆盖的过程，称为受精卵着床。

116、正确答案：A

答案解析：4个月，生后牛乳喂养，故考虑存在维生素D不足，导致低钙惊厥，急诊应控制惊厥和补充钙剂。

117、正确答案：E

答案解析：疱疹性咽炎：咽峡部可见疱疹，多为柯萨奇A组病毒引起。

118、正确答案：C

答案解析：拔出56需要麻醉下牙槽神经、舌神经和颊神经。

119、正确答案：B

答案解析：确定为干槽症的因素：2天后出现激烈疼痛，并向耳颞部、下颌下区放散；有腐败变性的残留血凝块，有恶臭。

120、正确答案：A

答案解析：干槽症的处理局麻下彻底去除牙槽窝内腐败物，冲洗后填入碘仿纱条。

121、正确答案：B

答案解析：疼痛消失后如果仍然有麻木感，需要拍摄X线片以确定是否损伤到神经。

122、正确答案：D

答案解析：中毒兴奋型表现为烦躁不安、多话、颤抖、恶心、呕吐、气急、多汗、血压上升，严重者出现全身抽搐、缺氧、发绀；抑制型迅速出现脉搏细弱、血压下降、神志不清，随即呼吸、心跳停止。

123、正确答案：C

答案解析：症状轻微的患者应平卧解衣扣，保持呼吸通畅，待麻药自行分解；重症患者给氧、补液、抗惊厥、激素及升压药等抢救措施。

124、正确答案：D

答案解析：题干描述，皮肤表面呈大理石样花纹，考虑为气性坏疽，其致病菌为芽胞杆菌。

125、正确答案：B

答案解析：气性坏疽芽胞杆菌对青霉素大多敏感，但剂量需大，每天应在 1 000 万 U 以上。

126、正确答案：E

答案解析：气性坏疽的致病菌为厌氧菌，感染者不多，这类细菌在人体内生长繁殖需具备缺氧环境，切口包扎过紧可致人体局部缺氧而引起厌氧菌感染，气性坏疽。

127、正确答案：C

答案解析：填塞止血法：可用于开放性和洞穿性创口、窦腔出血。一般将无菌纱布或碘仿纱条填塞于创口内，再用绷带行加压包扎。在颈部或口底创口填塞纱布时，应注意保持呼吸道通畅，防止发生窒息。鼻腔出血，在确定无脑脊液漏后方可填塞。

128、正确答案：A

答案解析：钳夹、结扎止血法是常用而可靠的止血方法。对于创口活跃出血的血管断端都应该以钳夹、结扎止血。

129、正确答案：C

答案解析：无

130、正确答案：A

答案解析：无

131、正确答案：E

答案解析：无

132、正确答案：C

答案解析：无

133、正确答案：D

答案解析：无

134、正确答案：B

答案解析：无

135、正确答案：A

答案解析：无

136、正确答案：C

答案解析：无

137、正确答案：E

答案解析：无

138、正确答案：B

答案解析：月经初潮为青春期的重要标志。

139、正确答案：E

答案解析：绝经过渡期是指卵巢功能开始衰退直至最后一次月经的时期。

140、正确答案：C

答案解析：性成熟期是卵巢生殖功能与内分泌功能最旺盛时期。18岁开始，历时约30年，此期卵巢功能成熟，出现周期性排卵。生殖器官各部及乳房，在卵巢分泌的性激素作用下发生周期性变化。

141、正确答案：E

答案解析：出血第一日为月经周期开始，相邻两次月经第一日的间隔时间，称为一个月经周期。

142、正确答案：D

答案解析：分泌期晚期：月经周期第24~28日。此期为月经来潮前期，相当于黄体退化阶段。

143、正确答案：B

答案解析：增殖期：月经周期第5~14日，相当于卵泡发育成熟阶段。

144、正确答案：C

答案解析：分泌期：月经周期第15~28日，相当于黄体期。

145、正确答案：A

答案解析：月经期：月经周期第1~4日。

146、正确答案：D

答案解析：典型成釉细胞瘤的X线表现：早期呈蜂房状，以后形成多房性囊肿样阴影，单房比较少。成釉细胞瘤因为多房性及有一定程度的局部浸润性，故周围囊壁边缘常不整齐、呈半月形切迹。在囊内的牙根尖有不规则吸收现象。

147、正确答案：A

答案解析：牙源性角化囊肿的X线表现为：①有单囊和多囊之分，单囊多见，也可为多房；多房者分房大小相近。②常沿颌骨长轴生长，膨胀不明显；如有膨胀，常向舌侧。③牙根吸收少见，多呈斜面状。④病变内可含牙或不含牙。

148、正确答案：E

答案解析：原发性骨内癌X线特点：①骨内虫蚀状破坏，早期侵犯下颌管；②牙周破坏消融，牙齿悬立其中；③骨皮质破坏与病理性骨折；④无死骨及新骨增生。

149、正确答案：D

答案解析：长春新碱属于植物类抗癌药物。

150、正确答案：C

答案解析：甲氨蝶呤属于抗代谢类抗癌药物。





金英杰医学
JINYINGJIE.COM

医学培训领导品牌
致力于建立完整的医学服务产业链



金鹰直播课



王牌直播课



北京金英杰医考课程

金英杰直播，让学习更容易

全国免费咨询热线：**400-900-9392** 客服及投诉电话：**400-606-1615**

地址：北京市海淀区学清路甲38号金码大厦B座22层