

2022年 中医助理 第二单元 核心押题卷

1. 咳嗽气粗，或喉中有痰声，痰多质黏腻或黄稠，咯吐不爽，舌质红，舌苔黄腻，脉滑数。辨证为

- A. 咳嗽之肺阴亏耗证
- B. 咳嗽之风燥伤肺证
- C. 咳嗽之痰热郁肺证
- D. 咳嗽之痰湿蕴肺证
- E. 咳嗽之肝火犯肺证

参考答案：C

参考解析：咳嗽之痰热郁肺证，证候主症：咳嗽，气息粗促，或喉中有痰声，痰多质黏厚或稠黄，咯吐不爽，或咯血痰，胸胁胀满，咳时引痛，面赤，或有身热，口干而黏，欲饮水，舌质红，舌苔薄黄腻，脉滑数。选项C正确当选。

2. 心悸的辨证，应首辨的要点是

- A. 脉象变化
- B. 外感内伤
- C. 虚实
- D. 寒热
- E. 表里

参考答案：C

参考解析：心悸的辨证首先应辨虚实，虚证者要辨别脏腑气、血、阴、阳何者偏虚，实证者需分清痰、饮、瘀、火，何邪为主。选项C正确当选。

3. 痴呆痰浊蒙窍证，治疗应选用的方剂是

- A. 半夏厚朴汤
- B. 半夏白术天麻汤
- C. 天麻钩藤饮
- D. 涤痰汤
- E. 黄连温胆汤

参考答案：D

参考解析：痴呆痰浊蒙窍证，治当豁痰开窍，健脾化浊，方用涤痰汤加减。本方重在豁痰开窍，兼以益气健脾，适用于痰浊蒙窍之痴呆。选项D正确当选。

4. 治疗津亏热结型噎膈的主方是

- A. 通幽汤
- B. 沙参麦冬汤
- C. 启膈散
- D. 玉枢丹
- E. 一贯煎

参考答案：B

参考解析：噎膈之津亏热结证，证候主症：吞咽梗涩而痛，食入而复出，甚则水饮难进，心烦口干，胃脘灼热，大便干结如羊屎，舌质光红，干裂少津，脉细数。治法：滋阴养血，润燥生津。代表方：沙参麦冬汤加减。选项B正确当选。

5. 患者腹内积块明显，硬痛不移，面黯消瘦，纳食减少，时有寒热，舌紫黯苔薄，脉细涩。其证候是

- A. 肝气郁滞

- B. 食滞痰阻
- C. 气滞血阻
- D. 瘀血内结
- E. 正虚瘀结

参考答案：D

参考解析：积证之瘀血内结证，证候主症：腹部积块明显，质地较硬，固定不移，隐痛或刺痛，形体消瘦，纳谷减少，面色晦暗黧黑，面颈胸臂或有血痣赤缕，女子可见月事不下，舌质紫或有瘀斑瘀点，脉细涩。选项D正确当选。

6. 治疗癃闭肺热壅盛证，应首选的方剂是

- A. 麻黄连翘赤小豆汤
- B. 沉香散
- C. 八正散
- D. 葶苈大枣泻肺汤
- E. 清肺饮

参考答案：E

参考解析：癃闭肺热壅盛证，治法：清泄肺热，通利水道。代表方：清肺饮加减。

7. 治疗悬饮络气不和证宜选用

- A. 柴枳半夏汤
- B. 香附旋覆花汤
- C. 椒目瓜蒌汤合十枣汤
- D. 沙参麦冬汤合泻白散
- E. 苓桂术甘汤合小半夏加茯苓汤

参考答案：B

参考解析：悬饮之络气不和证证候主症：胸胁疼痛，如灼如刺，胸闷不舒，呼吸不畅，或有闷咳，甚则迁延，经久不已，阴雨天更甚，可见病侧胸廓变形，舌苔薄，质黯，脉弦。治法：理气和络。代表方：香附旋覆花汤加减。

8. 对于痹证久病入络，抽掣疼痛，肢体拘挛者，应用下列何种止痛方法

- A. 活血化瘀止痛法
- B. 补虚止痛法
- C. 祛风散寒止痛法
- D. 搜风止痛法
- E. 清热消肿止痛法

参考答案：D

参考解析：痹证久病入络，抽掣疼痛，肢体拘挛者，多用虫类搜风止痛药物。

9. 生于下列哪一部位的有头疽易致内陷

- A. 项后
- B. 四肢
- C. 颜面
- D. 少腹部
- E. 臁中

参考答案：A

参考解析：有头疽的特点：有头疽是发生于肌肤间的急性化脓性疾病。其特点是初起皮肤上即有粟粒样脓头，焮热红肿胀痛，迅速向深部及周围扩散，脓头相继增多，溃烂后状如莲蓬、蜂窝，范围常超过9~12cm，大者可在30cm以上。好发于项后、背部等皮肤厚韧之处，多

见于中老年人及消渴病患者，并容易发生内陷。

10. 治疗乳岩冲任失调证，应首选的方剂是

- A. 神效瓜蒌散合开郁散
- B. 二仙汤合开郁散
- C. 八珍汤合开郁散
- D. 人参养荣汤合开郁散
- E. 参苓白术散合开郁散

参考答案：B

参考解析：乳岩冲任失调证的治法为调摄冲任，理气散结，方用二仙汤合开郁散加减。选项B正确当选。

11. 肉瘿伴急躁易怒，汗出心悸，失眠多梦，消谷善饥，形体消瘦，手部震颤者证属

- A. 肝郁气滞
- B. 气滞痰凝
- C. 气阴两虚
- D. 肝肾不足
- E. 冲任失调

参考答案：C

参考解析：肉瘿气阴两虚证，证候：颈部肿块柔韧，随吞咽动作上下移动；常伴有急躁易怒、汗出心悸、失眠多梦、消谷善饥、形体消瘦、月经不调、手部震颤等；舌红，苔薄，脉弦。治法：益气养阴，软坚散结。方药：生脉散合海藻玉壶汤加减。

12. 中医的失荣相当于西医所说的

- A. 体表肿物
- B. 脂肪瘤
- C. 颈部淋巴结转移癌
- D. 毛细血管瘤
- E. 海绵状血管瘤

参考答案：C

参考解析：失荣是发于颈部及耳之前后的岩肿，因其晚期气血亏乏，面容憔悴，形体消瘦，状如树木枝叶发枯，失去荣华而命名。相当于西医的颈部淋巴结转移癌和原发性恶性肿瘤。属古代外科四大绝症之一。选项C正确当选。

13. 排便或增加腹压时，肛管直肠全层和部分乙状结肠脱出，长8cm以上，呈圆柱形，环状皱襞消失，色红，质软，常因括约肌松弛无力，以致肛门松弛。其脱肛的临床分度是

- A. I度
- B. II度
- C. III度
- D. IV度
- E. V度

参考答案：C

参考解析：直肠脱垂可分为三度：（1）一度脱垂：为直肠黏膜脱出，脱出物淡红色，长3~5cm，触之柔软，无弹性，不易出血，便后可自行回纳。（2）二度脱垂：为直肠全层脱出，脱出物长5~10cm，呈圆锥状，淡红色，表面为环状而有层次的黏膜皱襞，触之较厚，有弹性，肛门松弛，便后有时需用手回复。（3）三度脱垂：直肠及部分乙状结肠脱出，长达10cm以上，呈圆柱形，触之很厚，肛门松弛无力。

14. 脱疽的主要病因病理是

- A. 脾气不健，肾阳不足
- B. 湿热蕴结，寒湿外侵
- C. 湿热下注，气血壅滞
- D. 肝肾不足，气血两亏
- E. 情志郁结，气滞血瘀

参考答案：A

参考解析：脱疽主要是由于脾气不健，肾阳不足，又加外受寒冻，寒湿之邪入侵而发病。本病的发生以脾肾亏虚为本，寒湿外伤为标，气血凝滞、经脉阻塞为其主要病机。选项A正确当选。

15. 月经错后，量少，色黯，小腹冷痛，拒按，属于下列哪种证型

- A. 气滞
- B. 虚寒
- C. 血瘀
- D. 实寒
- E. 血虚

参考答案：D

参考解析：月经后期实寒证主要证候：月经周期延后，量少，色黯有块，小腹冷痛拒按，得热痛减；畏寒肢冷，或面色青白；舌质淡黯，苔白，脉沉紧。选项D正确当选。

16. 月经量多，色黑，且有血块，少腹疼痛拒按，舌边瘀点，脉细涩。证属

- A. 气虚证
- B. 血虚证
- C. 血热证
- D. 血瘀证
- E. 气滞证

参考答案：D

参考解析：月经过多血瘀证，主要证候：经行量多，色紫黯，有血块；经行腹痛，或平时小腹胀痛；舌紫黯或有瘀点，脉涩。治法：活血化瘀止血。方药：失笑散加益母草、三七、茜草。

17. 治疗带下过多热毒蕴结证，应首选的方剂是

- A. 内补丸
- B. 完带汤
- C. 知柏地黄汤
- D. 止带方
- E. 五味消毒饮

参考答案：E

参考解析：带下过多热毒蕴结证，主要证候：带下量多，黄绿如脓，或赤白相兼，或五色杂下，质黏腻，臭秽难闻；小腹疼痛，腰骶酸痛，烦热头晕，口苦咽干，小便短赤，大便干结；舌红，苔黄或黄腻，脉滑数。治法：清热解毒。方药：五味消毒饮加土茯苓、败酱草、鱼腥草、薏苡仁。

18. 妊娠期，阴道少量出血，时下时止而无腰酸腹痛者，应诊断为

- A. 堕胎
- B. 胎漏
- C. 胎动不安
- D. 小产

E. 滑胎

参考答案：B

参考解析：妊娠期间阴道少量出血，时出时止，或淋漓不断，而无腰酸、腹痛、小腹下坠者，称为“胎漏”，亦称“胞漏”或“漏胎”。妊娠期间出现腰酸、腹痛、小腹下坠，或伴有少量阴道出血者，称为“胎动不安”。选项B正确当选。

19. 治疗产后恶露不绝气虚证，应首选的方剂是

- A. 八珍汤
- B. 十全大补汤
- C. 举元煎
- D. 补中益气汤
- E. 生化汤加黄芪

参考答案：D

参考解析：产后恶露不绝气虚证，治法：补气摄血固冲。方药：补中益气汤加艾叶、阿胶、益母草。

20. 子宫脱垂，宫颈已脱出阴道口，宫体仍在阴道内，属于

- A. I度轻型
- B. I度重型
- C. II度轻型
- D. II度重型
- E. III度

参考答案：C

参考解析：子宫脱垂分为3度。I度轻型：宫颈外口距处女膜缘 $<4\text{cm}$ ，未达处女膜缘；重型：宫颈已达处女膜缘，阴道口可见子宫颈。II度轻型：宫颈脱出阴道口，宫体仍在阴道内；重型：部分宫体脱出阴道口。III度：宫颈与宫体全部脱出阴道口外。选项C正确当选。

21. 小儿语言发育，正常能说出简单生活用语，如吃、走、拿等的年龄是

- A. 10个月
- B. 11个月
- C. 1岁
- D. 1岁半
- E. 2岁

参考答案：C

参考解析：小儿语言发育要经过发音、理解和表达3个阶段。新生儿已会哭闹，2个月发喉音，3个月发出咿呀发音，4个月能笑出声，7~8个月会发复音，如“爸爸”“妈妈”，1岁能说出简单的生活用词，1岁半能说出一些要求；2岁后能简单交谈；5岁后能完整表达自己的意思。

22. 胎黄湿热郁蒸证的面目皮肤发黄特点是

- A. 色泽萎黄
- B. 色泽晦暗
- C. 色泽鲜明如橘
- D. 色泽淡黄无泽
- E. 色泽深黄无泽

参考答案：C

参考解析：胎黄湿热郁蒸证的症状为面目、皮肤发黄，色泽鲜明如橘皮色，精神疲倦，不欲吮乳，口渴唇干，重者烦躁不安，呕吐腹胀，大便秘结，小便深黄，舌质红，苔黄腻，指纹

紫红。选项 C 正确当选。

23. 感冒夹惊证的治疗应该在疏风解表基础上加用的方剂是

- A. 镇惊丸
- B. 保和丸
- C. 二陈汤
- D. 桑菊饮
- E. 三拗汤

参考答案：A

参考解析：感冒夹惊证，治法：解表兼以清热镇惊。代表方剂：在疏风解表基础上加用镇惊丸。

24. 营养性缺铁性贫血经治疗血红蛋白已达正常水平，仍需服用铁剂的疗程是

- A. 2 周
- B. 1 个月
- C. 2 个月
- D. 3 个月
- E. 4 个月

参考答案：C

参考解析：治疗贫血一般用硫酸亚铁口服，每次 5~10mg/kg，每日 2~3 次，同时服维生素 C 有助吸收。服用至血红蛋白达正常水平后 2 个月左右再停药。选项 C 正确当选。

25. 治疗急惊风气营两燔证的首选方剂是

- A. 新加香薷饮
- B. 清瘟败毒饮
- C. 清营汤
- D. 白虎汤
- E. 藿香正气散

参考答案：B

参考解析：急惊风气营两燔证，治法：清气凉营，息风开窍。代表方：清瘟败毒饮。

26. 在风疹易感儿群集的地方，须适当隔离，可隔离至出疹后

- A. 3 天
- B. 5 天
- C. 7 天
- D. 9 天
- E. 14 天

参考答案：B

参考解析：风疹预防与调护：(1) 风疹流行期间，不要带易感儿去公共场所。(2) 有接触史者，可口服板蓝根颗粒预防发病。(3) 保护孕妇，尤其在妊娠 3 个月内，应避免与风疹病人接触。(4) 一般可不必采取隔离措施，但在易感儿群集的地方，须适当隔离，可隔离至出疹后 5 天。(5) 患儿在出疹期间不宜外出，防止交叉感染。(6) 注意休息与保暖，多饮开水，对体温较高者可物理降温。

27. 臂外展或平举时，肩部出现两个凹陷，当肩峰前下方凹陷处的穴位是

- A. 肩髃
- B. 肩贞
- C. 肩髃
- D. 肩中俞

E. 肩外俞

参考答案：C

参考解析：肩髃【定位】在三角肌区，肩峰外侧缘前端与肱骨大结节两骨间凹陷中。简便取穴法：屈臂外展，肩峰外侧缘呈现前后两个凹陷，前下方的凹陷即是本穴。

28. 肩胛骨内缘（近脊柱侧点）至后正中线的骨度分寸是

- A. 1.5 寸
- B. 3 寸
- C. 4 寸
- D. 6 寸
- E. 8 寸

参考答案：B

参考解析：肩胛骨内缘（近脊柱侧点）至后正中线的骨度分寸是：3 寸。

29. 以下各项中，不属于解溪穴主治病证的是

- A. 癫狂
- B. 下肢痿痹
- C. 咽喉肿痛
- D. 头痛，眩晕
- E. 腹胀，便秘

参考答案：C

参考解析：解溪【主治】①头痛、眩晕等头部病证；②癫狂、谵语等神志病证；③下肢痿痹、足踝肿痛、足下垂等下肢病证。④腹胀，便秘。

30. 屈膝，在髌骨内上缘上 2 寸，当股四头肌内侧头的隆起处的腧穴善于治疗

- A. 乳痈
- B. 咳嗽
- C. 瘾疹
- D. 四肢疼痛
- E. 全身疼痛

参考答案：C

参考解析：血海，屈膝，在髌骨内上缘上 2 寸，当股四头肌内侧头的隆起处的腧穴为血海。主治：①月经不调、痛经、经闭、崩漏等妇科病证；②湿疹、瘾疹、丹毒、皮肤瘙痒等皮外科病证；③膝股内侧痛。选项 C 正确当选。

31. 位于腕横纹尺侧，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处的腧穴是

- A. 极泉
- B. 少海
- C. 通里
- D. 阴郄
- E. 神门

参考答案：E

参考解析：神门【定位】在腕前区，腕掌侧远端横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处。

32. 除心、心包、胸、神志病外，手厥阴经腧穴还可用于治疗的病证是

- A. 胆病
- B. 脾病
- C. 胃病
- D. 肾病

E. 肝病

参考答案：C

参考解析：手厥阴经主治：①心胸、神志病心痛，心悸，心烦，胸闷，癫狂痫等。②胃腑病证胃痛，呕吐等。③经脉循行部位的其他病证上臂内侧痛，肘臂挛麻，腕痛，掌中热等。选项C正确当选。

33. 位于肩胛区，第7颈椎棘突与肩峰最外侧点连线中点的腧穴是

- A. 天宗
- B. 定喘
- C. 肩井
- D. 大抒
- E. 身柱

参考答案：C

参考解析：肩井【定位】第7颈椎棘突与肩峰最外侧点连线的中点。

34. 治疗气病的八会穴是

- A. 中脘
- B. 太渊
- C. 膻中
- D. 悬钟
- E. 章门

参考答案：C

参考解析：因为治疗气病的八会穴为气会，而膻中穴为气会，主治咳嗽、气喘、胸闷、心痛、噎膈、呃逆等胸中气机不畅的病证，故气病选之。选项C正确当选。

35. 患者，女，63岁。咳嗽反复发作半年，咳声重浊，痰多色白，痰出咳平，每于早晨咳甚痰多，胸闷脘痞，呕恶食少，舌苔白腻，脉濡滑。其证候诊断是

- A. 肝火犯肺证
- B. 痰湿蕴肺证
- C. 痰热郁肺证
- D. 肺阴亏耗证
- E. 风热犯肺证

参考答案：B

参考解析：患者主症为反复咳嗽半年，诊断为咳嗽；咳声重浊，痰多色白，痰出咳平，每于早晨咳甚痰多，胸闷脘痞，呕恶食少，舌苔白腻，脉濡滑辨证为痰湿蕴肺证。

36. 朱某，男，31岁。10天前因外出淋雨，出现高热，时时振寒，汗出烦躁，咳嗽痰多。现症：胸满作痛，转侧不利，咳吐浊痰，呈黄绿色，自觉喉间有腥味，口干咽燥，舌苔黄腻，脉滑数。其诊断是

- A. 肺痈初期
- B. 肺痈恢复期
- C. 肺痈成痈期
- D. 肺痈溃脓期
- E. 咳嗽痰热蕴肺证

参考答案：C

参考解析：患者咳吐腥臭浊痰，诊断为肺痈。肺痈成痈期表现为高热、振寒、咳嗽、气急、胸痛、咳痰黄稠量多、带有腥味等痰瘀热毒蕴肺的证候，辨证为成痈期。

37. 患者，女，52岁，心悸易惊，心烦失眠，五心烦热，口干，盗汗，思虑劳心则症状加重，

伴有耳鸣，腰酸，头晕目眩，舌红少津，苔薄黄或少苔，脉细数。治疗应首选

- A. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤
- B. 苓桂术甘汤
- C. 天王补心丹
- D. 安神定志丸
- E. 桃仁红花煎

参考答案：C

参考解析：患者主症为心悸，见心烦失眠，五心烦热，口干，盗汗，一派阴虚之象。辨证为心悸之阴虚火旺证。代表方天王补心丹合朱砂安神丸。A用于心悸心阳不振证，B用于心悸水饮凌心证，D用于心悸心虚胆怯证，E用于心悸瘀阻心脉证。选项C正确当选。

38. 患者不寐多梦，甚则彻夜不眠，急躁易怒，伴头晕头胀，目赤耳鸣，口干而苦，不思饮食，便秘赤溲，舌红苔黄，脉弦而数，治疗应首选

- A. 归脾汤
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 朱砂安神丸
- D. 天王补心丹
- E. 安神定志丸

参考答案：B

参考解析：患者不寐多梦，甚则彻夜不眠，诊断为不寐。肝郁化火，可见急躁易怒，伴头晕头胀，目赤耳鸣，口干而苦，不思饮食，便秘赤溲，结合舌脉，辨证属肝火扰心证，治当疏肝泻火，镇心安神，方选龙胆泻肝汤加减。选项B正确当选。

39. 男，46岁。初起恶寒发热，咽痛，呕吐，腹泻，经治后，表虽解，腹泻已止，但呕吐反复发作，似饥而不欲食，口燥咽干，舌红少津，脉细数。其证候诊断是

- A. 脾胃气虚证
- B. 肝气犯胃证
- C. 痰饮内阻证
- D. 外邪犯胃证
- E. 胃阴不足证

参考答案：E

参考解析：呕吐，胃阴不足证，证候：呕吐反复发作，或时作干呕，似饥而不欲食，口燥咽干，舌红少津，脉细数。

40. 李某，男，10岁。两天前因饮食不洁后出现痢下赤白脓血，黏稠如胶冻，腥臭，腹部疼痛，里急后重，肛门灼热，小便短赤，舌苔黄腻，脉滑数。其诊断是

- A. 泄泻湿热伤中证
- B. 疫毒痢
- C. 胃痛肝气犯胃证
- D. 湿热痢
- E. 泄泻食滞肠胃证

参考答案：D

参考解析：湿热痢，证候：腹部疼痛，里急后重，痢下赤白脓血，黏稠如胶冻，腥臭，肛门灼热，小便短赤，舌苔黄腻，脉滑数。

41. 齐某，女，45岁。黄疸消退后，脘腹痞闷，肢倦乏力，胁肋隐痛不适，饮食欠香，大便不调，舌苔薄白，脉细弦。其证候诊断是

- A. 湿热留恋证

- B. 脾虚湿滞证
- C. 寒湿阻遏证
- D. 气滞血瘀证
- E. 肝脾不调证

参考答案: E

参考解析: 黄疸, 肝脾不调证, 证候: 黄疸消退后, 脘腹痞闷, 肢倦乏力, 胁肋隐痛不适, 饮食欠香, 大便不调, 舌苔薄白, 脉来细弦。

42. 丁某, 女, 41 岁。疟疾迁延日久, 每遇劳累辄易发作, 发时寒热较轻, 面色萎黄, 倦怠乏力, 短气懒言, 纳少自汗, 舌质淡, 脉细弱。该病证的治法是

- A. 解毒除瘴, 芳化湿浊
- B. 益气养血, 扶正祛邪
- C. 和解表里, 温阳达邪
- D. 祛邪截疟, 和解表里
- E. 软坚散结, 祛瘀化痰

参考答案: B

参考解析: 患者主症为遇劳则复发病, 寒热时作, 见倦怠乏力, 短气懒言, 食少消瘦, 面色萎黄, 可知为疟邪久留, 气血耗伤, 辨证为劳疟。治法: 益气养血, 扶正截疟。

43. 患者, 女, 35 岁。小便涩滞, 尿后余沥不尽, 少腹胀满疼痛, 常因情志不舒而加重, 苔薄白, 脉弦。此病证的治法是

- A. 清热利湿
- B. 利气疏导
- C. 健脾益气
- D. 补虚益肾
- E. 分清泄浊

参考答案: B

参考解析: 患者小便涩滞, 尿后余沥不尽, 诊断为淋证。少腹胀满疼痛, 常因情志不舒而加重, 苔薄白, 脉弦, 辨证为气淋。治法: 理气疏导, 通淋利尿。

44. 陈某, 男, 65 岁, 有前列腺肥大史 7 年。近 1 年小便不畅, 尿如细线, 甚则阻塞不通, 小腹胀满疼痛, 舌紫暗, 或有瘀点, 脉涩。其诊断是

- A. 淋证石淋
- B. 淋证劳淋
- C. 癃闭脾气不升证
- D. 癃闭膀胱湿热证
- E. 癃闭浊瘀阻塞证

参考答案: E

参考解析: 癃闭, 浊瘀阻塞证证候: 小便点滴而下, 或尿如细线, 甚则阻塞不通, 小腹胀满疼痛, 舌紫暗, 或有瘀点, 脉涩。

45. 患者头痛而胀, 甚则头胀如裂, 恶风发热, 面红目赤, 口渴喜饮, 大便不畅, 溲赤, 舌尖红, 苔薄黄, 脉浮数。证属

- A. 风寒头痛
- B. 风热头痛
- C. 风湿头痛
- D. 肝阳头痛
- E. 瘀血头痛

参考答案：B

参考解析：风热头痛证候：头痛而胀，甚则头胀如裂，发热或恶风，面红目赤，口渴喜饮，大便不畅，或便秘，溲赤，舌尖红，苔薄黄，脉浮数。选项B正确当选。

46. 王某，男，36岁。有痫病史10年。反复发作不愈，神疲乏力，心悸气短，面色苍白，体瘦纳呆，舌质淡，苔白腻，脉沉细而弱。此病证的证机概要

- A. 心肾精血亏虚，髓海不足，脑失所养
- B. 瘀血阻窍，脑络闭塞，脑神失养
- C. 气血耗伤，心脾两伤，心神失养
- D. 痰浊蕴结，气郁化火，上扰脑神
- E. 痰浊中阻，上蒙清窍，清阳不升

参考答案：C

参考解析：痫病，心脾两虚证，证候：反复发作不愈，神疲乏力，心悸气短，失眠多梦，面色苍白，体瘦纳呆，大便溏薄，舌质淡，苔白腻，脉沉细而弱。证机概要：痫发日久，耗伤气血，心脾两伤，心神失养。

47. 患者久病尿血，体倦乏力，气短声低，面色不华，舌质淡，脉弱。治疗应首选

- A. 知柏地黄丸
- B. 无比山药丸
- C. 小蓟饮子
- D. 归脾汤
- E. 十灰散

参考答案：D

参考解析：患者诊断为尿血。体倦乏力，气短声低，面色不华皆因脾虚，辨证为脾不统血证。治宜补中健脾，益气摄血，方用归脾丸。知柏地黄丸用于肾虚火旺之尿血；无比山药丸用于肾气不固之尿血；小蓟饮子用于下焦热盛之尿血。选项D正确当选。

48. 某患者，身热已退而见肢体软弱无力，肌肉瘦削，口干咽干较甚，小便黄赤，大便干燥。舌质红，苔黄，脉细数。宜选用

- A. 清燥救肺汤
- B. 玉女煎
- C. 胃苓汤
- D. 益胃汤
- E. 桑杏汤

参考答案：A

参考解析：痿证之肺热津伤证证候主症：发病急，病起发热，或热后突然出现肢体软弱无力，可较快发生肌肉瘦削，皮肤干燥，心烦口渴，咳呛少痰，咽干不利，小便黄赤或热痛，大便干燥，舌质红，苔黄，脉细数。证机概要：肺燥伤津，五脏失润，筋脉失养。治法：清热润燥，养阴生津。代表方：清燥救肺汤加减。

49. 患者，男，45岁。小便不畅，尿线变细或点滴而下，小腹胀满隐痛，舌质暗或有瘀点瘀斑，苔白或薄黄，脉弦或涩。治疗应首选

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 石韦散
- C. 八正散
- D. 沉香散
- E. 以上都不是

参考答案：D

参考解析：精癃，气滞血瘀证，证候：小便不畅，尿线变细或点滴而下，或尿道涩痛，闭塞不通，或小腹胀满隐痛，偶有血尿。舌质暗或有瘀点瘀斑，苔白或薄黄，脉弦或涩。治法：行气活血，通窍利尿。方药：沉香散加减。

50. 某男性患者，56岁，患冠心病多年，3小时前突然出现双下肢剧烈疼痛，行走困难，局部皮肤苍白，查双下肢股动脉搏动消失，双膝以下皮温低，肌力4级，中医诊断初步为

- A. 青筋腿
- B. 股肿
- C. 脱疽
- D. 臁疮
- E. 血瘤

参考答案：C

参考解析：脱疽特点：好发于四肢末端，以下肢多见，初起患肢末端发凉、怕冷，苍白，麻木，可伴间歇性跛行，继则疼痛剧烈，日久患趾（指）坏死变黑，甚至趾（指）节脱落。部分患者起病急骤，进展迅速，预后严重，需紧急处理。

51. 患者转移性右下腹痛，呈持续性、进行性加剧，右下腹局限性压痛或拒按，伴恶心纳差，可有轻度发热。苔白腻，脉弦滑或弦紧。治疗应选用

- A. 仙方活命饮合黄连解毒汤
- B. 止痛如神汤
- C. 大黄牡丹汤合红藤煎剂
- D. 复方大柴胡汤
- E. 大黄牡丹汤合透脓散

参考答案：C

参考解析：转移性右下腹痛，呈持续性、进行性加剧，右下腹局限性压痛或拒按为肠痈典型临床表现与体征。六腑以通为用，通腑泄热是治疗肠痈的主要法则。恶心纳差，可有轻度发热，苔白腻，脉弦滑或弦紧，为瘀滞证，应治以行气活血，通腑泄热。方用大黄牡丹汤合红藤煎剂加减。选项C正确当选。

52. 患者，男，30岁。肛门部有物反复脱出近10年。检查：脱出物呈圆锥状，长约7cm，上可见沟纹。其诊断是

- A. 混合痔
- B. 内痔三期
- C. 一度直肠脱垂
- D. 二度直肠脱垂
- E. 三度直肠脱垂

参考答案：D

参考解析：直肠脱垂可分为三度。一度脱垂：为直肠黏膜脱出，脱出物淡红色，长3~5cm，触之柔软，无弹性，不易出血，便后可自行回纳。二度脱垂：为直肠全层脱出，脱出物长5~10cm，呈圆锥状，淡红色，表面为环状而有层次的黏膜皱襞，触之较厚，有弹性，肛门松弛，便后有时需用手回复。三度脱垂：直肠及部分乙状结肠脱出，长达10cm以上，呈圆柱形，触之很厚，肛门松弛无力。内痔脱出时痔核分颗脱出，无环状黏膜皱襞，暗红色或青紫色，容易出血。选项D正确当选。

53. 患者头发脱落病程较长，呈斑片状脱落，脱落前先有头痛，夜多噩梦，难以入睡；舌质暗红，有瘀斑，舌苔薄，脉沉细。其诊断及证候是

- A. 斑秃血热风燥证
- B. 斑秃气血两虚证

- C. 斑秃气滞血瘀证
- D. 斑秃肝肾不足证
- E. 斑秃心肾不交证

参考答案：C

参考解析：斑秃又称油风。油风之气滞血瘀证证候：头发脱落前常有头痛或胸胁疼痛等症；伴夜多噩梦，烦热难眠；舌质暗红，有瘀点、瘀斑，舌苔薄，脉沉细。

54. 患者，男，45岁。左上臂内侧有一肿块，呈半球形，暗红色，质地柔软，状如海绵，压之缩小。应首先考虑的是

- A. 气瘤
- B. 筋瘤
- C. 脂瘤
- D. 血瘤
- E. 肉瘤

参考答案：D

参考解析：血瘤可发生于身体任何部位，但以四肢、躯干、面颈部多见。常在出生后即发现，随着年龄增长而长大，长到某种程度后，可停止进展。瘤体外观呈暗红色或紫蓝色，亦可为正常皮色，小如豆粒，大如拳头，质地柔软，状如海绵，压之可缩小，肢体活动时胀大。选项D正确当选。

55. 患者月经提前10天，量多，经色深红，质稠，经行不畅，有块；时有少腹胀痛，乳房胀痛，口苦咽干，经期烦躁易怒，舌红，苔薄黄，脉弦数。应首先考虑的诊断为

- A. 痛经
- B. 月经先期
- C. 月经过多
- D. 经行乳房胀痛
- E. 经行情志异常

参考答案：B

参考解析：月经先期又称为“经期超前”“经行先期”“经早”“经水不及期”等。其主症是月经周期提前7天以上，甚至十余日一行，连续两个周期以上者称为“月经先期”。

56. 患者月经每提前8~9天来潮，量多，色深红，质黏稠，伴心烦，面红口干，小便短黄，大便燥结，舌红，胎黄，脉数。其治法是

- A. 清热降火，凉血调经
- B. 清肝解郁，凉血调经
- C. 养阴清热，凉血调经
- D. 补肾益气，固冲调经
- E. 补脾益气，固冲调经

参考答案：A

参考解析：月经每提前8~9天来潮，辨病为月经先期。阳盛则热，热扰冲任、胞宫，冲任不固，经血妄行，故月经提前来潮、经量增多；血为热灼，故经色深红或紫红，质黏稠；热邪扰心则心烦；热甚伤津则口干，小便黄，大便燥结；面红，舌红，苔黄，脉数，均为热盛于里之象。辨证为阳盛血热证，治以清热降火，凉血调经，方用清经散。选项A正确当选。

57. 患者月经先后无定期，量少，色淡暗，质清稀，腰骶酸痛，头晕耳鸣；舌淡，苔白，脉细弱。其治法是

- A. 益气调经
- B. 养血调经

- C. 补肾调经
- D. 健脾调经
- E. 疏肝调经

参考答案：C

参考解析：肾气虚弱，封藏失司，冲任不调，血海蓄溢失常，以致月经先后无定期；肾气亏损，阴阳两虚，阴不足则经量少，阳不足则经质稀、量少；腰痛、头晕、舌脉均为肾气不足之症。治法：补肾调经。

58. 患者，女，36岁，已婚。两次月经中间，阴道少量出血，色鲜红；头晕腰酸，夜寐不宁，五心烦热。舌质红，苔薄，脉细数。其治法是

- A. 益气补肾，固冲止血
- B. 滋肾养阴，固冲止血
- C. 养阴清热，固冲止血
- D. 补肾养肝，固冲止血
- E. 益气养阴，凉血清热

参考答案：B

参考解析：经期间氤氲之时，阳气内动，若肾阳偏虚，虚火内生，虚火与阳气相搏，损伤阴络，冲任不固，而见阴道出血；阴虚阳动故色鲜红、五心烦热；腰酸头晕难寐，舌红，脉细数，均为肾阴虚损之症。治法为滋肾养阴，固冲止血。选项B正确当选。

59. 患者经期小腹冷痛拒按，得热痛减；月经推后，量少，经色暗而有瘀块；面色青白，肢冷畏寒；舌暗，苔白，脉沉紧。其治法是

- A. 温肾助阳，暖宫止痛
- B. 温经散寒，化瘀止痛
- C. 滋肾养血，缓急止痛
- D. 温经散寒，养血止痛
- E. 散寒利湿，化瘀止痛

参考答案：B

参考解析：痛经寒凝血瘀证，主要证候：经前或经期小腹冷痛拒按，得热痛减；月经或见推后，量少，经色暗而有瘀块；面色青白，肢冷畏寒；舌暗，苔白，脉沉紧。治法：温经散寒，化瘀止痛。

60. 患者，女，55岁。带下量少，阴部干涩，头晕耳鸣，腰膝酸软，烘热汗出，夜寐不安，小便黄，大便干结，舌红，少苔，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 小营煎
- B. 归肾丸
- C. 左归丸
- D. 知柏地黄丸
- E. 桃红四物汤

参考答案：C

参考解析：带下量明显减少，导致阴中干涩痒痛，辨病为带下过少。肝肾亏损，血少津乏，阴液不充，任带失养，不能润泽阴道，发为带下过少；精血两亏，清窍失养，则头晕耳鸣；肾虚外府失养，则腰膝酸软；肝肾阴虚，虚热内生，则烘热汗出，烦热胸闷，夜寐不安，小便黄，大便干结；舌红少苔，脉细数等均为肝肾亏损之征。治以滋补肝肾，养精益血，方用左归丸加知母、肉苁蓉、紫河车、麦冬。选项C正确当选。

61. 患儿，生后1天。症见面目皮肤发黄，色泽鲜明如橘，哭声响亮，不欲吮乳，口渴唇干，大便秘结，小便深黄，舌质红，苔黄腻。其治法是

- A. 行气化痰消积
- B. 温中化湿退黄
- C. 清热利湿退黄
- D. 平肝息风，利湿退黄
- E. 大补元气，温阳固脱

参考答案：C

参考解析：胎黄湿热郁蒸证，证候：面目皮肤发黄，色泽鲜明如橘，哭声响亮，不欲吮乳，口渴唇干，或有发热，大便秘结，小便深黄，舌质红，苔黄腻。治法：清热利湿退黄。

62. 患儿，4岁。发热2天，低热，恶寒，无汗，鼻塞流涕，喷嚏较剧，痰多，痰白清稀，舌红，苔薄白。其治疗在疏风解表的基础上，应加用的方剂是

- A. 桑菊饮
- B. 三拗汤
- C. 桑杏汤
- D. 桑白皮汤
- E. 麻杏石甘汤

参考答案：B

参考解析：根据患儿症状可诊断为感冒风寒夹痰证。治法为辛温解表，宣肺化痰，方药在疏风解表的基础上，加二陈汤、三拗汤。选项B正确当选。

63. 患儿，1岁。泄泻时轻时重，已经3月，大便清稀，夹不消化食物，有时便后脱肛，形寒肢冷，精神萎靡，指纹色淡。治疗应首选

- A. 异功散合平胃散
- B. 保和丸合二陈汤
- C. 参苓白术散合理中丸
- D. 附子理中汤合四神丸
- E. 金匱肾气丸合人参乌梅汤

参考答案：D

参考解析：脾肾阳虚泻证，治法：温补脾肾，固涩止泻。代表方：附子理中汤合四神丸。选项D正确当选。

64. 患儿，男，7岁。多动难静，急躁易怒，冲动任性，难以自控；神思涣散，注意力不集中，难以静坐；或有记忆力欠佳、学习成绩低下，或有遗尿、腰酸乏力。或有五心发热、盗汗、大便秘结，舌质红，舌苔薄，脉细弦。治疗应首选

- A. 左归丸
- B. 六味地黄丸
- C. 知柏地黄丸
- D. 杞菊地黄丸
- E. 黄连温胆汤

参考答案：D

参考解析：根据患儿症状可诊断为注意力缺陷多动障碍之肝肾阴虚证，治法为滋养肝肾，平肝潜阳，方用杞菊地黄丸。选项D正确当选。

65. 患儿，男，2岁。语言发言迟滞，精神呆滞，智力低下，头发生长缓慢，发稀萎黄，肌肉松弛，口角流涎，纳食欠佳，大便秘结，舌淡胖，苔少，指纹色淡。治疗应首选

- A. 调元散
- B. 加味六味地黄丸
- C. 通窍活血汤合二陈汤

D. 归脾丸

E. 肾气丸

参考答案：A

参考解析：五迟、五软首辨脏腑，立迟、行迟、齿迟、头项软、手软、足软，主要为肝肾脾不足；语迟、发迟、肌肉软、口软，主要为心脾不足；伴有脑性瘫痪、智力低下者，常兼有痰浊瘀血阻滞心经脑络。此患儿见语言发育迟滞，头发生长缓慢，发稀萎黄，肌肉松弛，辨证为心脾两虚证，治宜健脾养心，补益气血，用调元散。选项A正确当选。

66. 患儿，8岁，腹痛以脐周痛为主，食欲不振，日渐消瘦，大便不调，时吐清涎，或恶心、呕吐，或吐蛔虫，精神萎靡，睡眠不安，寐中磨牙，爱挖鼻孔，咬衣角，嗜食异物。舌苔薄腻，舌尖红赤，舌体常见红色刺点。诊断为

A. 蛔厥证

B. 肠虫证

C. 蛲虫病

D. 姜片虫病

E. 绦虫病

参考答案：B

参考解析：肠虫证：脐腹部疼痛，轻重不一，时作时止，或不思饮食，或嗜食异物，大便不调，或泄泻或便秘，或便下蛔虫，面色多黄滞，可见面部白斑，白睛蓝斑，唇内粟状白点，夜寐齟齿。甚者，腹部可扪及条索状物，时聚时散，形体消瘦，肚腹胀大，青筋显露。舌苔多见花剥或腻，舌尖红赤，脉弦滑。选项B正确当选。

67. 患者，男，45岁。关节肌肉疼痛，屈伸不利，疼痛较剧，痛有定处，遇寒痛增，得热痛减，局部皮色不红，触之不觉热，舌苔薄白，脉弦紧。治疗除选用阿是穴、局部经穴外，还应选用的穴位是

A. 肾俞、关元

B. 阴陵泉、足三里

C. 大椎、曲池

D. 膈俞、关元

E. 膈俞、血海

参考答案：A

参考解析：患者诊断为痛痹；主穴为阿是穴和局部经穴；行痹加膈俞、血海，排除E；痛痹加肾俞、关元；着痹加阴陵泉、足三里，排除B；热痹加大椎、曲池，排除C。选项A正确当选。

68. 患者，男，32岁。恶寒发热2天，伴咽喉肿痛，口渴，舌苔薄黄。治疗除取主穴外，还应选用的穴位是

A. 风门、肺俞

B. 外关、身柱

C. 曲池、中府

D. 阴陵泉、委中

E. 曲池、尺泽

参考答案：E

参考解析：患者诊断为感冒，证型为风热感冒。治疗除主穴外，加曲池、尺泽。风寒感冒，加风门、肺俞，排除A；全身酸楚，加外关、身柱，排除B；暑湿感冒，加阴陵泉、委中，排除D。选项E正确当选。

69. 某女，20岁。食海鲜后皮肤出现大小不等、形状不一的风团，高起皮肤，边界清楚，色

红，瘙痒，伴恶心，肠鸣泄泻，舌红，苔黄腻，脉滑数。除主穴外，应加取

- A. 太椎、风门
- B. 足三里、天枢
- C. 风门、肺俞
- D. 足三里、脾俞
- E. 三阴交、风池

参考答案：B

参考解析：根据患者表现诊断为瘾疹胃肠积热证，配天枢、足三里。

70. 患者，女，30岁。乳房肿块和疼痛在月经前加重，兼腰酸乏力，月经失调，色淡量少，舌淡，脉沉细。针刺应选取的配穴为

- A. 阳陵泉、光明
- B. 天枢、气穴
- C. 肝俞、太冲
- D. 脾俞、胃俞
- E. 关元、肝俞

参考答案：E

参考解析：乳房肿块和疼痛在月经前加重，兼腰酸乏力，月经失调，色淡量少，舌淡，脉细，诊断为乳癖之冲任失调。乳癖的治法为理气化痰，调理冲任，取足阳明、足厥阴经穴为主。冲任失调配关元、肝俞、肾俞以调冲任。选项E正确当选。

71. 患者，女，30岁。右上腹痛，阵发性加剧，并向右肩部放射，伴有恶心、呕吐，针灸取穴除阳陵泉、日月外，还可用

- A. 胆囊穴、胆俞
- B. 阑尾穴、中脘
- C. 胆囊穴、京门
- D. 中脘、天枢
- E. 梁丘、太冲

参考答案：A

参考解析：根据题干症状诊断为：胆绞痛。胆绞痛的针灸治疗：主穴：胆囊穴、阳陵泉、胆俞、日月。选项A正确当选。

72. 患者咽喉肿痛，咽干，口渴，便秘，尿黄，舌红，苔黄，脉洪大。除少商、合谷、尺泽、关冲外，应加取

- A. 内庭、关冲
- B. 厉兑、天突
- C. 内庭、鱼际
- D. 列缺、照海
- E. 曲池、鱼际

参考答案：C

参考解析：咽喉肿痛，肺胃热盛证：咽喉部红肿疼痛兼吞咽困难，高热，口渴喜饮，大便秘结，小便黄赤，舌红，苔黄，脉数有力者为肺胃热盛。除主穴为，应配内庭、鱼际。

73. 患者，女，41岁。肩关节疼痛，抬举困难，夜间痛甚，劳遇累加剧。治疗应首选

- A. 循经取穴
- B. 近取穴与远取穴相结合
- C. 手阳明经穴
- D. 近取穴为主

E. 手太阳经穴

参考答案：B

参考解析：此患者所患之病为漏肩风，疼痛以肩前外部为主者为手阳明经证，以肩外侧为主者为手少阳经证，以肩后部为主者为手太阳经证，以肩前部为主者为手太阴经证。漏肩风的治法通经活络，舒筋止痛。取局部穴位为主，配合循经远端取穴。选项B正确当选。

74. 患者头部空痛10年，头痛隐隐，遇劳发作，兼头晕，神疲乏力，面色不华，舌淡，脉细弱。其辨证为

- A. 风湿头痛
- B. 血虚头痛
- C. 痰浊头痛
- D. 瘀血头痛
- E. 肝阳上亢头痛

参考答案：B

参考解析：血虚头痛：头空痛、昏痛，兼神疲无力，面色不华，舌淡苔白，脉细弱者为血虚头痛。

75. 患者2天前受风后出现左侧面部麻木，额纹变浅，眼裂变大，鼻唇沟变浅，舌淡，苔薄白。针刺面部穴位应采用

- A. 直刺深刺
- B. 重插重提
- C. 轻刺浅刺
- D. 提插泻法
- E. 电针强刺

参考答案：C

参考解析：根据患者表现可知为面瘫发病初。发病初期，面部腧穴取穴宜少，针刺宜浅，手法宜轻；肢体远端腧穴行泻法且手法宜重；恢复期，足三里行补法，合谷、太冲行平补平泻法。

76. 患者，女，45岁。失眠2个月，近日来入睡困难，有时睡后易醒，醒后不能再睡，甚至彻夜不眠，舌苔薄，脉沉细。治疗应首选

- A. 神门、内关
- B. 神门、胆俞
- C. 神门、三阴交
- D. 心俞、脾俞
- E. 心俞、足三里

参考答案：C

参考解析：A、E治疗失眠伴随脾胃不和之症状。B治疗失眠伴心胆气虚之症状。D治疗失眠伴心脾亏虚之症状。C神门为心经的原穴，功能补益心气，主治心痛心烦，惊悸怔忡，失眠健忘等心与神志病证。三阴交功用为健脾和胃，调理气血，通经活络，可治疗心悸、失眠、高血压等证。本题为不寐，治疗应补气养心安神。选项C正确当选。

77. 患者哮喘多年，喘促气短，动则喘甚，汗出肢冷，舌淡，脉沉细。治疗除手太阴经穴外，还应选取的是

- A. 足太阴、任脉穴
- B. 足太阴、足少阴经穴
- C. 足厥阴、督脉穴
- D. 足少阴、背俞穴

E. 足少阴、督脉穴

参考答案：D

参考解析：根据患者表现诊断为虚证哮喘，治法：补益肺肾，止哮平喘。取相应背俞穴及手太阴、足少阴经穴为主。

78. 某男，50岁，腹泻2年。晨起即腹痛，泻后痛减，腹冷喜暖，精神疲乏，腰酸腿软，四肢发冷，舌淡，苔白，脉沉细。治疗除神阙、天枢、足三里、公孙外，应加用

- A. 阴陵泉、命门
- B. 阴陵泉、脾俞
- C. 脾俞、太白
- D. 肾俞、关元
- E. 下脘、关元

参考答案：D

参考解析：根据题干症状辨证为：肾阳虚衰之泄泻。泄泻的配穴如下：脾气虚弱配脾俞、太白；肾阳虚衰配肾俞、关元；肝气乘脾配肝俞、太冲。久泻虚陷者配百会。

79. 患者大便排出困难，腹中冷痛，面色晄白，畏寒喜暖，小便清长，舌淡苔白，脉沉迟。治疗除主穴外，还应加用

- A. 合谷、内庭
- B. 太冲、中脘
- C. 脾俞、气海
- D. 神阙、关元
- E. 足三里、气海

参考答案：D

参考解析：根据患者表现诊断为冷秘，除主穴为，还应选取的腧穴为神阙、关元。

80. 患者，女，26岁。每至经期出现腹痛，痛势绵绵，月经色淡，量少，伴面色苍白，倦怠无力，舌淡，脉细弱。治疗除三阴交、关元、足三里外，宜选取

- A. 太冲、血海
- B. 关元、归来
- C. 太冲、气海
- D. 太溪、肾俞
- E. 气海、脾俞

参考答案：E

参考解析：患者每至经期出现腹痛，痛势绵绵，月经色淡，量少，属痛经，伴面色苍白，倦怠无力，舌淡，脉细弱，属气血亏虚。治疗宜调补气血、温养冲任，可取气海、脾俞以补血益气。选项E正确当选。

81. 某女，23岁。经期提前半年余，每次提前10天左右，月经量多，色深红，质黏稠，伴心胸烦热，小便短赤，舌红苔黄，脉数。除关元、三阴交、血海外，应加用

- A. 行间
- B. 太溪
- C. 脾俞、足三里
- D. 命门、关元
- E. 气海、归来

参考答案：A

参考解析：根据患者表现诊断为月经先期实热证，配以行间治疗。

82. 患者烦渴多饮，口干舌燥，尿量频多，舌边尖红，苔薄黄，脉数。治疗应选用的是

- A. 足阳明、手阳明、足太阴经穴
- B. 相应募穴、手阳明、足太阴经穴
- C. 相应背俞穴、足少阴、足太阴经穴
- D. 相应背俞穴、足少阴、手太阴经穴
- E. 相应募穴、足少阴、足太阴经穴

参考答案：C

参考解析：患者烦渴多饮，尿量多，诊断为消渴，其治法为养阴生津，清热润燥。取相应脏腑背俞穴及足太阴、足少阴经穴为主。

综合分析题

患者，男，25岁。发热2天。恶寒较甚，发热，无汗，头痛身楚，咳嗽，痰白，咳痰无力，平素神疲体弱，气短懒言，反复易感，舌淡苔白，脉浮而无力。

83. 其证候是

- A. 风寒束表
- B. 风热犯表
- C. 阴虚感冒
- D. 气虚感冒
- E. 暑湿伤表

参考答案：D

参考解析：气虚感冒证候：恶寒较甚，发热，无汗，头痛身楚，咳嗽，痰白，咳痰无力，平素神疲体弱，气短懒言，反复易感，舌淡苔白，脉浮而无力。

84. 其治法是

- A. 益气解表
- B. 滋阴解表
- C. 辛温解表
- D. 辛凉解表
- E. 清暑祛湿解表

参考答案：A

参考解析：气虚感冒治法：益气解表。

85. 治疗应首选

- A. 玉屏风散
- B. 参苏饮加减
- C. 荆防达表汤或荆防败毒散加减
- D. 银翘散或葱豉桔梗汤加减
- E. 新加香薷饮加减

参考答案：B

参考解析：气虚感冒代表方：参苏饮加减。

86. 若恶寒重，发热轻，四肢欠温，语音低微，舌质淡胖，脉沉细无力，为阳虚感冒，当助阳解表。治疗应首选

- A. 荆防达表汤或荆防败毒散加减
- B. 再造散
- C. 加减葶藶汤
- D. 新加香薷饮加减
- E. 银翘散或葱豉桔梗汤加减

参考答案：B



参考解析：见恶寒重，发热轻，四肢欠温，语音低微，舌质淡胖，脉沉细无力，为阳虚感冒，当助阳解表，用再造散加减。

综合分析题

患者，男，75岁。患者有哮喘病史二十余年。动则喘甚，呼多吸少，气不得续，形瘦神惫，跗肿，汗出肢冷，面青唇紫，舌淡苔白，脉微细。

87. 其证候是

- A. 肺气虚耗证
- B. 肾虚不纳证
- C. 痰浊阻肺证
- D. 痰热郁肺证
- E. 肺气郁痹证

参考答案：B

参考解析：患者有哮喘病史，动则喘甚，诊断为喘证。动则喘甚，呼多吸少，气不得续，形瘦神惫，跗肿，汗出肢冷，面青唇紫，舌淡苔白，脉微细。辨证为肾虚不纳证。

88. 其治法是

- A. 开郁降气平喘
- B. 补肺益气养阴
- C. 补肾纳气
- D. 补肺益气养阴
- E. 扶阳固脱，震慑肾气

参考答案：C

参考解析：喘证肾虚不纳证，治法：补肾纳气。

89. 治疗应首选

- A. 金匱肾气丸合参蛤散加减
- B. 二陈汤合三子养亲汤加减
- C. 麻杏石甘汤加味
- D. 生脉饮合补肺汤加减
- E. 桑白皮汤加减

参考答案：A

参考解析：喘证肾虚不纳证，代表方：金匱肾气丸合参蛤散加减。

90. 在上证基础上，若患者又出现痰浊壅肺，喘咳痰多，气急胸闷，苔腻，治疗用首选

- A. 麻杏石甘汤加味
- B. 二陈汤合三子养亲汤加减
- C. 麻黄汤合华盖散加减
- D. 苏子降气汤
- E. 五磨饮子

参考答案：D

参考解析：若出现痰浊壅肺，喘咳痰多，气急胸闷，苔腻，此为上盛下虚，宜用苏子降气汤。

综合分析题

患者，男，38岁。胸闷反复发作2年。此次因情志不遂而诱发，心胸满闷，隐痛阵发，时欲太息，胃脘胀闷，得暖气或矢气则舒，苔薄腻，脉细弦。

91. 其治法是

- A. 通阳泄浊，豁痰宣痹

- B. 活血化瘀，通脉止痛
- C. 疏肝理气，活血通络
- D. 辛温散寒，宣通心阳
- E. 益气养阴，活血通脉

参考答案：C

参考解析：患者刻下心胸满闷，隐痛而发，诊断为胸痹。因情志不遂而诱发时欲太息，胃脘胀闷，得暖气或矢气则舒辨证为，气滞心胸证。治法为疏肝理气，活血通络。

92. 治疗应首选

- A. 栝蒌薤白半夏汤合涤痰汤加减
- B. 血府逐瘀汤加减
- C. 枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤加减
- D. 柴胡疏肝散加减
- E. 生脉散合人参养荣汤加减

参考答案：D

参考解析：胸痹之气滞心胸证，代表方：柴胡疏肝散加减。

93. 若气郁日久化热，心烦易怒，口干便秘，舌红苔黄，脉弦数者，治疗应选

- A. 栝蒌薤白半夏汤合涤痰汤加减
- B. 血府逐瘀汤加减
- C. 丹栀逍遥散
- D. 参附汤合右归饮加减
- E. 柴胡疏肝散加减

参考答案：C

参考解析：气郁日久化热，心烦易怒，口干便秘，舌红苔黄，脉弦数者，用丹栀逍遥散。

综合分析题

患者，男，72岁。2小时前，突然昏倒，不省人事，二便闭结，牙关紧闭，舌质红，苔黄，脉弦而有力。

94. 该病患属于什么病

- A. 痫证
- B. 痿证
- C. 厥证
- D. 中风
- E. 痉证

参考答案：D

参考解析：中风诊断依据：突然昏仆，不省人事，半身不遂，偏身麻木，口舌歪斜，言语蹇涩等特定的临床表现。轻症仅见眩晕，偏身麻木，口舌歪斜，半身不遂等。

95. 其证候是

- A. 阳闭证
- B. 风阳上扰证
- C. 风痰瘀阻证
- D. 阴虚风动证
- E. 脱证

参考答案：A

参考解析：阳闭证，证候：除闭症主要症状外，兼见面红身热，气粗口臭，躁动不安，痰多

而黏，舌质红，苔黄腻，脉弦滑有力。

96. 治疗此证应首选的方剂是

- A. 镇肝息风汤加减
- B. 天麻钩藤饮加减
- C. 半夏白术天麻汤合桃仁红花煎加减
- D. 涤痰汤合用苏合香丸加减
- E. 羚羊角汤合用安宫牛黄丸加减

参考答案：E

参考解析：中风阳闭证，治法：清肝息风，豁痰开窍。代表方：羚羊角汤合用安宫牛黄丸加减。

97. 该患者若兼有神昏抽搐，可合用

- A. 大定风珠
- B. 人工麝香
- C. 紫雪丹
- D. 至宝丹
- E. 安宫牛黄丸

参考答案：C

参考解析：痰盛神昏者，合用至宝丹；热闭神昏兼有抽搐者，可加全蝎、蜈蚣，或合用紫雪丹。临床还可酌情选用清开灵注射液或醒脑静注射液静脉滴注。则神识可清，危象可解。

综合分析题

患者，女，20岁。有大便困难病史10年。自诉近2周来，排便时肛门呈刀割样疼痛，约持续半天。大便两三日一行，质干硬，伴有肛门滴血，腹胀，溲黄，舌红，脉弦数。

98. 其诊断是

- A. 内痔
- B. 直肠肛管周围脓肿
- C. 直肠息肉
- D. 肛裂
- E. 肛漏

参考答案：D

参考解析：患者有大便困难病史，排便时肛门呈刀割样疼痛，约持续半天，大便两三日一行，质干硬，伴有肛门滴血，符合肛裂的诊断。内痔以便血、坠胀、肿块脱出为主要表现，指诊可触及颗粒状、柔软肿块，肛门镜检查可见直肠下端齿线上黏膜呈大小不等的圆形或椭圆形肿块，质软，色红；或黏膜变厚，肿块表面糜烂、渗出或粗糙，呈紫红色或暗红色，并有少量分泌物；有时肿块表面可见活动性出血点。直肠肛管周围脓肿主要表现为肛门周围突发肿块，继则剧烈疼痛，局部红肿灼热，坠胀不适，伴有不同程度的全身症状，易肿，易脓，易溃，但不易敛，溃后易形成肛瘘。直肠息肉可见便血、脱垂、肠道刺激症状，直肠指诊可触到质软如豆粒大小的圆形肿物，能活动，无压痛。肛漏以局部反复流脓、疼痛、瘙痒为主要表现，并可触及或探及瘘管通到直肠。

99. 其治法是

- A. 清热解毒透脓
- B. 养阴清热，祛湿解毒
- C. 理气活血，润肠通便
- D. 养阴清热润肠



E. 清热润肠通便

参考答案：E

参考解析：患者大便两三日一行，质干硬，伴有肛门滴血，腹胀，溲黄，舌红，脉弦数，辨证为血热风燥证，治宜清热润肠通便。清热解毒透脓用于火毒炽盛证；养阴清热，祛湿解毒用于阴虚毒恋证；理气活血，润肠通便用于气滞血瘀证；养阴清热润肠用于阴虚津亏证。

100. 治疗应首选

A. 凉血地黄汤合脾约麻仁丸

B. 润肠汤

C. 六磨汤

D. 青蒿鳖甲汤

E. 透脓散

参考答案：A

参考解析：治疗肛裂血热肠燥证，首选凉血地黄汤合脾约麻仁丸。润肠汤为阴虚津亏证首选，六磨汤为气滞血瘀证首选，青蒿鳖甲汤为阴虚毒恋证首选，透脓散为火毒炽盛证首选。

综合分析题

患者，男，25岁。素体羸瘦，有肺结核病史。1个月前出现右侧阴囊部坠胀，伴阴囊发凉，苔薄，脉滑。触诊：右侧附睾尾部有不规则的局限性结节，质硬，触痛不明显。化验血沉45mm/h。

101. 其诊断是

A. 子痈

B. 阴茎痰核

C. 子痰

D. 水疝

E. 脱肛

参考答案：C

参考解析：患者素体羸瘦，有肺结核病史，阴囊部坠胀，右侧附睾尾部有不规则的局限性结节，质硬，触痛不明显，血沉增快，诊断为子痰。子痈以睾丸或附睾肿胀疼痛为特点。阴茎痰核表现为阴经背侧可触及硬结或条索状斑块，无压痛，大小不一，或单发或数个不等，发展缓慢，从不破溃；阴经勃起时有疼痛或弯曲变形，严重者可影响性交，甚至引起阳痿。水疝指阴囊内有水湿停滞，以不红不热，状如水晶为特征的病症。脱肛的特点是直肠黏膜及直肠反复脱出肛门外伴肛门松弛。

102. 其治法是

A. 温经通络，化痰散瘀

B. 滋肾养阴，化痰除湿

C. 温肾补阳，化痰散结

D. 活血化瘀，化痰散结

E. 清热化湿，化痰散结

参考答案：A

参考解析：根据患者临床表现辨证为浊痰瘀结证，治宜温经通络，化痰散瘀。

103. 治疗应首选

A. 十全大补汤合小金丹

B. 阳和汤配服小金丹

C. 化坚二陈丸

D. 滋阴除湿汤

E. 橘核丸

参考答案：B

参考解析：治疗子痰之浊痰瘀结证，首选阳和汤加减，配服小金丹。十全大补汤合小金丹为子痰气血两虚证首选，化坚二陈汤为阴茎痰核痰浊凝结证首选，滋阴除湿汤为子痰阴虚内热证首选，橘核丸为子痛气滞痰凝证首选。

综合分析题

患者，男，20岁。左肩背部发现一肿块半年，近期增大，约2cm×3cm，不痛不痒，略微高起，边界清楚，与皮肤无粘连，中央有一个黑头，挤压后有臭味脂浆溢出。伴胸膈痞闷，急躁易怒，舌淡，苔腻，脉滑。

104. 其诊断是

A. 疔

B. 有头疽

C. 疖

D. 脂瘤

E. 肉瘤

参考答案：D

参考解析：患者左肩背部发现一肿块半年，边界清楚，与皮肤无粘连，中央有一个黑头，挤压后有臭味脂浆溢出，可诊断为脂瘤。疔的特点是肿势局限，范围多在3cm左右，突起根浅，色红、灼热、疼痛，易脓、易溃、易敛。有头疽的特点是初起皮肤上即有粟粒样脓头，焮热红肿灼痛，迅速向深部及周围扩散，脓头相继增多，溃烂后状如莲蓬、蜂窝，范围常超过9~12cm，大者可在30cm以上。疖的特点是局部光软无头，红肿疼痛，结块范围多在6~9cm，发病迅速，易肿、易脓、易溃、易敛，或伴恶寒、发热、口渴等症状。肉瘤的特点是软似绵，肿似馒，皮色不变，不紧不宽，如肉之隆起。

105. 内治应首选

A. 芩连二母丸合凉血地黄丸

B. 龙胆泻肝汤合仙方活命饮

C. 二陈汤合四七汤

D. 顺气归脾丸

E. 丹栀逍遥散

参考答案：C

参考解析：肿块中间有一个黑头，伴胸膈痞闷，急躁易怒，舌淡，苔腻，脉滑，辨证为痰气凝结证，治法为理气化痰散结，方药为二陈汤合四七汤加减。

106. 外治应首选

A. 金黄膏外敷

B. 冲和膏外敷

C. 阳和解凝膏外敷

D. 手术切除

E. 切开扩创术

参考答案：D

参考解析：将脂瘤完整手术切除，是最有效、最根本的治疗方法。

综合分析题

患者月经量多色黑且有血块，已持续3周，少腹疼痛拒按，舌边瘀点，脉细涩。

107. 该患者诊断是

- A. 经期延长血瘀证
- B. 月经过多血瘀证
- C. 崩漏血瘀证
- D. 痛经寒凝血瘀证
- E. 痛经气滞血瘀证

参考答案：C

参考解析：患者月经量多，持续3周，诊断为崩漏。崩漏血瘀证证候：经血非时而下，量时多时少，时出时止，或淋漓不断，或停闭数月又突然崩中，继之漏下，经色暗有血块；小腹疼痛或胀痛；舌质紫黯或尖边有瘀点，脉弦细或涩。选项C正确当选。

108. 其治法是

- A. 活血化瘀止血
- B. 化瘀止血
- C. 理气行滞，化瘀止血
- D. 温经散寒，化瘀止血
- E. 活血化瘀，固冲止血

参考答案：E

参考解析：崩漏血瘀证，治法：活血化瘀，固冲止血。选项E正确当选。

109. 治疗应选的方剂是

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 桃红四物汤
- C. 膈下逐瘀汤
- D. 逐瘀止血汤
- E. 失笑散

参考答案：D

参考解析：崩漏血瘀证方药：逐瘀止血汤。选项D正确当选。

综合分析题

患者，女，24岁，已婚。自产一女婴后，低热不退，腹痛绵绵，喜按，恶露量少，色淡质稀，自汗，头晕心悸，舌质淡，苔薄白，脉细数。

110. 其诊断为

- A. 产后郁冒
- B. 产后血晕
- C. 产后身痛
- D. 产后发热
- E. 产后腹痛

参考答案：D

参考解析：患者生产后低热不退，诊断为产后发热。产后郁冒指产妇分娩后因失血过多，气随血泄，汗出腠理不密，寒邪乘虚而入，正虚不能驱邪外达，反逆上冲，而出现头眩目昏，昏蒙而神不清，郁闷不舒等症。产后血晕指产妇分娩后突然头晕眼花，不能起坐，或心胸满闷，恶心呕吐，痰壅气急，心烦不安，甚则神昏口噤，不省人事。产后身痛指产妇在产褥期内，出现肢体或关节酸楚、疼痛、麻木、重着者。产后腹痛指产妇在产褥期内，发生与分娩或产褥有关的小腹疼痛。

111. 其治法为

- A. 清热解毒，凉血化瘀
- B. 活血化瘀，和营退热
- C. 养血祛风，疏散表邪
- D. 补血益气，和营退热
- E. 养阴清热止血

参考答案：D

参考解析：根据患者临床表现辨证为血虚证，治宜补血益气，和营退热。清热解毒，凉血化瘀用于感染邪毒证；活血化瘀，和营退热用于血瘀证；养血祛风，疏散表邪用于外感证；养阴清热止血用于血热证。

112. 治疗应首选

- A. 保阴煎
- B. 荆穗四物汤
- C. 补中益气汤
- D. 桃红消瘀汤
- E. 五味消毒饮

参考答案：C

参考解析：治疗产后发热之血虚证，首选补中益气汤加地骨皮。保阴煎为血热证首选，荆穗四物汤为外感证首选，桃红消瘀汤为血瘀证首选，五味消毒饮为感染邪毒证首选。

综合分析题

一产妇分娩后，感觉小腹疼痛，拒按，得热痛减，恶露量少，涩滞不畅，色紫黯有块，块下痛减，面色青白，四肢不温；舌质紫黯，脉沉紧。

113. 最佳治法是

- A. 温经散寒，化瘀止痛
- B. 理气行滞，活血化瘀
- C. 活血化瘀，温经止痛
- D. 养血活血，缓急止痛
- E. 温经散寒，理气行滞

参考答案：C

参考解析：产妇分娩后，小腹疼痛，诊断为产后腹痛。产后小腹疼痛，拒按，得热痛减；恶露量少，涩滞不畅，色紫黯有块，块下痛减；面色青白，四肢不温，或伴胸胁胀痛；舌质紫黯，脉沉紧或弦涩。辨证为瘀滞子宫证。证候：治法：活血化瘀，温经止痛。选项C正确当选。

114. 其治疗首选

- A. 肠宁汤
- B. 生化汤
- C. 膈下逐瘀汤
- D. 失笑散
- E. 少腹逐瘀汤

参考答案：B

参考解析：产后腹痛，瘀滞子宫证，方药：生化汤。选项B正确当选。

115. 该患者诊断为

- A. 妊娠腹痛血瘀证

- B. 妊娠腹痛肝郁证
- C. 产后腹痛瘀滞子宫证
- D. 产后气血两虚证
- E. 产后身痛血瘀证

参考答案：C

参考解析：产妇分娩后，小腹疼痛，诊断为产后腹痛。产后小腹疼痛，拒按，得热痛减；恶露量少，涩滞不畅，色紫暗有块，块下痛减；面色青白，四肢不温，或伴胸胁胀痛；舌质紫暗，脉沉紧或弦涩。辨证为瘀滞子宫证。选项C正确当选。

综合分析题

患儿，男，9岁。反复发作哮喘3年。近2日发热面红，咳喘痰鸣，咳嗽痰壅，声高息涌，胸闷，呼吸困难，鼻塞，流涕黄稠，夜卧不安，大便秘结，2日未行，小便黄赤，舌红，苔薄黄，脉滑数，指纹紫。

116. 其辨证是

- A. 毒热闭肺证
- B. 风热郁肺证
- C. 阴虚肺热证
- D. 热性哮喘证
- E. 外寒内热证

参考答案：D

参考解析：痰热郁闭于肺，则发热面红，咳喘痰鸣，咳嗽痰壅，声高息涌，胸闷，呼吸困难，鼻塞，流涕黄稠；痰热扰神，则夜卧不安，痰热内蕴肠道，则大便秘结；痰热熏灼津液，则小便黄赤；舌红，苔薄黄，脉滑数，指纹紫为痰热内蕴之象。故辨证为热性哮喘。

117. 其治法是

- A. 清肺涤痰，止咳平喘
- B. 解表清里，止咳平喘
- C. 辛凉宣肺，化痰止咳
- D. 养阴清肺，润肺止咳
- E. 清热解毒，泻肺开闭

参考答案：A

参考解析：热性哮喘的治法是清肺涤痰，止咳平喘。外寒内热证须解表清里，风热郁肺证须辛凉宣肺，阴虚肺热证须养阴清肺，毒热闭肺证须清热解毒。

118. 治疗应首选

- A. 大青龙汤
- B. 沙参麦冬汤
- C. 麻杏甘石汤合苏葶丸
- D. 黄连解毒汤合麻杏甘石汤
- E. 苏子降气汤

参考答案：C

参考解析：治疗哮喘热性哮喘，首选麻杏甘石汤合苏葶丸。大青龙汤为外寒内热证首选，沙参麦冬汤为阴虚肺热证首选，黄连解毒汤合麻杏甘石汤为毒热闭肺证首选，苏子降气汤为肺实肾虚证首选。

综合分析题

患儿，男，4岁。大便秘结，脘腹胀满，不思饮食，恶心呕吐，口臭，手足心热，小便黄少，舌质红，苔黄厚，脉沉有力。

119. 其诊断是

- A. 食积便秘
- B. 燥热便秘
- C. 气滞便秘
- D. 气虚便秘
- E. 血虚便秘

参考答案：A

参考解析：患儿主症为大便秘结，辨病为便秘。脘腹胀满，不思饮食，恶心呕吐，口臭，手足心热，小便黄少，舌质红，苔黄厚，脉沉有力，辨证为食积便秘。选项A正确当选。

120. 其治法是

- A. 消积导滞通便
- B. 清热润肠通便
- C. 理气导滞通便
- D. 益气润肠通便
- E. 养血润肠通便

参考答案：A

参考解析：食积便秘治法：消积导滞通便。选项A正确当选。

121. 治疗应首选

- A. 黄芪汤
- B. 麻子仁丸
- C. 六磨汤
- D. 枳实导滞丸
- E. 润肠丸

参考答案：D

参考解析：食积便秘，方药：枳实导滞丸。选项D正确当选。

综合分析题

患儿，11岁。皮肤紫癜反复出现3年余，瘀斑瘀点颜色紫暗，间或出现鼻衄、齿衄，面色萎黄，神疲乏力，食欲不振，头晕心慌，舌淡苔薄，脉细无力。

122. 该患者诊断其证型是

- A. 气不摄血证
- B. 阴虚火旺证
- C. 风热伤络证
- D. 血热妄行证
- E. 脾不统血证

参考答案：A

参考解析：紫癜气不摄血证：起病缓慢，病程迁延，紫癜反复出现。瘀斑、瘀点颜色淡紫，常有鼻衄、齿衄，面色苍黄，神疲乏力，食欲不振，头晕心慌，舌淡苔脉细无力。选项A正确当选。

123. 治疗应首选

- A. 知柏地黄丸
- B. 犀角地黄汤

- C. 连翘败毒汤
- D. 归脾汤
- E. 大补阴丸

参考答案: D

参考解析: 紫癜气不摄血证, 治法: 健脾养心, 益气摄血。选项 D 正确当选。

124. 其治法是

- A. 疏风清热, 凉血散邪
- B. 滋阴降火, 凉血止血
- C. 清热解毒, 凉血止血
- D. 健脾养心, 益气摄血
- E. 补肾健脾, 填精生髓

参考答案: D

参考解析: 紫癜气不摄血证, 代表方: 归脾汤。选项 D 正确当选。

配伍选择题

- A. 干咳无痰, 咽喉干痛, 唇鼻干燥
- B. 咳声重浊, 痰多, 痰出咳平, 痰黏腻色白
- C. 咳嗽呈阵发性, 咽干口苦, 胸胁胀痛
- D. 咳嗽痰多, 质稠色黄
- E. 干咳, 咳声短促, 痰中带血丝

125. 咳嗽痰热郁肺证的主症特点是

参考答案: D

参考解析: 咳嗽痰热郁肺证, 证候: 咳嗽, 气息粗促, 或喉中有痰声, 痰多质黏厚或稠黄, 咯吐不爽, 或咯血痰, 胸胁胀满, 咳时引痛, 面赤, 或有身热, 口干而黏, 欲饮水。

126. 咳嗽痰湿蕴肺证的主症特点是

参考答案: B

参考解析: 咳嗽痰湿蕴肺证, 证候: 咳嗽反复发作, 咳声重浊, 痰多, 因痰而嗽, 痰出咳平, 痰黏腻或稠厚成块, 色白或带灰色。

配伍选择题

- A. 射干麻黄汤合小青龙汤
- B. 麻黄汤合华盖散
- C. 二陈汤合三子养亲汤
- D. 三拗汤合止嗽散
- E. 生脉散合补肺汤

127. 治疗喘证风寒壅肺证, 应首选的方剂是

参考答案: B

参考解析: 喘证风寒壅肺证的治法为宣肺散寒, 方用麻黄汤合华盖散加减。选项 B 正确当选。

128. 治疗喘证痰浊阻肺证, 应首选的方剂是

参考答案: C

参考解析: 喘证痰浊阻肺证的治法为祛痰降逆, 宣肺平喘, 方用二陈汤合三子养亲汤加减。选项 C 正确当选。

配伍选择题

- A. 眩晕，头痛，健忘，失眠
- B. 眩晕，精神萎靡，腰膝酸软
- C. 眩晕，动则加剧，面色㿔白
- D. 眩晕耳鸣，头目胀痛，口苦
- E. 眩晕，头重昏蒙，胸闷恶心

129. 眩晕肝阳上亢的主症是

参考答案：D

参考解析：眩晕肝阳上亢证，表现为眩晕，耳鸣，头目胀痛，口苦，失眠多梦，遇烦劳郁怒而加重，甚则仆倒，颜面潮红，急躁易怒，肢麻震颤，舌红苔黄，脉弦或数。选项D正确当选。

130. 眩晕肾精不足的主症是

参考答案：B

参考解析：眩晕肾精不足证，表现为眩晕日久不愈，精神萎靡，腰酸膝软，少寐多梦，健忘，两目干涩，视力减退；或遗精滑泄，耳鸣齿摇；或颧红咽干，五心烦热，舌红少苔，脉细数；或面色㿔白，形寒肢冷，舌淡嫩，苔白，脉弱尺甚。选项B正确当选。

配伍选择题

- A. 病起发热，皮肤干燥，咳呛少痰
- B. 肢体困重，手足麻木，喜凉恶热
- C. 神疲肢倦，肌肉萎缩，少气懒言
- D. 腰膝酸软，眩晕耳鸣，舌咽干燥
- E. 手足麻木不仁，四肢青筋显露，舌痿不能伸缩

131. 痿证之脉络瘀阻证，症见

参考答案：E

参考解析：痿证之脉络瘀阻证，证候主症：久病体虚，四肢痿弱，肌肉瘦削，手足麻木不仁，四肢青筋显露，可伴有肌肉活动时隐痛不适，舌痿不能伸缩，舌质暗淡或有瘀点、瘀斑，脉细涩。选项E正确当选。

132. 痿证之脾胃虚弱证，症见

参考答案：C

参考解析：痿证之脾胃虚弱证，证候主症：起病缓慢，肢体软弱无力逐渐加重，神疲肢倦，肌肉萎缩，少气懒言，纳呆便溏，面色㿔白或萎黄无华，面浮，舌淡，苔薄白，脉细弱。选项C正确当选。

配伍选择题

- A. 3cm左右
- B. 3~6cm左右
- C. 6~9cm左右
- D. 大于9cm
- E. 以上都不是

133. 疔病的肿势范围是

参考答案：A

参考解析：疔是指发生在肌肤浅表部位、范围较小的急性化脓性疾病。其特点是肿势局限，范围多在3cm左右，突起根浅，色红、灼热、疼痛，易脓、易溃、易敛。临床分暑疔（有头疔、无头疔）、蝼蛄疔、疔病。选项A正确当选。

134. 痈的肿势范围是

参考答案：C

参考解析：痈的概念与特点：痈是指发生于体表皮肉之间的急性化脓性疾病。特点是局部光软无头，红肿疼痛（少数初起皮色不变），结块范围多在6~9cm左右，发病迅速，易肿、易脓、易溃、易敛，或伴恶寒、发热、口渴等症状。选项C正确当选。

配伍选择题

- A. 发病较快，结块形如鸡卵，漫肿无头，焮热疼痛
- B. 发病较慢，结块初起如豆，串生累累，不红不痛
- C. 继发感染，结块初起如豆，压之疼痛，很少化脓
- D. 多见老年，结块形如堆粟，按之坚硬，生长迅速
- E. 起病较快，初起无头，红肿成片，四周色泽较淡

135. 颈痈的局部表现特点是

参考答案：A

参考解析：颈痈风热痰毒证：颈旁结块，初起色白漫肿，形如鸡卵，灼热疼痛，逐渐红肿化脓。

136. 发的局部表现特点是

参考答案：E

参考解析：发的特点是初起无头、红肿蔓延成片，中央明显，四周较淡，边界不清，灼热疼痛，有的3~5日后中央色褐腐溃，周围湿烂，全身症状明显。

配伍选择题

- A. 挂线法
- B. 内治法
- C. 手术切除
- D. 砭镰法
- E. 挑治法

137. 肉瘻早期的治法是

参考答案：B

参考解析：肉瘻的治疗一般多采用内治法，以理气解郁，化痰软坚为主，必要时可手术治疗。选项B正确当选。

138. 石瘻早期的治法是

参考答案：C

参考解析：石瘻为恶性肿瘤，应及早诊断并早期手术治疗。选项C正确当选。

配伍选择题

- A. 皮损对称分布，多形损害，剧烈瘙痒，反复发作易成慢性
- B. 好发于颈项、肘、尾骶部，皮损分布常不对称
- C. 发于接触部位，皮损表现单一，伴有痒或灼热感
- D. 皮损剧烈瘙痒，搔抓后皮损肥厚，皮沟加深，皮嵴隆起，极易形成苔藓样变
- E. 损害多为暗红、淡紫或皮肤色多角扁平丘疹，有蜡样光泽、网状纹

139. 牛皮癣的特点是

参考答案：D

参考解析：牛皮癣的皮损特点：皮损多为圆形或多角形的扁平丘疹融合成片，剧烈瘙痒，搔

抓后皮损肥厚，皮沟加深，皮嵴隆起，极易形成苔藓样变。

140. 湿疹的皮损特点是

参考答案：A

参考解析：湿疹的临床特点：皮损对称分布，多形损害，剧烈瘙痒，有渗出倾向，反复发作，易成慢性等。根据病程可分为急性、亚急性、慢性三类。急性湿疹以丘疱疹为主，炎症明显，易渗出；慢性湿疹以苔藓样变为主，易反复发作。

配伍选择题

- A. 经行身痛
- B. 带下病
- C. 经行感冒
- D. 经行头痛
- E. 经期延长

141. 内寒常导致的妇科疾病是

参考答案：B

参考解析：内寒，是机体阳气虚衰，命火不足，或阴寒之气不散，故内寒的产生，与肾脾阳虚关系最大。内寒致病常导致闭经、多囊卵巢综合征、月经后期、痛经、带下病、子肿、宫寒不孕。

142. 外寒常导致的疾病是

参考答案：A

参考解析：外寒入侵冲任、子宫，进而发生经行发热、经行身痛、痛经、月经后期、月经过少、闭经、产后身痛、不孕症等病证。

配伍选择题

- A. 血虚证
- B. 痰湿证
- C. 血瘀证
- D. 肾虚证
- E. 气滞证

143. 不属于月经后期常见证候的是

参考答案：C

参考解析：月经后期的常见证候有肾虚证、血虚证、血寒证、气滞证、痰湿证。选项C正确当选。

144. 不属于月经过少常见证候的是

参考答案：E

参考解析：月经过少的常见证候有肾虚证、血虚证、血瘀证、痰湿证。选项E正确当选。

配伍选择题

- A. 心神失养
- B. 肝风内动
- C. 脾虚气弱
- D. 胃气不和
- E. 肺气虚弱

145. 睡中露睛多属

参考答案：C

参考解析：寐时眼睑张开而不闭，是脾虚气弱之露睛。选项C正确当选。

146. 两目直视，瞪目不活多属

参考答案：B

参考解析：两目直视，瞪目不活，是肝风内动。选项B正确当选。

配伍选择题

A. 从鸠尾分出散布于背部

B. 从鸠尾分出散布于腹部

C. 从鸠尾分出散布于胸部

D. 从长强分出散布于头部

E. 从长强分出散布于腹部

147. 任脉别络的分布是

参考答案：B

参考解析：任脉的别络，从胸骨剑突下鸠尾分出后，散布于腹部。

148. 督脉别络的分布是

参考答案：D

参考解析：督脉的别络，从尾骨下长强分出后，散布于头部，并走向背部两侧的足太阳经。

配伍选择题

A. 孔最

B. 太渊

C. 列缺

D. 尺泽

E. 少商

149. 治疗咯血、鼻衄首选的是

参考答案：A

参考解析：孔最【定位】在前臂前区，腕掌侧远端横纹上7寸，尺泽与太渊连线上。

150. 治疗齿痛、项强首选的是

参考答案：C

参考解析：列缺主治：①咳嗽、气喘、咽喉肿痛等肺系病证。②外感头痛、齿痛、项强、口眼喎斜等头五官疾患。③手腕痛。

